

植生情報第15号 (2011年3月)

附表1. シカ影響アンケート回答の記載内容(踏査地域に関する記載).

チェックシート(図1)の設問3~19への回答記載内容をまとめた。回答は、環境庁(1997)の都道府県別メッシュマップの都道府県番号と、各都道府県ごとに1/25,000地形図図幅に付けられた番号の順番により配列し、ほぼ北から南へ並んでいる。都道府県・市町村名は平成の合併後の表記に統一し、郡名は略した。地形図図幅名とその4分画の位置については、回答者の記載を地形図上で校訂し、修正を加えたところもある。『影響程度』の判定基準は表1を参照。『シカの影響・痕跡の種類』の略号は以下のとおり、食:食痕、剥:樹皮剥ぎ、視:生個体目視、声:鳴き声、糞:糞、道:シカ道、ラ:ディアライン、落:落ち葉食い、土:表土の流亡、崩:斜面崩壊。一つの内容は2行に記載されており、上の行(シャドウ)に記載スペースが得られない場合は、下の行(白)に記した。

踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響		地域全般のシカ対策																									
回答No.	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的影響	その他の	防護柵の設置	防護柵の種類	シカ対策	写真																			
踏査コース・区域																																				
状況記述(影響に顕著な場合は傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)																																				
1	ボン沼	北海道浜頓別町	浅茅野台地	左下	5-10m	09.6	相当部分	軽	剥					なし			○																			
ボン沼を周遊する国有林内歩道																																				
2	上サロベツ湿原	北海道豊富町	豊徳	左下	約7m	10.7	一部	軽	食	視	声	糞	道																							
図幅の真ん中付近。湿原内を走る丸山道路の北側地域の湿原域																																				
3	川口	北海道天塩町	更岸	左上	8-9m	10.8	一部	軽	食																											
農業排水路周辺																																				
4	敏音知岳	北海道中頓別町	敏音知	右上	65-250m	10.9	一部	軽	食	視				なし																						
登山口(道の駅)~白樺の泉																																				
5	オムサロ道跡公園	北海道紋別市川向	紋別	左上	0-50m	10.6	全域	中	食	視	道	ラ	クマ	下記	クマ	下記	なし																			
オムサロ道跡公園とその周辺の紋別市内																																				
6	知床岬	北海道斜里町・羅臼町	知床岬	右上	0-50m	10.8	全域	激	食	剥	視	声	糞	道	ラ	クマ	下記	金網	下記	○																
斜里側の文吉湾から海岸台地上上がり、岬を過ぎて羅臼側の台地末端までを往復した。																																				
7	上蘆別	北海道紋別市上蘆別	志文	左下	130-200m	09.9	一部	軽	食	剥																										
上モベツ九線川沿い																																				
8	弥生	北海道湧別町南兵村一区	上湧別	右下	300-400m	10.8	一部	軽	食	道																										
弥生牧場東																																				
9	志露峠	北海道湧別町西芭芭	芭芭	左下	30m-100m	09.9	一部	軽	食																											
上芭芭~志露峠																																				
10	羅臼岳登山道	北海道斜里町	知床五湖	右下	250-1000m	10.8	相当部分	強	食	剥	視	糞	道	ラ		下記	金網		○																	
知床連山からの下山途中。羅臼平から登山口である岩尾別温泉までの区間																																				
11	羅臼岳	北海道斜里町	知床五湖	右下	200-1200m	10.7	一部	中	食	剥	視	声	糞	道	ラ	クマ	下記	クマ	下記	クマ	下記	クマ	下記	クマ	下記	なし										
岩尾別温泉~極楽平~羅臼岳																																				
12	知床連山	北海道斜里町・羅臼町	硫黄山	左下	1000-1500m	10.8	一部	軽	食					なし																						
知床連山の森林限界以上で、羅臼岳登山道の大沢(別図幅)から三峰、サルシレ、オツカバケ、二つ池に至るルート																																				
13	丸瀬布金山	北海道遠軽町	丸瀬布北部	右下	400-550m	10.8	一部	中	食	糞	道																									
通信施設周辺																																				
14	瀬戸瀬山	北海道遠軽町栄野	瀬戸瀬	右下	150-300m	10.8	一部	軽	食	糞																										
瀬戸瀬山北麓																																				
15	生田原水穂	北海道遠軽町	遠軽	左下	180-200m	09.9	一部	中	食	剥	視	糞	道																							
生田原川東																																				
16	東芭芭	北海道湧別町	若里	左下	200m	09.9	一部	軽	食																											
東芭芭牧場北																																				
17	武利	北海道遠軽町	丸瀬布南部	右上	350-400m	10.8	一部	軽	食	糞	道																									
三十五点沢上流																																				
18	仁田布川	北海道遠軽町	瀬戸瀬温泉	右下	300-600m	10.9	一部	中	食	剥	視	糞	道																							
仁田布林道																																				
19	生田原清里	北海道遠軽町	伊吹	左下	150-250m	09.9	一部	中	食	剥	糞																									
生田原川~JR石北線間																																				
20	上支湧別川	北海道遠軽町	上支湧別	左上	450-600m	10.5	相当部分	中	食	剥	視	糞	道																							
上支湧別川支流(石ノ沢川)~本流合流部~更生橋~上支湧別橋~本流七線付近 *主として河川沿いの植生																																				
21	金華	北海道北見市	留辺蘂西部	左上	300-420m	09.9	一部	中	食	剥	糞																									
奔無加川北、千田の沢川																																				
22	水上	北海道小清水町	上徳	右上	80-100m	09.4	相当部分	中	食	剥	視	声	糞	道																						
民家の敷地内(庭など)																																				
23	物満内林道	北海道音威子府村	鹿島	右下	50-80m	10.9	なし	なし																												
オカノ沢出合~216林班林道分岐																																				
24	音威富士南西麓	北海道音威子府村	音威子府	左上	130-150m	10.9	なし	なし																												
沢沿い作業道(水源地~終点)																																				
25	天塩川温泉	北海道音威子府村	恩根内	左上	60-110m	10.9	なし	なし																												
リバーサイドキャンプ場裏、散策の森~憩の森																																				
26	報徳(大手沢川)	北海道美深町	紋穂内	左上	100-110m	10.9	なし	なし																												
報徳林道沿い(沢沿い)																																				
27	富岡川向	北海道美深町	紋穂内	左下	80-100m	10.9	なし	なし																												
施設道沿い																																				
28	美深パンケ川	北海道美深町	雄木高	左上	170m附近	10.9	なし	なし																												
パンケ川中の沢林道、沢沿い																																				
29	松山湿原周辺	北海道美深町	仁宇布	右下	460-800m	10.9	なし	なし	視																											
一般車道終点(天電沼)~松山湿原、雨霧の滝~女神の滝																																				
30	美深公園「望の森」	北海道美深町	美深	右上	130-140m	10.9	なし	なし	食																											
「望の森」一帯																																				
31	激流の滝	北海道美深町	智恵文	右上	200-210m	10.9	なし	なし																												
七線林道(ペンケニウブ川支流の沢沿い)																																				

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策			写真	
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類		その他のシカ対策
踏査コース・区域					状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)												
32	松山湿原	北海道美深町	ピヤシリ岳	右上	800m附近	10.9	なし	なし						なし			
えぞ松沼～つじ沼～遠松沼					湿原の泥上に足跡												
33	忠烈布野水池	北海道名寄市	上名寄	左下	160-180m	10.9	なし	なし									
車道の北側、ふうれん望湖台自然公園園地遊歩道沿いの自然性林																	
34	仲線小沢	北海道士別市	添牛内	右下	200-240m	10.7	相当部分	軽	食、視、声、糞、道					耕地周辺	金網、電気柵		
耕作地及び樹林地周辺																	
35	岩尾内湖	北海道士別市	岩尾内湖	右下	340m附近	10.9	なし	なし									
県道から神社山公園方面への車道両側																	
36	南丘森林公園	北海道和寒町	蘭留	左上	210-240m	10.9	なし	なし									
研修の森遊歩道																	
37	浮島湿原	北海道上川町	天塩岳	右下	830-870m	10.9	相当部分	中	食					なし		○	
ポルベンペ川支川林道登山口～東の沼～中の沼					湿原域に食痕集中。湿原での踏みつけ影響あり。												
38	旭川21世紀の森	北海道旭川市	石狩瑞穂	左上	440-450m	10.9	なし	なし									
森林学習展示館～野鳥の森					管理人の話では「シカはいるが、今年は例年より少ない。例年はニレ類の樹皮やタラの新芽が食われる」とのこと。												
39	層雲峡	北海道上川町	層雲峡	右上	650m	09.7	一部	軽	食、剥、糞					なし		○	
層雲峡温泉周辺					シカが牧草類を採食しているところを観察。												
40	黒岳五合目	北海道上川町	層雲峡	右上	1300m-	10.9	一部	軽	糞					なし		○	
大雪山層雲峡ロープウェイ駅終点遊歩道					痕跡などは見つけられなかったが建物の周りの草地にたくさんの糞があった(写真)。遊歩道のコンクリート部分にシカの足跡があり、その説明書きがあった。												
41	大雪山ノ赤岳	北海道上川町	層雲峡	右下	1500-1850m	10.7	なし	なし						なし		○	
鏡泉台～コマクサ平					麓の大雪山や層雲峡周辺では多数のエゾシカが見られるが、高標高域の今回の踏査範囲では目につくシカの影響はなかった。												
42	大雪山ノ五色ヶ原	北海道上川町	五色ヶ原	左上	1700m	10.7	一部	軽	食、糞、道					下記			
五色ヶ原内の登山道周辺					沢沿いの倒った樹木の植物がよく食われている。エゾノリュウキンカやイネ科、カヤツリグサ科などが食われている。シカ道は近年増加している。温暖化(融雪期の早まり)によるササの増加。												
43	大雪山ノ沼の原林道	北海道上川町	五色ヶ原	右上	960-約1000m	10.7	相当部分	中	視、糞、道								
林道から見ただけ、踏査は行わず					林道沿いから見える森林の林床は一面不嗜好植物(ヨブスマソウとハンゴンソウ)で覆われている。												
44	野付半島	北海道標津市	野付崎	左上	0-3m	10.6	ほぼ全域	強	食、剥、糞、道、ラ					なし		○	
オンネニクル湾沿い(道はない)					汀線沿いのオナカマドの多い林分で顕著な樹皮食い(新しい)。												
45	阿寒湖畔	北海道釧路市	雄阿寒岳	左上	420-430m	10.6	ほぼ全域	強	食、剥、糞、道、ラ					樹林との境	下記	下記	
イベシバ川沿い					開業前では1990年代、シカによる多大な影響があったことから、調査がおこなわれており、この数年、林保植物の一部に回復のきざしがみられる。金網、母樹に対して防護ネット巻き付け、鳥獣保護区で囲いつな、害獣駆除。												
46	春国岱	北海道根室市	東梅	左下	0-3m	10.9	相当部分	中	食、剥、視、声、糞、道、ラ					下記	金網	下記	
春国岱第1・第2砂丘					ウラツグが集中的に食われている。耕地(牧草地)周辺、樹林との境などに防護柵。鳥獣保護区以外で冬季(年により可猟期間、区域、雌雄など変更あり)の狩猟。												
47	花咲港西	北海道根室市	根室南部	左上	20-50m	10.6	ほぼ全域	強	食、剥					自然植生内	金網	○	
イテイ保護林の遊歩道					遊歩道入り口にシカ柵が設けられているが、侵入を十分に防ぎきれていない。												
48	音別川上流域	北海道釧路市音別町	ピラウンナイ川	左下	400-500m	10.8	ほぼ全域	中	食、糞、道					なし			
音別川沿いから斜面林																	
49	釧路湿原	北海道鶴居村	下幌呂	右下	約7m	09.8	ほぼ全域	強	食、視、声、糞、道								
大島川周辺					河川沿いのヤラメクサ群落での食害と、川沿いに夕タ場が形成されている。シカ道は湿原全体に無数についている。												
50	サルボ	北海道標茶町	塘路湖左上/細岡右上		30-80m	10.11	ほぼ全域	中	食、剥、糞、道、ラ					下記	金網	下記	
サルボ展望台～三角点					耕地(牧草地)周辺、樹林との境などに防護柵。鳥獣保護区以外で冬季(年により可猟期間、区域、雌雄など変更あり)に狩猟。												
51	落石岬	北海道根室市	落石岬	左上	45-50m	10.6	全域	強	食、剥、視、糞、道、ラ					なし		○	
遊歩道を使う					影響が強いのはアカエゾマツ林。												
52	ヌブキベツ	北海道釧路市音別町	ヌブキベツ	左上		10.10	全域	激	食、剥、道、ラ					なし		○	
53	幌加温泉	北海道上士幌町	幌加	左上	650-700m	10.4	ほぼ全域	強	食、剥、視、声、糞、道					なし		○	
幌加温泉周辺の車道沿い																	
54	幌加美里別	北海道足寄町	幌加美里別ダム	右下	400-500m	10.7	ほぼ全域	中	食、剥、視、糞、道					なし		○	
幌加美里別林道沿い																	
55	糠平温泉	北海道上士幌町	糠平	右下	540-560m	10.7	ほぼ全域	中	食、剥、視、道					下記		○	
ネーチャートレイル					民家の庭先にネットが張られている(樹脂製のネット)。												
56	ハンケニコロベツ林道	北海道新得町	十勝ベンケ山	右下	400m-	10.7	なし	なし						なし			
ハンケニコロベツ川					足跡や目撃情報はある。シカが生息している場所だが、いろいろな植物が見られたので、影響は少ないと思われる。												
57	然別湖	北海道鹿追町・上士幌町	然別湖	右下	800-850m	10.9	一部	軽	食		なし			なし		なし	
白雲山登山口から然別湖沿い-東雲湖の手前まで																	
58	拓北・仲和	北海道足寄町	愛冠	左上	200-431m	10.9	ほぼ全域	中	食、剥、視、声、糞、道					耕地周辺	金網	○	
自然林保全～拓北展示室 9-11小班																	
59	新得山	北海道新得町	狩勝峠	右下	220-300m	10.6	一部	軽	食、剥					下記	なし	○	
林業試験場道東支場～新得山南斜面					クマイザサが開花している。												
60	栄穂地区	北海道浦幌町	栄穂	左下	200-280m	10.8	ほぼ全域	中	食、声、糞、道					耕地周辺	金網、電気柵		
耕作地周辺から周辺の樹林地																	
61	広内	北海道新得町	新得	左上	360-500m	10.10	一部	軽	食、視					なし			
増田山周辺																	
62	炭山(道有林)	北海道浦幌町	川流布	左下	150-300m	10.7	ほぼ全域	強	食、視、糞、道、ラ					なし		○	
富川の広葉樹原生林「太古の杜」																	
63	沙流川源流	北海道日高町	沙流岳	右上	150-1000m	10.9	一部	中	食、視、糞、道		不明		不明	耕地周辺	下記		
国道274号 むかわ町から日高町の日勝峠の間					標高150-500m、むかわ町から占冠村のあたり。車で道路を夕方走っていたら、3時間ほどで回復(計30頭)のシカを見た。みな道産の草を食べていた(特にイネ科の植物)。林内を食害などがかなり認められたが、道路脇の道産の草地はかなり食われていた。防護柵はもてできなかった網など、シカが道路にとびださないよう、道の両側にロープがあった。「シカに注意」の看板もあり。												
64	沙流川源流原始林	北海道日高町	沙流岳	右上	770-1040m	09.7	ほぼ全域	軽	食、道		クマ			下記	なし	○	
国道274号線沿いの樹林と林縁					ササ開花枯死。												
65	久保	北海道豊頃町	茂岩	左下		10.10	なし	なし						耕地周辺	金網		
66	大津・長節原生花園	北海道豊頃町	湧洞沼	右上	40m	10.7	なし	なし						なし		○	
大津・長節原生花園																	
67	賀張	北海道日高町	厚賀	右下	40-80m	10.5	相当部分	軽	食、視、糞、道					なし		○	
牧草地周辺から残存林分内																	
68	アポイ岳	北海道様似町	アポイ岳	左下	70-811m	10.8	一部	軽	剥、糞、道					なし			
アポイ岳ビジターセンター(旧道経由)～五合目避難小屋～アポイ岳山頂					調査地全体にシカ糞、シカ道、足跡は確認されるが、シカの採食痕はほとんど見られない。五合目までの森林部において、ごく一部の木に樹皮はぎの痕跡が認められる。												
69	アポイ岳	北海道様似町	アポイ岳	左下	100-810m	09.6	一部	軽	食、視					なし		○	
アポイ山荘、アポイ岳山頂往復																	

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

踏査地域の概要						地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策				
回答 No.	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の具体的な影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真
踏査コース・区域						状況記述(影響に幅がある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)											
70	アポイ岳	北海道様似町	アポイ岳	左下	75-382m	10.4	ほぼ全域	強	食、剥、視、糞、道、ラ					下記			○
ビジターセンター～アポイ岳5合目						5合目に高山植物群落の再生試験地があり、そこではシカ柵が設けられている。											
71	幌満川	北海道様似町	アポイ岳	左下	20-100m	10.5	ほぼ全域	強	食、視、糞、道					なし			○
幌満川沿い																	
72	えりも岬	北海道えりも町	襟裳岬	右下	50-70m	10.7	なし	なし						なし			○
えりも岬周辺の遊歩道																	
73	雨竜沼湿原	北海道雨竜町	暑寒別岳	右下	850m	10.7	なし	なし									
雨竜沼湿原内の周道(木道)						人間による登山道沿いの草刈りあり(主にササ地)。											
74	雨竜沼湿原	北海道雨竜町	暑寒別岳	右下	540-955m	10.7	なし	なし			クマ	下記		なし			
南暑寒荘～雨竜沼湿原～湿原展望台						クマによる、湿原周辺域で掘り起こし跡多数(やや古)											
75	宮城の沢	北海道砂川市	砂川	右上	80-120m	10.5	一部	軽	食、糞					耕地周辺	電気柵		○
宮城の沢																	
76	川岸	北海道虻川町	上戸別	左下	240-280m	10.7	一部	中	食、剥、道					なし			
番の沢林道						踏査地点はハルニレ枯死など影響が強い											
77	東奈井江	北海道奈井江町	茶志内	右上	140-180m	10.5	一部	軽	食、視					なし			○
東奈井江																	
78	右惣沢	北海道虻川市	奥戸別	左下	340-380m	10.7	相当部分	軽	食					なし			
右惣沢林道																	
79	石狩浜	北海道石狩市	望来	左下	5m	10.7	なし	なし						なし			
北石狩衛生センター近くの海岸草原																	
80	月形町大沼	北海道月形町	市南	左上	10-15m	10.8	なし	なし						なし			
大沼散策路																	
81	専修短大演習林	北海道美唄市	美唄	右下	60-200m	10.9	一部	軽	食、剥、視、糞、道					なし			○
専修大学北海道短期大学演習林全般						シカ密度は高く、越冬期にはほぼ1haの演習林で10頭程度が確認されている。夏季に姿を見ることはまれなので、周辺の森林にも分散していると思われる。											
82	美唄湿原	北海道美唄市	美唄	右上	13-15m	10.9	なし	なし						なし			○
開発町、美唄湿原周辺																	
83	東西林道	北海道虻川市	戸別湖	右上	340-360m	10.7	一部	軽	食、糞					耕地周辺	電気柵		
東西林道																	
84	石狩浜	北海道石狩市	石狩	右上	5m	10.7	なし	なし						なし			
親船町近くの海岸草原																	
85	沼ノ端	北海道新篠津村	上幌向	左上	7-9m	10.9	なし	なし						なし			○
新篠津運河東側																	
86	利根別自然休養林	北海道岩見沢市	岩見沢	左下	50-135m	10.8	一部	軽	食、剥					耕地周辺	電気柵		
ウォーキングコースB																	
87	桂沢湖左股沢	北海道三笠市	桂沢湖	右下	250-400m	10.7	相当部分	中	食、視					なし			
左股沢林道																	
88	夕張岳	北海道夕張市	滝ノ岳	右下	560-1520m	10.10	ほぼ全域	中	食、視、糞、道		クマ	下記		自然植生内	電気柵		○
夕張岳ヒュッテ下～吹通						樹林帯よりも高山帯で影響が顕著である。蛇紋岩崩壊地、高草帯崩壊地などで多数の食痕、糞痕が認められる。雷田(蛇紋岩崩壊地)周辺でクマによる掘り起こしが見られる。また、雷田ではエゾユキウサギの糞も多い。電気柵は道による試験の実施。											
89	藻岩山	北海道札幌市	札幌	右下	65-531m	10.5	なし	なし						なし			
スキー場コース～山頂～旭山記念公園						過去の調査ではシカの糞が見つかった。周辺には越冬地がある。											
90	野幌森林公園	北海道江別市	野幌	左上・左下	30-70m	10.8	なし	なし						なし			
野幌森林公園開拓記念館など						シカがいない場所だが、いろいろな植物が見られたので、殆ど影響がないように見えた。											
91	西岡公園	北海道札幌市豊平区	清田	左上	250m	09.9	なし	なし			クマ	下記		なし			
西岡公園内						痕跡などを確認していないが、シカは生息していると思う。構成種、低木の樹形などに特に異常は感じなかった。ヒゲマが目撃されたため、現在は立ち入り禁止になっている。											
92	川端	北海道由仁町	川端	左上	140-180m	10.6	一部	軽	食、道					耕地周辺	電気柵		○
クオーベツ林道起点周辺																	
93	支笏湖畔	北海道千歳市	支笏湖温泉	左下	280-320m	10.8	ほぼ全域	中	食、剥、視、道					なし			○
野鳥の森散策路																	
94	支笏湖東麓	北海道千歳市	胆振蘭越	左下・右下	50-70m	10.9	ほぼ全域	中	食、糞		足跡			なし			
鳥糞舞林道(厚平内林道分岐、3号取水地～1号取水地、林木道伝資源保存林)																	
95	安平町東部の丘陸地	北海道安平町	早来	右下	20-50m	10.8	ほぼ全域	軽	食、道					なし			○
旧早来町。生活環境保全林内の林道沿い																	
96	樽前山	北海道千歳市	樽前山	左下	660-800m	10.9	なし	なし									
7合目(車道終点)～森林限界																	
97	北大苫小牧演習林	北海道苫小牧市	胆振高丘	右上	100m	10.7	ほぼ全域	中	食、剥、視、糞					なし			○
資料有り(植生調査資料、学会発表)																	
98	ウトナイ湖	北海道苫小牧市	ウトナイ湖	右下	3-5m	10.7	なし	なし						なし			○
ネイチャーセンター周辺散策路																	
99	錦岡	北海道苫小牧市	錦岡	右下	3-5m	10.8	なし	なし						なし			
国道36号と室蘭本線の間の草原																	
100	勇払海岸(弁天)	北海道苫小牧市	上厚真	左下	0-5m	10.8	なし	なし						なし			
海岸沿いの市道から海側に入ったところ																	
101	オロフレ峠	北海道登別市	カルルス温泉	右上	920-940m	10.8	なし	なし						なし			
オロフレ峠展望台周辺						短時間、狭い範囲の確認。											
102	ポロト湖	北海道白老町	白老	右上	5-20m	10.8	ほぼ全域	軽	食					なし			○
ポロト湖畔遊歩道																	
103	室蘭岳(髭別岳)	北海道室蘭市	稲府	右下	400-911m	10.8	なし	なし						なし			
室蘭岳山麓総合公園～室蘭岳山頂						太平洋側なのでシカの生息・影響を予想していたが、痕跡はなかった。											
104	チキウ岬周辺	北海道室蘭市	室蘭	左上・右上	10-140m	10.8	なし	なし						なし			
チキウ岬、チャラツナイ、トッカリシヨ岬。車道沿い、歩道沿い																	
105	神威岬	北海道積丹町	神威岬	右上	100m	10.9	なし	なし						下記	なし		○
駐車場～遊歩道の先端まで往復						外来植物の侵入(セイヨウタンポポ、シロツメクサ、ムラサキツメクサなど)											
106	長橋苗圃	北海道小樽市	小樽西部	右上	150-180m	10.7	なし	なし						なし			
長橋苗圃内の遊歩道						シカのある地域だと思うが、特に影響があるように見えなかった。											
107	手稲金山	北海道札幌市手稲区	銭函	右下	120-130m	10.9	なし	なし						なし			
乙女の滝付近																	
108	神仙沼	北海道共和町	チセヌプリ	右上	700-750m	09.9	なし	なし						なし			
神仙沼駐車場～神仙沼～長沼～神仙沼駐車場																	
109	ニセコ高原お花畑	北海道ニセコ町	ニセコアヌプリ	左下	750m	10.9	なし	なし					斜面崩壊	なし			○
ニセコ高原お花畑(五色温泉東)																	

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響				地域全般のシカ対策		
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策
踏査コース・区域																
状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)																
110	真狩樹木園	北海道真狩村	羊蹄山	左上・左下	250-290m	10.8	なし	なし						なし		
真狩樹木園～西側保護林～北側人工林																
111	羊蹄山自然公園	北海道真狩村	羊蹄山	左上・左下	380m-	10.9	相当部分	軽食						なし		○
羊蹄山自然公園ルート8の往復																
112	砂浜海岸林	北海道江差町	乙部	左下	0m	09.3	なし	なし						なし		○
海岸林全域																
113	乙部町	北海道乙部町	乙部	右上	150-200m	10.5	一部	軽食剥			下記			なし		
緑柱公園方面から国有林1450林班までのルート																
114	小谷石	北海道知内町	涌元	左下	30-150m	10.5	全域	激食剥視糞道						耕地周辺	電気柵	有害駆除
上ノ沢川沿い及び矢越峠までの登山道																
115	奥内	青森県むつ市奥内	近川	右上	50-210m	10.9	なし	なし						なし		
字二又の集落～緑青森クリーン																
116	九龍泊	青森県むつ市脇野沢	脇野沢	左上	0-300m	10.11	なし	なし			下記	下記		下記		
ガンケ山南西から北海岸へ至る尾根筋																
117	字雲雀平	青森県横浜町	陸奥横浜	左下	0-50m	10.7	なし	なし						なし		
青森牧場周辺																
118	袴腰岳南西	青森県中泊町	中里	右上	40-70m	10.7	なし	なし			カモシカ?	下記		なし		
中里川滝ノ沢、深谷沢砂防小公園～不動の滝																
119	大字蘆架	青森県六ヶ所村	戸娘	右下	0-50m	10.10	なし	なし						なし		
蘆架沼の北岸																
120	梵珠山	青森県青森市	大釈迦	右下	150-250m	10.7	なし	なし						なし		
サワグルミの道～カタタリノ森～ミズバショウの道																
121	ミニ白神	青森県鯉ヶ沢町黒森	種里	右下	290-350m	10.7	なし	なし						なし		
周遊道(内回り)																
122	田代平湿原	青森県青森市	田代平	左下	560-580m	10.10	なし	なし						なし		
田代平の湿原内の本道																
123	くろくまの滝	青森県鯉ヶ沢町	長慶平	右上	170-270m	10.7	なし	なし						なし		
赤石川林道～くろくまの滝																
124	岩木山南麓	青森県弘前市	岩木山	右下	190-210m	10.7	なし	なし						なし		
岩木山神社～求聞寺(高照神社への遊歩道)																
125	紅葉山(板留温泉)	青森県黒石市	温湯	左下	120-180m	10.7	なし	なし						なし		
中野神社～清流の森																
126	酸ヶ湯	青森県青森市	酸ヶ湯	右上	880-910m	10.7	なし	なし						なし		
キャンプ場～公共駐車場～東北大植物園分園～まんじゅうふかし～地獄沼																
127	高温泉	青森県十和田市	八甲田山	右下	470-550m	10.7	なし	なし						なし		
高温泉～高沼～長沼～菅沼～高温泉																
128	高川の西	青森県十和田市	八甲田山	右下	400-600m	10.10	なし	なし						なし		
高トンネル～高温泉																
129	谷地湿原	青森県十和田市	八甲田山	左上	760-780m	10.10	なし	なし						なし		
谷地湿原～湿原内の踏査																
130	傘松峠の湿原	青森県青森市	八甲田山	左上	1000-1010m	10.10	なし	なし						なし		
湿原内の踏査																
131	八甲田山赤倉山	青森県青森市	八甲田山	左上	1300-1310m	10.10	なし	なし						なし		
ロープウェイ駅～赤倉山山頂																
132	十二湖	青森県深浦町	十二湖	右上	200-260m	10.7	なし	なし						なし		○
鶏頭場の池～青池～湧きの池～落口の池～がま池																
133	一ツ森峠	青森県深浦町	白神岳	右上	680-750m	10.7	なし	なし			カモシカ?			なし		
一ツ森峠から太夫峠方面へ接続数m																
134	美山湖	青森県西目屋村川原平	川原平	右下	210-250m	10.7	なし	なし						なし		
砂川学習館(旧砂子藩小学校)裏山																
135	暗門の滝	青森県西目屋村	川原平	左下	240-420m	10.7	なし	なし			カモシカ	糞		なし		
ブナ林散策道コース周回																
136	御鼻部山	青森県平川市	温川	右下	800-820m	10.7	なし	なし						なし		
御鼻部山西方																
137	奥入瀬渓流	青森県十和田市	陸奥焼山	右下	270-320m	10.7	なし	なし			その他	カモシカ	下記	なし		
石ヶ戸～飛金の流れ～雲井の滝～天狗岩																
138	奥入瀬ノ原風岩付近	青森県十和田市	陸奥焼山	右下	300m-	10.10	なし	なし						なし		
国道102号線沿いに南北2kmくらい																
139	十和田湖子ノロ	青森県十和田市	十和田湖東部	右上	400m-	10.10	なし	なし						なし		
国道103号線沿いを南北に2kmくらい																
140	山形町戸呂町	岩手県久慈市	大川目	左下	150-250m	10.11	なし	なし						なし		
戸呂町第一トンネル周辺																
141	山形町霧畑	岩手県久慈市	陸中関	右下	500-650m	10.11	なし	なし						なし		
マネトコ山北側斜面																
142	遠島山	岩手県久慈市	端神	左下	790-1200m	10.6	なし	なし						なし		
遠島山登山道(4合目～9合目)																
143	茂井(安家川流域)	岩手県岩泉町	玉川	左下	90-300m	10.5	なし	なし						なし		
安家川流域の左右岸の山の斜面																
144	藤七温泉	岩手県八幡平市	八幡平	右下	1350m	10.8	なし	なし						なし		
蘆葉境遊歩道																
145	門	岩手県岩泉町	安家	左下	700-800m	10.11	なし	なし						なし		
穴目ヶ岳南斜面																
146	松川自然休養林	岩手県八幡平市	松川温泉	右下	780-810m	10.8	なし	なし						なし		
五葉沼～松川取水堰堤～影沼方面への遊歩道(廃道)																
147	黒森山	岩手県岩泉町江川	門	右上	690-1020m	10.6	一部	軽食						なし		
石峰トンネル～黒森山林道～黒森山牧場～安念部落																
148	秋田駒ヶ岳南麓	岩手県栗石町	国見温泉	左上	850-980m	10.9	なし	なし						なし		
国見温泉～駒ヶ岳登山道(中腹まで)																
149	鼠入	岩手県岩泉町	和井内	右上	750-950m	10.11	なし	なし						なし		
岩泉町鼠入～宮古市和井内																

植生情報第15号 (2011年3月)

踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策					
回答No.	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真
踏査コース・区域					状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)												
150	源兵衛平	岩手県宮古市	峠ノ神山	左下	450-1020m	10.5	一部	軽食	視	下記	カモシカ			なし			
源兵衛平～田代川流域～峠ノ神山南斜面					現地で中を放牧している牧野組合員10名に聞き取りをしたところ、「シカは一昨年0頭、昨年は2頭、今年は4頭を目撃し、今年は牧場内で牧草を食べていた」との証言があった。カモシカの死体(頭骨とヒズメだけ残り、毛が散乱)2頭確認(昨年の調査では無かった)。												
151	松草沢	岩手県宮古市	松草	右上	840-1050m	10.9	一部	軽食			クマ、カモシカ						
松草沢～樺取(達原)					樺取(達原)南側(標高約1,000m付近)まではシカの食痕が確認され、樺取(達原)北側ではシカの痕跡がまだ確認されていない。牧場管理人の証言「2010年になってから単独行動のオスシカを数頭見かけた」												
152	刈原	岩手県宮古市	陸中川井	右上	650-800m	10.11	なし	なし						なし			
高倉沢最上流付近																	
153	花原市	岩手県宮古市	茂市	右上	50-150m	10.11	なし	なし						なし			
華厳院の北側																	
154	千徳	岩手県宮古市	宮古	左上	40-150m	10.11	なし	なし						なし			
国道106号沿いから植林地までの作業道																	
155	岳川支流	岩手県花巻市大迫町岳	早池峰山	右下	800-900m	10.10	相当部分	軽食	道		カモシカ			なし		有害駆除	
清原の滝上流、三次メッシュ59412335					カモシカの影響はあるかもしれないが、シカの影響と区別できない。												
156	大塚部山	岩手県遠野市宮守町連合部	堅沢	左下	760-800m	10.10	ほぼ全域	軽食	声	道	下記	カモシカ		なし		下記	
白石林道より国有林822・826林班界および826林班					ぬた場の拡大、尾根道の踏み荒らし。カモシカの影響も留舞ではないと思われるが、シカの影響と区別できない。毎年同時期にこの地域の踏査をしているが、昨年までは影響がわずかであった。急激な個体数増加があったと推測される。有害鳥獣駆除、巣としてシカ個体数管理の進展あり。												
157	田瀬	岩手県花巻市東和町	宮守	右下	200-250m	10.8	なし	なし						なし			
田瀬ダム周辺																	
158	権現山	岩手県釜石市	能舟木	左下	600-750m	10.11	全域	強食	声	糞	道	崩		なし			
赤柴川上流部の林道																	
159	土瀬町	岩手県遠野市	能舟木	左下	800-850m	10.11	なし	なし						なし			
権現山南西斜面																	
160	早橋	岩手県釜石市	横野	左下	150-300m	10.11	ほぼ全域	軽食	剥	道				なし			
早橋地区周辺の沢沿いの歩道																	
161	洞泉	岩手県釜石市	小佐野	左下	400-700m	10.11	全域	中食	剥	声	糞	道			耕地周辺	ロープ	○
洞泉集落から北に延びる林道沿い																	
162	外山	岩手県釜石市	小佐野	右上	100-250m	10.11	全域	軽食	剥	道					耕地周辺	ロープ	
外山地区周辺の一般道																	
163	甲子町	岩手県釜石市	小佐野	左下	800-870m	10.11	一部	軽食	糞					下記	なし		
洞泉駅北側					風害による倒木など。												
164	上り住権山・五葉山	岩手県住田町	五葉山	右下	700-820m	09.8	全域	強食	糞	道	ラ				耕地周辺	ロープ	
権山林道終点から登山道を北へ。三次メッシュコード58416536																	
165	胆沢区若柳	岩手県奥州市	焼石岳	右上	450-1150m	10.7	なし	なし						なし			
ツバ沼登山口～銀明水																	
166	防沢	岩手県奥州市	石瀬ダム	左下	410-480m	10.5	なし	なし						なし			○
防沢の林道より入山し、防沢と前川に挟まれた山塊のブナ林。																	
167	市野々	岩手県奥州市	石瀬ダム	左下	250-260m	10.5	なし	なし			クマ			なし			○
ひめかゆキー堀の西側のエリアで、ミズバショウ保全地の平坦地を主体にふもとの斜面や、溪谷を観察。					動物による顕著な影響はないが、周辺ではクマが多く確認され、クマの痕跡(フン、寝床、食痕)を過去に確認している。												
168	中板用	岩手県大船渡市	盛	左下	50-250m	10.11	全域	激食	剥	視	糞	道	土				
中板用地区周辺の林内																	
169	吉浜川	岩手県大船渡市三陸町	越喜米	左上	350-400m	10.11	相当部分	強糞						なし			
吉浜川左岸側の南向き斜面					食害による林床植被率の低下。												
170	鍛台山	岩手県大船渡市三陸町	陸前千歳	左上	200-240m	10.11	相当部分	強視						なし			
鍛台山東側の南斜面																	
171	栗駒山	岩手県一関市・秋田県東成瀬村	栗駒山	左上	1000-1628m	09.8	なし	なし			クマ	下記		なし			
須川温泉～剣岳～名残ヶ原～栗駒山頂～鉢岳～須川湖～野鳥の森					クマは棲息するが、ミズバショウの食痕・ブナのクマダナなどで、大きな影響はない。												
172	君が島山	岩手県一関市	折壁	右上	400-450m	10.11	ほぼ全域	軽食	剥	道	下記			なし			○
君ヶ鼻集落周辺のスギ植林地					スギの根際には樹皮剥きあり。												
173	佐戸巻峠	岩手県一関市	折壁	右下	450-540m	10.11	ほぼ全域	軽食	声	道	角研ぎ痕			なし			
佐戸巻峠より尾根沿いを北上。																	
174	栗駒山	宮城県栗原市	栗駒山	右下	650-800m	09.10	なし	なし			クマ	下記		なし			
世界谷地入口駐車場～大地森の下					年によりミズナラにクマ座												
175	種ヶ森	宮城県栗原市	切留	右下	280-300m	10.11	なし	なし									
石株沢沿い林道																	
176	田代	宮城県栗原市	沼倉	右上	150-200m	10.11	なし	なし									
田代地区の森林内																	
177	一迫川台	宮城県栗原市	花山湖	右下	150-170m	10.11	なし	なし						なし			
川台地区周辺のスギ植林地内。																	
178	向原	宮城県栗原市	岩ヶ崎	左上	60-100m	10.11	なし	なし						なし			
向原地区農道沿いおよび落葉広葉樹林内。																	
179	大土ヶ森	宮城県栗原市	岩ヶ崎	左上	150-250m	10.11	なし	なし									
放森地区周辺の林道																	
180	木売沢	宮城県栗原市	金成	右上	40-60m	10.11	なし	なし					マツ枯れ	なし			
木売沢集落周辺																	
181	翁沢	宮城県栗原市	金成	左上	30-40m	10.11	なし	なし						なし			
翁沢集落北西側のスギ植林地内。																	
182	上羽沢	宮城県登米市	米谷	右下	130-300m	09.8	なし	なし			カモシカ	食痕		なし			
上羽沢地区から北(朝田貫地区)へ向う林道					昨年あたりからニホンシカが目撃され始めた地域である。カモシカが生息しているため、食痕での判断は出来なかった。2009年9～11月ごろに個体が目撃されている。資料有り(報告書)。												
183	熊栗沼	宮城県大崎市	高清水	右上	5m	09.10	なし	なし									
田尻熊栗、熊栗沼																	
184	河北血貝	宮城県石巻市血貝	飯野川	右下	200-250m	09.8	一部	軽食	道					なし			○
河北血貝～清水田林道																	
185	大倉山	宮城県大和町	升沢	左下	700-750m	10.5	なし	なし			クマ	フナに爪痕		なし			○
大倉山北西側					現在、シカは分布していない地域である。植生調査資料有り。												
186	長窪	宮城県大和町	七ッ森	左下	70-110m	10.5	なし	なし						なし			○
長窪集落南西側					現在、シカは分布していない地域である。植生調査資料有り。												
187	龍峰山	宮城県石巻市	石巻	右上	160-350m	10.10	なし	なし						なし			
石巻霊園～龍峰山山頂																	
188	トヤケ森山	宮城県石巻市	石巻	左下	10-170m	10.10	なし	なし						なし			
石巻専修大学～トヤケ森山山頂																	

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答 No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策			写真	
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類		その他のシカ対策
踏査コース・区域					状況記述 (影響に備りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)												
189	針浜	宮城県女川町	女川	右下	20-200m	09.8	相当部分	中	食、剥、声、糞、道	なし	なし	なし	マツ枯れ	耕地・植林周辺	下記	下記	○
女川町針浜林道					ロープ、漁網による防護柵。その他、有害捕獲、可猟区の設定、囲い設置。												
190	雄勝町水浜	宮城県石巻市	女川	右上	200m	09.8	一部	中	食、剥、糞、道			なし	なし	なし	なし	なし	○
雄勝町水浜林道																	
191	京ヶ森	宮城県石巻市	女川	左下	20-280m	10.10	一部	軽	食、糞				なし				
県道234号～京ヶ森山頂																	
192	雄鹿半島	宮城県石巻市	奇磯	左下	300-400m	09.8	全域	激	食、剥、視、声、糞	ヤマビル	なし	なし	マツ枯れ	耕地・植林周辺	下記	下記	○
石巻市大原浜・大草山					ロープ、漁網による防護柵。その他、有害捕獲の実施、可猟区の設定。												
193	牧ノ崎	宮城県石巻市	網地島	右上	10-100m	09.8	ほぼ全域	激	食、剥、糞、道、土				マツ枯れ	なし			○
牧ノ崎					タブノキの樹皮の被害が目立つ。												
194	清崎	宮城県石巻市	金華山	左上	30-50m	09.9	全域	強	食、剥、糞、道				マツ枯れ	なし		下記	○
金華山					有害鳥獣駆除が実施されているはず。												
195	金華山	宮城県石巻市	金華山	左上	20-450m	09.5	全域	激	食、剥、視、糞、道、土				マツ枯れ	自然植生内	ロープ・金網		○
黄金山神社から金華山山頂を経由して、亀石まで。					海岸付近はシカの密度が高いためか、マツ林の下はシバ草状になっており、土壌の流出も一部見られる。植生調査資料有り。												
196	青葉山 (佐保山)	宮城県仙台市	仙台南西部	右上	150m	10.5	なし	なし					なし				○
佐保山一帯																	
197	支倉	宮城県川崎町	村田	左上	165-170m	10.10	なし	なし					なし				
前川沿い (県道14号～釜房湖)																	
198	八森水の目沢	秋田県八峰町	中浜	右下	200-230m	10.8	なし	なし									
田代長坂																	
199	田代長坂	秋田県大館市	早口	左下	100-130m	10.9	なし	なし									
森吉山麓高原																	
200	森吉山麓高原	秋田県北秋田市	森吉山	右上	740m	10.8	なし	なし									
玉川温泉																	
201	玉川温泉	秋田県仙北市	玉川温泉	右上	750m	10.8	なし	なし									
フナ森駐車場～その東方の周回遊歩道																	
202	大塚谷地	秋田県鹿角市	八幡平	左上	970m	10.8	なし	なし									
湿原木道往復																	
203	椿	秋田県男鹿市	船川	左下	40-70m	10.6	なし	なし									
八郎湯																	
204	八郎湯	秋田県湯上市江川	船越	右上	約5m	10.10	なし	なし									
秋田県立大学																	
205	秋田県立大学	秋田県秋田市下新城中野	土崎	左上・左下	5-30m	10.10	なし	なし									
秋田県立大学～秋田火力発電所～海岸域																	
206	乳頭温泉郷	秋田県仙北市	秋田駒ヶ岳	左上	780-890m	10.8	なし	なし									
国民休暇村～空吹温泉																	
207	田沢湖高原	秋田県仙北市	秋田駒ヶ岳	左下	630-690m	10.9	なし	なし									
大森山公園																	
208	大森山公園	秋田県秋田市浜田	秋田西部	左下	約50m	10.10	なし	なし									
ノースアジア大学																	
209	ノースアジア大学	秋田県秋田市下北手桜	秋田東部	左上	約20m	10.10	なし	なし									
ノースアジア大学構内																	
210	田沢湖	秋田県仙北市	田沢湖	右上	250m	10.8	なし	なし									
県民の森駐車場～かえる石附近の湖畔																	
211	田沢湖	秋田県仙北市	田沢湖	右上	260m	10.9	なし	なし									
桂浜																	
212	桂浜	秋田県秋田市下桂浜	羽川	右上・右下	約5m	10.10	なし	なし									
桂浜～長浜 (海岸域)																	
213	雄和	秋田県秋田市	羽後和田	右上	70m	10.9	なし	なし									
抱返り溪谷																	
214	抱返り溪谷	秋田県仙北市	抱返り溪谷	左下	100-130m	10.9	なし	なし									
抱返り神社～回廊 (みかえり) の滝																	
215	乙越沼・泉沢溜池	秋田県大仙市	刈和野	左上	15-20m	10.10	なし	なし									
乙越～九升田 (乙越沼)、協和種 (泉沢溜池)																	
216	親川	秋田県由利本荘市	岩谷	左上	0-50m	10.9	なし	なし					なし				
親川集落周辺																	
217	大内三川	秋田県由利本荘市	新沢	左下	150-200m	10.9	なし	なし					なし				
国道105号～権現山登山道																	
218	中俣	秋田県由利本荘市	新沢	右上	50-100m	10.9	なし	なし					なし				
鬼ヶ台集落周辺																	
219	真壁岳	秋田県大仙市	真壁岳	左上・右上	380-900m	10.9	なし	なし									
峰越林道 (北の又沢～峠)																	
220	雄物川河岸	秋田県横手市・大仙市	角間川	右上	30m	10.10	なし	なし									
横手市大森町板井田小中島の左岸～大仙市角間川町愛宕町大川橋・秋田自動車道 雄物川第一農付近の右岸																	
221	黒森山	秋田県美郷町	左草	左上	690-760m	10.9	なし	なし									
町道黒森峠～山頂																	
222	金峰山	秋田県横手市	十文字	右上	300-450m	10.9	なし	なし									
道路～北東側からの登山道～山頂																	
223	鳥海笹子	秋田県由利本荘市	上笹子	左下	380m	10.8	なし	なし									
橋台																	
224	橋台	秋田県東成瀬村	橋台	左上	200-400m	09.5	なし	なし					なし				○
東成瀬村内					シカ生息なし。カモシカは生息あり。												
225	東成瀬析倉	秋田県東成瀬村	橋台	左上	550m	10.8	なし	なし									
栗駒山北面																	
226	栗駒山北面	秋田県東成瀬村	栗駒山	左上	1000-1450m	09.5	なし	なし					なし				○
須川湖～鉢岳～須川湖					シカ生息なし。植生調査資料、学会発表有り。												
227	女鹿	山形県遊佐町	小砂川	左下	5-30m	10.8	なし	なし					マツ枯れ	なし			
女鹿の国有林内 (タブノキ遺伝子保存林)																	
228	鳥海山飯ヶ森	山形県遊佐町	鳥海山	左上	1180-1200m	10.7	なし	なし									
矢島口～竜ヶ原～飯ヶ森温泉																	

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策			写真
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	
踏査コース・区域					状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)											
229	鳥海山	山形県遊佐町	鳥海山	左下	1080-2160m	10.7	なし	なし								
大平口～御浜～山頂小屋																
230	野沢	山形県遊佐町	吹浦	左上	150-200m	10.9	なし	なし						なし		
長坂畜産団地周辺																
231	鳥海山	山形県酒田市	湯ノ台	左下	370-500m	10.9	なし	なし			カモシカ	下記	下記	なし		
日向川流域					低木類にカモシカによるとされる食痕あり。その他、ウエツキバナハムシによる被害あり。											
232	高坂ダム上流	山形県真室川町	丁岳	左下	200-500m	09.6	なし	なし								
丁岳山口～林道沼ノ台支線終点大沼																
233	加無山	山形県真室川町	松ノ木峠	左下	300-950m	09.9	なし	なし								
加無山登山道入口～加無山山頂付近																
234	籠山	山形県真室川町	松ノ木峠	右下	650-950m	09.7	なし	なし								
前森林道終点～男女のコル～男籠																
235	五台沼	山形県酒田市中青沢	羽後観音寺	右上	150-200m	10.9	なし	なし						なし		
五台沼周辺																
236	大長峯	山形県酒田市麓	羽後観音寺	右上	100-200m	10.9	なし	なし						なし		
八森自然公園周辺																
237	下青沢	山形県酒田市	升田	左下	120-220m	10.8	なし	なし								
五台沼北西の湖沼群周辺																
238	中村	山形県真室川町	大沢	右上	130-160m	09.6	なし	なし								
中村湿原内、湿原辺縁部の森林内～付近の湖沼群周辺																
239	西小俣林道	山形県真室川町	大沢	左上	200-250m	10.6	なし	なし								
西小俣林道起点～終点																
240	林道秋山栗谷沢線	山形県真室川町	大沢	右上	130-140m	10.7	なし	なし								
林道秋山栗谷沢線																
241	高館山	山形県鶴岡市	湯野浜	左下	40-200m	10.7	なし	なし					ナラ枯れ	なし		
鶴岡市大山公園から城山コースを往復																
242	林道羽州湯の里線	山形県鮭川村	羽根沢温泉	左上	100-640m	10.7	なし	なし								
羽根沢温泉～羽根沢林道～酒田市との境界																
243	曲川	山形県鮭川村	羽根沢温泉	右上	100-180m	10.7	なし	なし								
日山林道～庭月観音																
244	泉田	山形県新庄市	新庄	左上	110-150m	09.6	なし	なし								
点在するため池分布区域																
245	権現山	山形県最上町	瀬美	右上	約600-800m	10.7	なし	なし								○
溪流公園～林道～小溪流沿いに登っていった																
246	熊野長峰	山形県鶴岡市	三瀬	右下	390-430m	10.6	なし	なし								
中山口～龍頭ヶ池～熊野長峰山頂																
247	肝煎	山形県庄内町	木の沢	左下	150-200m	10.11	なし	なし						なし		
立谷川沿いの樹林内																
248	畑	山形県新庄市	古口	右上	50-70m	09.6	なし	なし								
白ヶ沢湿原内、湿原辺縁部の森林内～材木沼周辺																
249	堺田	山形県最上町	羽前赤倉	右上	290-310m	10.6	なし	なし								
堺田駅南西スキー場跡地																
250	赤倉	山形県最上町	羽前赤倉	左上	300-450m	09.9	なし	なし								
赤倉スキー場内と周辺森林																
251	湯温海	山形県鶴岡市	山五十川	左下	600-620m	10.11	なし	なし			カモシカ	糞		なし		
温海岳麓																
252	立谷沢	山形県庄内町	大綱	右上	280-300m	10.8	なし	なし								
大池と南部周辺湖沼群																
253	浄ノ滝	山形県大蔵村	立谷沢	右上	260-590m	09.8	なし	なし								
浄ノ滝遊歩道入口～浄ノ滝～浄ノ滝上部																
254	肘折	山形県大蔵村	肘折	右下	230-260m	09.6	なし	なし								
長沼～男沼～女沼																
255	今神御池	山形県戸形村	肘折	左上	300-420m	09.7	なし	なし								
今神温泉手前登山口～今神御池																
256	手倉森	山形県舟形町	海谷	左上	120-140m	09.5	なし	なし								
手倉森湿原内、湿原辺縁部の森林内																
257	鍋越峠	山形県尾花沢市	魚取沼	左下	230-620m	10.6	なし	なし								
鍋越峠～宝栄牧場～銀山温泉																
258	翁山クルミ平	山形県尾花沢市	魚取沼	左上	450-690m	10.11	なし	なし								
林道高森線～クルミ平の湿原、湖沼群																
259	鍋倉	山形県鶴岡市	鼠ヶ関	右上	100-300m	10.11	なし	なし						なし		
鍋倉集落から源蔵山麓																
260	山形大上名川深層林	山形県鶴岡市上名川	上田沢	右上	220-520m	10.8	なし	なし					ナラ枯れ	なし		
早田川から戸沢沿いへ																
261	念仏ヶ原	山形県大蔵村	月山	右上	540-1070m	09.8	なし	なし								
月山登山道肘折口～小岳～念仏ヶ原																
262	月山	山形県庄内町	月山	左上	1440-1980m	10.8	なし	なし								
弥陀ヶ原～山頂～行者ヶ原～弥陀ヶ原																
263	月山	山形県西川町	月山	左下		09.9	なし	なし								○
姥ヶ岳～月山山頂																
264	鶴子	山形県尾花沢市	銀山温泉	左上	260-440m	10.6	なし	なし								
銀山温泉～鶴子																
265	大鳥	山形県鶴岡市	大鳥	左下	320-750m	10.11	なし	なし			下記			なし		
四郎岳登山道(東大鳥ダム～山頂)					サル(足跡)、クマ(糞)、カモシカ(糞)											
266	月山弓張平	山形県西川町	本道寺	左上	600-670m	10.6	なし	なし								
弓張平公園パークプラザ東側散策路																
267	堂の前	山形県東根市	楠岡	左下	110-390m	10.8	なし	なし								
堂の前公園裏山の車道																
268	水無山	山形県東根市	船形山	左下	700-1030m	10.8	なし	なし								
スキー場ゲレンデ～水無山山頂周辺																
269	沼の平	山形県東根市	船形山	左上	370-930m	10.10	なし	なし								
林道ムクロ沢線～沼の平湿原																

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響				地域全般のシカ対策			
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真
踏査コース・区域					状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)												
270	ジャガラムゴラ	山形県天童市	天童	右下	540-580m	10.9	なし	なし									
ジャガラムゴラ歩道入口～ジャガラムゴラ																	
271	針生平	山形県小国町五味沢	徳綱	右上	440-1080m	10.10	なし	なし						なし			
針生平～角積小屋～大朝日岳方面																	
272	祝瓶山	山形県長井市寺泉	羽前葉山	左下	570-670m	10.9	なし	なし						なし			
祝瓶山～桑住平																	
273	小枕山	山形県小国町金目	五味沢	右上	500-840m	10.10	なし	なし						なし			
小枕山トンネル東の駐車帯～おぐに白い郷土の森～小枕山山頂																	
274	金目川	山形県小国町金目	五味沢	右下	300-950m	10.10	なし	なし		クマ	爪痕			なし			
金目集落から金目川沿いを上流方向へ～孫守山西の953mピーク																	
275	朴ノ木峠	山形県小国町	小国	右上	350-420m	10.8	なし	なし						ナラ枯れ	なし	○	
健康の森"よこね"遊歩道																	
276	大字市野沢	山形県小国町	小国	右下	200-250m	10.6	なし	なし						なし			
足水川周辺																	
277	温身平	山形県小国町大字小玉川	長者原	左下	400-440m	10.8	なし	なし						ナラ枯れ	なし	○	
飯豊山荘～温身平																	
278	大字子玉川	山形県小国町	飯豊山	左上	450-550m	10.6	なし	なし						なし			
梅花皮沢周辺																	
279	白布温泉	山形県米沢市関	白布温泉	右下	850-1200m	10.10	なし	なし						なし			
白布温泉～若女平																	
280	西吾妻山	山形県米沢市関	吾妻山	左上	1320-2035m	10.10	なし	なし						なし			
天元台～中大巖～天狗岩～西吾妻山																	
281	手倉山	福島県相馬市	青葉	左上	390-672m	10.8	なし	なし						なし			
山頂付近、松が男大木付近林道入り口～南中麓																	
282	松川浦大洲	福島県相馬市	相馬中村	右上	0-3m	10.9	なし	なし						マツ枯れ	なし		
鶴の尾岬灯台下塩性湿地～四季の花園																	
283	デコ平	福島県北塩原村松原	松原湖	右上	837-1300m	09.8	なし	なし						なし			
早稲沢～デコ平～早稲沢																	
284	裏磐梯ノ五色沼	福島県北塩原村	磐梯山	右上	790m	10.7	なし	なし						なし			
毘沙門沼西半分の湖岸。ボート乗り場から時計回り。																	
285	裏磐梯ノ五色沼	福島県北塩原村	磐梯山	右上	820-840m	10.7	なし	なし						なし			
柳沼・父沼・母沼から入り沼まで。探勝路沿い。																	
286	安達太良山	福島県二本松市	安達太良山	左上	770-1650m	10.10	なし	なし						なし			
塩沢温泉～八幡滝～くろがね小屋～牛の背																	
287	安達太良山東山麓	福島県大玉村	玉井	右上	650-690m	10.8	なし	なし						なし			
フォレストパークあだたら養魚の森から森林セラピーコース																	
288	熱海町	福島県郡山市	磐梯熱海	右下	300-350m	10.10	なし	なし						なし			
安子島～上伊豆島																	
289	浜尾遊水地	福島県須賀川市	須賀川東部	左下	234m	10.9	なし	なし					下記	なし			
遊水地内一周																	
290	黒谷	福島県只見町	城郭朝日岳	左下	600-1400m	10.6	なし	なし						なし		○	
黒谷川流域																	
291	甲子温泉	福島県会津市	新甲子	左下	約800m	10.7	なし	なし		ウサギ						○	
甲子トンネル周辺。道路周辺のミズナラ二次林。																	
292	南湖	福島県白河市	白河	右下	365m	10.9	なし	なし						マツ枯れ	なし		
南湖の周りを一周																	
293	会津駒ヶ岳	福島県楡枝坂村	会津駒ヶ岳	右下	1000-2130m	09.8	一部	軽食糞	遺					なし		○	
会津駒ヶ岳滝沢口～頂上～中門岳～大津峠～キリンテ																	
294	尾瀬ノ縫衣林道	福島県楡枝坂村	縫ヶ岳	左上	1415-1500m	10.6	一部	軽食糞	ウラ	クマ	クマ糞			なし		○	
見晴～御池																	
295	高柴ダム	福島県いわき市田人町	上平石	右下	20-100m	10.9	なし	なし						なし			
井戸沢、ダム手前。林道沿い																	
296	勿来海岸	福島県いわき市	勿来	左下	0m	10.10	なし	なし					下記	なし			
海岸砂浜沿い																	
297	鮫川河口	福島県いわき市	勿来	右上	0m	10.10	なし	なし					下記	なし			
河口北東側砂洲																	
298	八溝山	茨城県大子町	八溝山	左下	720-1020m	10.10	なし	なし		なし	イノシシ	下記		なし			
山頂付近、日輪寺ハイキングコース																	
299	八溝山	茨城県大子町	町付左上/八溝山左下		393-1022m	10.10	なし	なし						林業	なし		
蛇穴バス停～八溝山緑林道～日輪寺～八溝山～白毛水～金性水～往路																	
300	小川学参林	茨城県北茨城市関本町	磐城片貝	右上	610-660m	09.7	なし	なし						なし			
宇定波、森林総合研究所小川試験地内																	
301	月居山	茨城県大子町	袋田	左上	90-404m	10.5	なし	なし						なし			
袋田駅～袋田の滝～月居山～袋田温泉ホテル前～袋田駅																	
302	長福山	茨城県大子町	大中宿	左下	70-496m	10.5	なし	なし						なし			
上小川駅～南中学校～長福山～長福寺～滝倉入口～上小川駅																	
303	奥久慈男体山	茨城県大子町	大中宿	左下	66-654m	09.9	なし	なし						なし			
西金駅～湯沢温泉～大円地登山口～奥久慈男体山～男体神社～上小川駅																	
304	十王海岸	茨城県日立市	高萩	右下	0m	10.2	なし	なし						マツ枯れ	なし		
海岸沿い																	
305	御前山	茨城県城里町	野口	右下	20-180m	10.11	なし	なし			イノシシ	下記	盗掘	なし			
御前山バス停～赤沢林道～西登山口～鐘撞堂～御前山バス停																	
306	仏頂山	茨城県笠間市	羽黒	右上	140-310m	10.10	なし	なし						なし			
傍巖寺(りょうごんじ)～開東ふれあいの道～山頂西側1km手前的小ピーク																	
307	佐白山	茨城県笠間市	笠間	左上	150-180m	10.10	なし	なし						なし			
千人溜駐車場～佐白山城跡公園																	
308	加波山	茨城県桜川市	加波山	左上	400-709m	10.10	なし	なし						なし			
真壁町長岡～山楸魚谷～加波山神社社務所～山頂																	
309	上釜	茨城県鉾田市	磯浜	右下	0m	10.4	なし	なし		ウサギ	稚樹食害	マツ枯れ	なし			○	
海岸沿いを踏査					ウサギの食害はあるがシカは分布していない。												

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答 No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響		シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策			写真			
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置		防護柵の種類	その他のシカ対策	
踏査コース・区域						状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)											
310	筑波山 男体山周回 (自然研究路) ~ 女体山	茨城県つくば市	筑波	右上	730-875m	10.10	なし	なし				下記	なし				
311	筑波山 筑波山神社 (白雲橋コース) ~ 女体山 ~ 男体山 ~ 筑波神社 (御幸ヶ原コース)	茨城県つくば市	筑波	右上	約300-877m	10.10	なし	なし					なし		○		
312	茶臼岳 那須ロープウェイ山頂駅 ~ ケーブル首ノ峰 ~ 茶屋跡避難小屋 ~ 山頂駅	栃木県那須町	那須岳	右下	1588-1915m	10.6	なし	なし					なし				
313	富士山 富士山登山口 ~ 山頂	栃木県那須塩原市	塩原	左下	950-1200m	10.8	相当部分	中	食・糞・道				なし		○		
314	富士山 新湯 ~ 富士山 ~ 大沼	栃木県那須塩原市	塩原	左下	950-1200m	09.5	一部	軽	食・剥				なし		○		
315	奥鬼怒自然歩道 女夫湯温泉 ~ 加仁湯	栃木県日光市	川俣温泉	左上・左下	1120-1340m	09.8	相当部分	軽	食				なし		○		
316	土呂部 オホツバ沢林道 (ミズバショウ群生地 ~ ススキ草地)	栃木県日光市	川俣湖	右上	910-920m	09.8	相当部分	軽	食	サル			ロープ・金網		○		
317	土呂部 土呂部地域内の探草地を中心に車で移動し踏査	栃木県日光市	川俣湖	右上	900-960m	10.10	一部	中	糞・道	ラ		下記	下記	自然植生内(下記)	金網	○	
318	川俣湖 川俣中学裏山	栃木県日光市	川俣湖	左下	1040-1140m	09.8	一部	軽	食	サル		下記	下記	耕地周辺(サル)	金網	○	
319	龍王峡 龍王峡駅 ~ 川治温泉駅 ~ 川治湯元駅 (龍王峡自然研究路)	栃木県日光市	川治	右下	400-500m	09.10	一部	軽	食・道				なし		○		
320	奥日光・湯ノ湖 湯ノ湖周辺とバス停光徳入口付近	栃木県日光市	男体山	左上	1400-1500m	10.10	相当部分	強	食・糞・道				なし	自然植生内	ロープ	○	
321	切込湖・刈込湖 光徳 ~ 山王峠 ~ 刈込湖 ~ 湯元	栃木県日光市	男体山	右上・左上	1450-1700m	10.9	相当部分	軽	食					なし		○	
322	刈込湖 刈込湖西側湖畔	栃木県日光市	男体山	左上	1640m-	10.10	ほぼ全域	強	声・糞・道	足跡			なし		○		
323	戦場ヶ原東部 三本松の森林内、長さ1kmくらい?	栃木県日光市	男体山	右下	1400m-	10.10	ほぼ全域	中	ラ								
324	小田代ヶ原 赤沼 ~ 小田代ヶ原周回	栃木県日光市	男体山	左下	1400-1430m	09.9	ほぼ全域	激	食・剥・視・声・糞・道・ラ					自然植生内(湯原)	電気柵	○	
325	戦場ヶ原 戦場ヶ原 ~ 光徳 (逆川左岸)	栃木県日光市	男体山	左下	1400-1420m	09.6	全域	強	食・剥・視・声・糞・道					自然植生内	金網	○	
326	東照宮周辺 東武日光駅 ~ 東照宮 ~ 滝尾神社 ~ 東武日光駅	栃木県日光市	日光北部	右下	530-800m	10.8	一部	中	食・糞・道	サル		下記		植生周辺	ロープ	○	
327	男体山 二荒山神社前 ~ 八合目 ~ 二荒山神社前	栃木県日光市	中禅寺湖右上/男体山右下	1274-2300m	10.8	相当部分	中							自然植生内	プラスチック網	○	
328	千手ヶ原 弓張峠 ~ 西ノ湖 ~ 千手ヶ原	栃木県日光市	中禅寺湖	左上	1270-1300m	09.7	全域	激	食・剥・視・声・糞・道・ラ					自然植生内(一部)	金網	○	
329	中宮祠 大平 (中禅寺湖北岸、丸山西側)	栃木県日光市	中禅寺湖	右上	1320-1360m	09.7	全域	強	食・剥・糞・道・ラ					なし		○	
330	鳴虫山 東部日光駅 ~ 神ノ山 ~ 鳴虫山 ~ 合方 ~ 並び地蔵 ~ 総合会館 ~ 駅	栃木県日光市	日光南部	右上	530-1104m	10.5	ほぼ全域	中						植生周辺	プラスチック	○	
331	日光植物園 日光植物園	栃木県日光市	日光南部	右上	650m-	10.8	一部	軽		足跡				自然植生内	下記		
332	三ノ宿山 真大戸川上流、日光沢沿い、大奥の上流から三ノ宿山方面 (露原には至らず)、車上および徒歩。	栃木県鹿沼市	日光南部	右下	630-960m	10.9	一部	中	食・道					なし			
333	馬頭 女体山 (健武) ~ 大内 ~ 鷺子山手前 (矢欠の232号沿い)	栃木県那須町	馬頭	右上	300-400m	10.10	なし	なし		イノシシ	下記			なし			
334	庚申7滝 庚申山登山口 ~ 庚申7滝 (一本道)	栃木県日光市	足尾	左上	800-1070m	10.9	一部	中	食					なし			
335	古賀志山 大日堂から赤石山を経て尾根沿いに西へ	栃木県宇都宮市古賀志町	大谷	左下	450-535m	10.9	なし	なし						なし	なし		
336	不動岳周辺 不動岳周辺	栃木県佐野市	中粕尾	左下	250-600m	10.11	一部	中	食・剥・声・糞・道				イノシシ	農業被害	耕地周辺	金網・電気柵	
337	大鳥屋山 大鳥屋山 ~ 五衆の滝周回	栃木県佐野市	仙波	左上	250-600m	10.10	ほぼ全域	軽	食・剥・声・糞・道				イノシシ	農業被害	耕地周辺	金網・電気柵	○
338	高館山 西明寺から高館山山頂付近まで	栃木県益子町	真岡	右下	150-300m	10.10	なし	なし					イノシシ	土の掘り返し	なし	なし	
339	須花トンネル周辺 須花トンネル付近の尾根	栃木県足利市	足利北部	右上	200-350m	10.11	ほぼ全域	軽	食・剥・糞・道				イノシシ	農業被害	耕地周辺	金網・電気柵	○
340	八剣神社奥 八剣神社 ~ 325mピーク	栃木県佐野市	田沼	左上	150-325m	10.11	一部	軽	食・剥				イノシシ	農業被害			
341	太平山 六角堂 ~ あじさい坂 ~ 太平山神社奥社 ~ 鎌倉平 ~ 少年自然の家 ~ 六角堂	栃木県栃木市平井町	栃木	右下	120-300m	10.11	なし	なし						なし			
342	兎石山・太平山 岩舟駅 ~ 馬不入山 ~ 兎石山 ~ 太平山 ~ 国学院前バス停	栃木県太田町・岩舟町	下野藤岡左上/栃木左下	30-419m	10.4	なし	なし					下記	なし				
343	小松温泉 大清水から奥鬼怒スパー林道で入山、中ノ岐沢を遡上 ~ 黒岩山 (栃木県との境線)。北西に隣接する尾根まで直線で約5kmほどの地点、オオシラビソに囲まれた1haに満たない窪地。	群馬県片品村	川俣温泉	左上	1910m	09.8	全域	激	食・剥・声・糞・土					なし	なし	○	
344	白毛門 土合駅 ~ 白毛門 (途中)	群馬県みなかみ町	茂倉岳	右下	661-1650m	10.9	なし	なし						なし			
345	谷川岳 天神峠展望台 ~ トマの耳 ~ オキの耳	群馬県みなかみ町	水上	左上・右上	1500-1977m	10.8	なし	なし									
346	茂倉沢 赤谷川との合流点から茂倉沢を上流へ	群馬県みなかみ町	水上	左下	630-680m	09.7	ほぼ全域	軽	食	サル				なし			
347	玉原高原 玉原湖周辺及び玉原温泉、プナ平、ペンション村	群馬県沼田市	藤原湖	右下		10.6	なし	なし						なし			
348	丸沼高原スキー場周辺 丸沼高原スキー場 ~ 丸沼	群馬県片品村	丸沼	右上	1400-1500m	09.7	相当部分	中	食・剥・視・声・糞・道・ラ					なし			

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響				地域全般のシカ対策			
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真
踏査コース・区域																	
状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)																	
387	平山町	千葉県千葉市緑区	蘇我	右上	20-40m	10.11	なし	なし									
388	権現の森	千葉県長柄町	海士有木	右下	135-173m	10.12	なし	なし									
389	高倉観音	千葉県木更津市	木更津	右下	90-100m	10.1	なし	なし									
390	笠森観音	千葉県長南町	鶴舞	右上	50-80m	10.12	なし	なし									
391	富津公園	千葉県富津市	富津	左上	0-2m	10.7	なし	なし									
392	市原市民の森	千葉県市原市月崎	大多喜	左上	70-130m	10.7	一部	軽	食、声、糞、土					なし			
393	梅ヶ瀬渓谷	千葉県市原市	大多喜	左下	30-242m	10.6	一部	軽						なし			
394	高岩沢	千葉県君津市	坂畑	左下	125-155m	09.9	なし	なし									
395	高岩沢	千葉県君津市	坂畑	左下	125-155m	10.10	相当部分	中	食、声、道					なし			
396	東大業演習林	千葉県君津市	坂畑	右下	100-250m	10.7	全域	強	食、視、声、糞、土	ヤマビル	イノシシ	土壌攪乱	マツ枯れ	耕地・樹林周辺	金網、電気柵		
397	三石山	千葉県君津市	坂畑	右上	100-282m	11.1	一部	軽	道			下記	農業被害	植林	耕地周辺	電気柵	○
398	豊英島	千葉県君津市	坂畑	左下	110-130m	10.3	ほぼ全域	中	食、剥、視、糞、道			下記	下記	下記	下記	下記	○
399	石尊山	千葉県君津市	上総中野	左上	150-348m	10.12	全域	中	食、剥、土		下記	イノシシ	土壌攪乱	耕地周辺	電気柵	ネット	○
400	荒木根山	千葉県勝浦市	御宿	左上	80-135m	10.12	相当部分	軽	食					なし			
401	吉浜川周辺	千葉県館南町	保田	右上	10-100m	09.1	一部	軽	食、糞		イノシシ			なし		○	
402	鑑山	千葉県富津市	館南町	右上	10-300m	10.2	なし	なし									
403	大山不動尊	千葉県鴨川市	金東	右上	180-218m	10.6	なし	なし									
404	伊予ヶ岳	千葉県南房総市	金東	左下	63-308m	09.9	なし	なし						なし			
405	富山南斜面	千葉県南房総市	富山町	左下	50-350m	10.11	なし	なし			イノシシ	斜面の掘り返し		なし		○	
406	金山ダム	千葉県鴨川市	鴨川	右上	70-80m	10.6	ほぼ全域	中	食					耕地周辺	ロープ		
407	内浦山民の森	千葉県鴨川市	安房小湊	右上	70-250m	10.12	ほぼ全域	強	食、道、土		イノシシ	土壌攪乱		下記			
408	那古	千葉県館山市	那古	右下	0-80m	10.9	なし	なし			イノシシ	下記		なし			
409	石堂寺	千葉県南房総市	安房古川	右上	60-100m	10.4	なし	なし						なし			
410	館山野鳥の森	千葉県館山市	館山	右下	30-100m	10.12	なし	なし									
411	高塚山	千葉県南房総市	千倉町	右下	0-216m	10.12	なし	なし									
412	小松寺	千葉県南房総市	千倉町	左上	50-120m	10.11	なし	なし						なし		○	
413	根本海岸	千葉県南房総市	白浜	右上	0-5m	10.5	なし	なし									
414	雲取山	東京都奥多摩町	雲取山	右下	1000-2017m	10.9	ほぼ全域	激	食、剥、視、糞、道、土				ササ開花枯死	下記	ネット	下記	○
415	川桑谷	東京都奥多摩町	武蔵日原	右下	640-860m	10.11	ほぼ全域	中	食、剥、道					なし			
416	成木川	東京都青梅市	原市場	左下	350-760m	10.10	相当部分	中	食、剥					なし			
417	鹿ノ巣山	東京都奥多摩町	奥多摩湖	左上・右上	1620-1730m	09.9	全域	激	食、剥、視、糞、道、土					自然植生内		○	
418	東大業演習林	東京都奥多摩町	奥多摩湖	右上	600-800m	09.6	ほぼ全域	強	食、剥、視、糞、道、土					植生調査資料有り		○	
419	高水三山	東京都青梅市	武蔵御岳	右上	250-793m	10.4	ほぼ全域	強	土、落					なし		○	
420	御岳山	東京都青梅市	武蔵御岳	左下	350-840m	10.6	なし	なし									
421	高水三山	東京都青梅市	武蔵御岳	左上・右上	241-793m	09.5	なし	なし									
422	霞丘	東京都青梅市	青梅	左上	170-226m	10.11	なし	なし									
423	青梅丘陵	東京都青梅市	青梅左下/武蔵御岳右下		160-350m	10.12	なし	なし							下記	○	
424	野山北・六連山公園	東京都武蔵村山市	所沢	左下	130-160m	10.7	なし	なし									
425	三頭山	東京都檜原村	猿丸	左上	1000-1500m	09.4	一部	軽	食、剥					自然植生内	ロープ	○	

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策				
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真
踏査コース・区域					状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)												
466	箱根三国山	神奈川県箱根町	箱根	右上	900-1000m	10.6	一部	軽	糞					なし		○	
三国山東斜面					資料有り (植生調査資料、学会発表、報告書)												
467	幕山	神奈川県湯河原町	箱根	右上	190-625m	09.10	なし	なし									
幕山公園バス停～幕山～南郷山分岐～大石ヶ平～幕山公園バス停																	
468	芦ノ湖畔白浜	神奈川県箱根町	箱根	左下	730m	10.8	一部	中	食、道		イノシシ	掘り返し		なし		○	
芦ノ湖西岸遊歩道入口付近					林下の平坦地。												
469	箱根駒ヶ岳	神奈川県箱根町	箱根	左上	1150-1240m	10.8	なし	なし			イノシシ	下記		なし		○	
駒ヶ岳～神山鞍部の往復					イノシシによる掘り起こしやケモノ道。												
470	箱根お玉が池	神奈川県箱根町	箱根	左下	780m	10.8	なし	なし									
お玉が池周遊																	
471	真鶴半島	神奈川県真鶴市	真鶴岬	左上	0-96m	10.11	なし	なし						なし			
ケープ真鶴バス停～三ツ石海岸～番場浦海岸～灯明山～ケープ真鶴バス停					シカがいるような場所ではないと思ったが一応回答してみた。												
472	毘沙門・鶴崎	神奈川県三浦市	三浦三崎	右上	0-20m	10.12	なし	なし									
城ヶ島大橋バス停～毘沙門海岸～江奈湾沿い～鶴崎燈台～鶴崎バス停					シカがいるような場所ではないと思ったが一応回答してみた。												
473	城ヶ島	神奈川県三浦市三崎町	三浦三崎	左上	0-25m	10.11	なし	なし						なし			
					シカのない場所だが、一応回答してみた。												
474	大字中東	新潟県関川村	舟渡	左下	300-350m	10.6	なし	なし						なし			
女川周辺																	
475	大字中東	新潟県関川村	舟渡	左上	400-450m	10.6	なし	なし						なし			
藤沢川周辺																	
476	奥胎内	新潟県胎内市	杵差岳	左下	350-450m	10.6	なし	なし									
奥胎内ヒュッテ～足ノ松尾根登山口 (市道沿い)																	
477	奥胎内	新潟県胎内市	杵差岳	左上	163-315m	10.9	なし	なし						なし			
胎内第一発電所 (風倉トンネル)～胎内ヒュッテ																	
478	福島湯	新潟県新潟市北区	天王	左上	0m	10.10	なし	なし									
前新田沖、福島湯																	
479	角田山	新潟県新潟市西蒲区	角田山	右下	50-450m	09.10	なし	なし									
480	新潟佐潟	新潟県新潟市西区	巻	左上	30m	10.11	なし	なし						なし			
佐潟周辺					植生調査資料有り。												
481	阿賀野川左岸	新潟県新潟市秋葉区	新津	左上	5m	10.10	なし	なし									
六郷、阿賀野川左岸																	
482	弥彦山	新潟県弥彦村	弥彦	右下	50-550m	10.4	なし	なし									
弥彦神社～ロープウェー山頂駅																	
483	寺泊	新潟県長岡市	寺泊	左上	15-130m	10.8	なし	なし						なし			
寺泊野積の東側山地、寺泊藪田の南東側山地																	
484	信濃川河岸	新潟県長岡市	長岡	右下	20-25m	10.10	なし	なし									
大手大橋下流の左岸 (千秋)、長生橋付近の右岸 (翠生津)																	
485	節黒城キャンプ場周	新潟県十日町市	回野町	右下	290-362m	10.6	なし	なし									
節黒城キャンプ場から節黒城に登るルート																	
486	キョロロの森	新潟県十日町市	松代	右下	280-320m	10.6	なし	なし						ナラ枯れ			
森の学校キョロロから光間集落に抜けるバードピア須山を歩くルート																	
487	千年	新潟県十日町市	松代	右下	約250m	10.8	なし	なし									
千年集落周辺																	
488	頭山 (つむりやま)	新潟県糸魚川市	糸魚川	右下	30-40m	10.4	なし	なし									
頭山白山神社裏																	
489	天水山	新潟県十日町市	松之山温泉	左下	920-1088m	10.8	なし	なし									
信越トレイル終点地点 (大蔵寺) から天水山への登山道を登り、折り返すルート																	
490	市振	新潟県糸魚川市	親不知	左上	200-360m	09.7	なし	なし			下記	樹皮剥ぎ	ナラ枯れ	なし			
林道上路市振線					イノシシ、クマ、カモシカ。												
491	小滝	新潟県糸魚川市	越後平岩	右上	500-700m	09.10	なし	なし									
大峰峠周辺																	
492	木地屋白池	新潟県糸魚川市	越後平岩	右下	1090-1110m	10.9	一部	軽	食				ナラ枯れ	なし			
池周回コース及び林間歩道																	
493	毛渡沢	新潟県湯沢町	土樽	右下	500m-?	10.12	なし	なし									
毛渡橋～湧水橋																	
494	大倉川	新潟県佐渡市	小田	左上・右上	0-600m	10.8	なし	なし					ナラ枯れ	なし		○	
大倉川河口～源流部					植生調査資料有り。												
495	長寿が滝	富山県氷見市長坂	能登二宮	左下	160-180m	09.4	なし	なし						なし			
496	立山ノノ越	富山県立山町	立山	右上	2450-2690m	10.7	なし	なし				サル		なし			
立山室堂山荘～ノノ越					ノノ越山荘の近くでサルの糞発見。												
497	三井洲衛	石川県輪島市三井	長沢	左下	100m	10.7	なし	なし					マツ枯れ	なし			
洲衛																	
498	藤波	石川県能登町藤波	鶴川	右下	50m	10.7	なし	なし					マツ枯れ	なし			
運動公園近く																	
499	越渡	石川県輪島市越渡	下唐川	左上	300m	10.7	なし	なし					マツ枯れ	なし			
越渡																	
500	小牧	石川県七尾市小牧	中島	右上	50m	10.7	なし	なし					マツ枯れ	なし			
小牧																	
501	梨谷小山	石川県志賀町梨谷小山	能登高浜	右下	50m	10.6	なし	なし					マツ枯れ	なし			
緑化センター																	
502	出浜	石川県宝達志水町出浜	羽咋	左下	0m	10.5	なし	なし					マツ枯れ	なし			
海岸林																	
503	上矢田	石川県津幡町上矢田	石動	左下	50-100m	10.11	なし	なし					マツ枯れ	なし			
御門池																	
504	角間	石川県金沢市角間	金沢	右上	80-130m	10.8	なし	なし					マツ枯れ	なし			
金沢大																	
505	美川	石川県白山市美川	美川	右上	0-10m	10.5	なし	なし					マツ枯れ	なし			
手取川河川敷																	
506	辰口	石川県能美市上清水	粟生	左下	10m	10.5	なし	なし					マツ枯れ	なし			
手取川河川敷																	

植生情報第15号(2011年3月)

回答No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響				地域全般のシカ対策				
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真	
踏査コース・区域																		
状況記述(影響に限りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)																		
548	乙女高原・小橋山	山梨県牧丘町	川浦	左上・左下	1560-1650m	09.7	相当部分	軽	食、剥、糞、道						なし	下記	○	
乙女高原から小橋山																		
549	乙女高原	山梨県山梨市	川浦	左上	1530-1680m	09.9	ほぼ全域	軽	食						なし		○	
焼山峠～乙女高原																		
550	琴川ダム	山梨県山梨市	川浦	左上	1170-1510m	09.9	ほぼ全域	強	食、剥、糞、道、ラ						耕地周辺	ロープ	○	
袖口～小島山～琴川ダム																		
551	乾徳山	山梨県山梨市	川浦	右上	830-1860m	10.10	ほぼ全域	強	食、剥、道、ラ		足跡				下記	金網	○	
乾徳山登山口バス停～馬上～国師ヶ原～扇平～道満尾根コース～道満山～バス停																		
552	三窪高原	山梨県塩山市	柳沢峠	左上	1660m	09.8	一部	軽	食、剥						自然植生内	金網	○	
三窪高原																		
553	柳沢峠	山梨県甲州市	柳沢峠	左下	1450-1600m	09.9	全域	強	食、剥、視、道、ラ						なし	下記	○	
柳沢口～プナ坂～橋の木尾根～ナラ坂～柳沢峠																		
554	後山林道	山梨県丹波山村	丹波	右上	650-750m	10.11	ほぼ全域	強	食、剥、糞						なし			
片倉谷合～塩沢合～塩沢林道終点																		
555	北岳・左俣沢	山梨県南アルプス市	仙丈ヶ岳	右下	2000-2200m	10.8	一部	軽	糞、道		クマ				なし		○	
南俣小屋～左俣沢・大滝																		
556	広河原	山梨県南アルプス市	鳳凰山	左上	1520-2100m	10.8	一部	軽	ラ		構成種の変化				なし			
広河原近く～大樺沢二俣(の手前)～広河原																		
557	大菩薩峠	山梨県甲州市	大菩薩峠	右上	1830-2040m	09.9	相当部分	中	食、糞						自然植生内	金網	○	
神前石～大菩薩峠～丸石峠																		
558	大菩薩峠麓	山梨県甲州市塩山	大菩薩峠	右上	891-1750m	10.9	相当部分	中	食、剥、道、ラ		構成種の変化				なし		○	
大菩薩登山口バス停～上白川峠～富士見平～勝緑荘～往路																		
559	小倉山	山梨県甲州市	大菩薩峠	左上	730-955m	10.11	ほぼ全域	強	食、剥、道、ラ、落						下記	ネット		
玉宮ざんせん墓公園～ザゼンソウ群生地～稜線～山頂展望台																		
560	三頭山鶴峠	山梨県小菅村	七保	右上	1000-1550m	09.5	ほぼ全域	強	食、剥、糞、道、ラ						ササ開花枯死	なし	○	
鶴峠～三頭山～鶴峠																		
561	夜叉神峠	山梨県南アルプス市	夜叉神峠	右上	1400-1600m	10.10	ほぼ全域	強	食、剥、糞、道、ラ、土						なし		○	
夜叉神峠周辺																		
562	掃形山	山梨県南アルプス市	小笠原	左下	1000-1800m	09.9	相当部分	強	食、剥、糞、道、ラ		クマ				樹皮剥ぎ	自然植生内	金網	○
坪川～北尾根～アヤマ平																		
563	笹子峠	山梨県甲州市	笹子	左下	1050-1290m	10.11	ほぼ全域	軽	食、剥						なし			
旧道トンネル入口(大和側)～笹子峠～1290m峰向こうの鞍部(尾根沿いと南面巻き道)																		
564	扇山	山梨県大月市	上野原	左上	310-1110m	10.7	一部	軽	食						なし			
鳥沢駅～大月カントリー～扇山山頂西側鞍部																		
565	上芦川	山梨県笛吹市	河口湖西部	右上	1070-1340m	09.9	なし	なし							下記		○	
上芦川～スズラン群生地																		
566	三ツ峠山	山梨県都留市	河口湖東部	左下	1300-1800m	10.6	一部	軽	食						自然植生内	金網	○	
三ツ峠山登山道～三ツ峠山山頂																		
567	御坂黒岳	山梨県富士河口湖町	河口湖東部/西部	左上/右上	820-1793m	10.8	なし	なし							なし			
三ツ峠入口バス停～御坂峠～黒岳～新道峠～中沢林道～大石																		
568	三ツ峠山	山梨県富士河口湖町	河口湖東部	左下	1200-1700m	10.9	相当部分	軽	食、道						下記	なし	○	
三ツ峠登山口バス停～木無山～母ノ白滝分岐～霧山～天上山～河口湖駅																		
569	御坂黒岳	山梨県河口湖町	河口湖東部	左上	1000-1792m	10.5	なし	なし	食、剥						なし			
御坂峠～黒岳～新御坂トンネル																		
570	本栖湖	山梨県富士河口湖町	精進	右上	1000-1300m	09.9	一部	軽	食、道						なし		○	
パノラマ台																		
571	竜ヶ岳	山梨県富士河口湖町	精進	右上	906-1485m	09.9	なし	なし							なし			
本栖湖キャンプ場入口～登山口～展望台～竜ヶ岳(往路を戻る)																		
572	パノラマ台	山梨県富士河口湖町	精進	右上	910-1328m	09.8	なし	なし							なし		○	
パノラマ台下バス停～パノラマ台山頂～鳥帽子岳～国道300号～本栖湖バス停																		
573	青木ヶ原	山梨県富士河口湖町	鳴沢	左下	1090-1120m	09.9	全域	強	食、剥、道、ラ						なし		○	
精進口登山道(開拓道)～富士風穴～大室山山麓																		
574	富士山/大室山	山梨県富士河口湖町	鳴沢	左下	1100-1200m	10.5	ほぼ全域	強							なし			
富士御火山大室山周辺																		
575	梨ヶ原	山梨県富士吉田市	富士吉田	右下	1020-1290m	10.6	ほぼ全域	軽	食、剥、糞						なし		○	
自衛隊北富士演習場周辺																		
576	御正体山	山梨県道志村	御正体山	右上	900-1680m	10.5	一部	軽	食、剥、糞						なし			
下白井平～白井平分岐～山頂																		
577	三里地区	山梨県早川町	身延	左上	300-400m	09.11	ほぼ全域	中	食、剥、視、糞、道、落		下記	下記	下記	下記	下記	下記	○	
三里地区中州																		
578	富士山/奥庭	山梨県鳴沢村	富士山	右上	2100-2200m	09.10	なし	なし							なし			
富士山 奥庭周辺																		
579	富士山/御中道	山梨県鳴沢村	富士山	右上	2250-2304m	10.6	一部	軽	食						なし		○	
御中道(五合目～御殿～スバルライン)																		
580	富士山(5-7合目)	山梨県富士吉田市	富士山	右上	2300-2900m	10.8	なし	なし							なし			
河口湖五合目バス停(小御岳神社)～泉ヶ滝～六合目六角堂～七合目～往路戻る																		
581	山中湖	山梨県御殿場市	須走	右下	700m	09.9	一部	軽	食、視						なし		○	
県道150号線周辺																		
582	カヤノ平	長野県木島平村	往郷	右上	1000-1400m	10.9	一部	軽	視		下記	クマ			フナに爪痕	なし(下記)		
カモシカの食痕との区別は困難。オス成獣を夜間に目視。里では、クマ・イノシシを対象に電気柵が設置されているが、山では特になし。																		
583	白馬大池	長野県小谷村	白馬岳	左下	1470-2400m	10.9	なし	なし							なし			
蓮華温泉～天狗の窟～白馬大池																		
584	風吹大池	長野県小谷村	白馬岳	右上	1500-1850m	10.8	なし	なし							なし			
蓮華温泉～笹目尾根～風吹大池																		
585	戸隠高原	長野県信濃町	信濃柏原	左上	900-1000m	10.9	一部	軽	食、道						イノシシ	ナラ枯れ	なし	下記
県道36号線周辺																		
586	北アルプス八方尾根	長野県白馬村	白馬岳	左下	1700-1950m	09.10	なし	なし							なし		○	
八方尾根ロープウェイ																		
587	戸隠森林植物園	長野県長野市	戸隠	右上	1200m	10.8	一部	軽	視						イノシシ	クマ	○	
戸隠森林植物園																		

植生情報第15号 (2011年3月)

調査地域の概要					地域全体のシカ影響			シカ以外の原因による影響			地域全体のシカ対策							
回答No.	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	調査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真	
調査コース・区域					状況記述 (影響に幅がある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)													
588	北アルプス遠見尾根 小遠見尾根リフト降り場から往復	長野県白馬村	神城	左上	1650-1800m	09.10	なし	なし						なし			○	
589	鳥帽子岳 高瀬ダム～鳥帽子岳	長野県大町市	鳥帽子岳	左上	1286-2605m	10.10	なし	なし						なし				
590	湯の丸高原 鹿沢温泉近く	長野県東御市	嬉志田代	右上	1400-1500m	09.8	一部	軽	食糞					なし				
591	軽井沢 (浅間山東麓) 峰の茶屋～白糸の滝～竜返し滝 (信濃路自然歩道)	長野県軽井沢町	浅間山	右上	1100-1405m	09.10	なし	なし			イノシシ	食糞 掘り返し		なし				
592	上高地 小梨平～明神～徳沢	長野県松本市	穂高岳	左下	1500-1550m	10.9	なし	なし			サル	下記		なし		ロープ	○	
593	櫛ヶ岳 ハハ平～櫛ヶ岳	長野県松本市	穂高岳	左上	1990-3180m	09.8	なし	なし						なし			○	
594	上高地 上高地～明神～徳沢	長野県松本市	穂高岳	右下	1500-1600m	09.8	なし	なし			サルカモシカ	下記		なし			○	
595	蝶ヶ岳 三股の駐車場から蝶ヶ岳ヒュッテ	長野県安曇野市	穂高岳	右上	1200-2600m	10.8	一部	軽	食糞					なし				
596	入山辺悪沢 3次メッシュ番号5438～2008のほほ全域	長野県松本市	山辺	右下	1160-1380m	10.6	ほぼ全域	強	食刺視 声 糞 道 土 崩					下記	下記	下記		
597	荒船山 荒船不動～沢分岐	長野県佐久市	荒船山	左下	1200-1400m	09.8	ほぼ全域	強	食 刺 糞 道 土 崩					なし			○	
598	乗鞍高原 乗鞍高原スキー場	長野県松本市	乗鞍岳	右上	1500m	09.9	なし	なし			カモシカ	下記		なし				
599	白樺峠 駐車場～白樺峠	長野県松本市	梓湖	左下	1600-1650m	10.9	なし	なし						なし				
600	奈川渡ダム下流 奈川渡ダム下流右岸山地 (小白川～大白川の間の国道沿い)	長野県松本市	梓湖	右下	870-1250m	10.7	なし	なし			カモシカ	食糞	ササ開花枯死	なし				
601	高ボッチ高原 高ボッチ山	長野県塩尻市	鉢伏山	左上	1620-1650m	09.9	相当部分	中	食糞					なし			○	
602	霧ヶ峰 ハヶ島湿原・車山高原スキー場	長野県諏訪市	霧ヶ峰	左下・右下	1570-1760m	09.9	一部	軽	食糞					なし		下記	○	
603	霧ヶ峰 車山の肩バス停～車山～霧ヶ峰山～沢渡～車山の肩バス停	長野県諏訪市	霧ヶ峰	左下	1800-1925m	10.7	なし	なし		足跡				下記	なし			
604	霧ヶ峰高原 ハヶ島湿原・車山湿原・鍋場湿原 (コースでなく全域)	長野県諏訪市 下諏訪町 霧ヶ峰	霧ヶ峰	左下・右上	1500-1800m	09.11	相当部分	中	食刺視 声 糞 道 土 崩	下記	イノシシ	下記	下記	下記	電気柵	下記	○	
605	縮枯山 ピラタスロープウェイ山頂駅～五辻～縮枯山と茶臼山の鞍部～縮枯山～雨池峠～ピラタスロープウェイ山頂駅	長野県茅野市 茅科	茅科	右上	2140-2400m	09.10	相当部分	中	食 刺 声 糞		カモシカ	下記		なし			○	
606	縮枯山 北横岳のロープウェイ山頂駅から妻草峠に向かう縮枯山南西斜面の登山道周辺	長野県茅野市	茅科	右上	2100-2200m	10.9	ほぼ全域	中	食 刺 声 糞					なし				
607	北横岳 ピラタス茅科ロープウェイ山頂駅～北横岳～三ツ岳～雨池峠～山頂駅	長野県茅野市	茅科	右上	2220-2480m	10.8	一部	中						構成種の変化	なし		○	
608	丸山・白駒池 妻草峠～丸山～高見石～白駒池～白駒池入口～妻草峠	長野県佐久穂町	茅科	右上	2100-2330m	10.9	ほぼ全域	中						構成種の変化		自然植生内	ネット	○
609	妻草峠 妻草峠周辺	長野県茅野市 佐久穂町	茅科	右上	2150m	10.9	一部	軽	食 刺 道					自然植生内	金網		○	
610	北沢 (ハヶ岳) 美濃戸ロ～美濃戸～北沢～赤岳温泉手前～往路戻る	長野県茅野市	ハヶ岳西部	右上	1490-2100m	10.9	ほぼ全域	中	食 道					構成種の変化	なし		○	
611	飯盛山 平沢峠～飯盛山山頂～平沢～平沢橋～清里駅	長野県南牧村	ハヶ岳東部右下/谷戸右上		1209-1653m	10.6	なし	なし						放牧中のウシ	下記	なし		
612	三国山・高天原山 神山 (庫上)～三國峠 (以下徒歩)～三國峠～高天原山 (川上・南相木・上野村境の1978m三角点)～日輪ノ尾 (高天原山北方の1927m標高点)	長野県川上村 群馬県上野村	居倉	右上	1500-1978m	09.9	全域	強	食刺視 声 糞 道 土 崩					耕地周辺 道路脇	電気柵	下記		
613	大榎入山 濃ヶ池川～大榎入山南西中腹	長野県日義村	宮ノ越	左下	1400-1800m	09.6	なし	なし						なし			○	
614	入笠山 ゴンドラ乗り場～入笠湿原～入笠山山頂～大阿原湿原～ゴンドラ乗り場	長野県富士見町	信濃富士見	左上・右上	1780-1955m	10.8	一部	軽	食糞					自然植生内	ロープ	下記	○	
615	南木曾岳 額付川～南木曾岳山頂	長野県南木曾町	南木曾岳	左下	900-1700m	10.8	なし	なし			クマ	下記		なし				
616	下青木 林道沿線全域	長野県大鹿村	信濃大原	左下	900-1300m	09.8	ほぼ全域	激	食刺視 声 糞 道 土 崩		クマ			耕地・植林周辺	金網 電気柵			
617	青田山 林道青田山線	長野県大鹿村	信濃大原	左下	1100-1700m	09.8	ほぼ全域	激	食刺視 声 糞 道 土 崩		クマ			下記	金網 電気柵			
618	豊口山 鳥倉林道終点～登山口南斜面	長野県大鹿村	信濃大原	右上	1750-1900m	10.6	全域	強	食 刺 視 糞 道					下記	ロープ	下記	○	
619	水晶山 箱川～山頂～大須～箱川	長野県飯田市 山本箱川	時又	左下	600-800m	09.6	なし	なし						マツ枯れ	なし			
620	俵ヶ島～西沢渡 俵ヶ島～西沢渡	長野県飯田市 南信濃	光岳	右上	950-1050m	09.9	全域	強	食 道 土 崩					なし			○	
621	光岳 易老渡～易老岳～光岳	長野県飯田市	光岳	右下	900-2600m	10.7	全域	強	食 刺 道 土 崩					なし			○	
622	光岳・上河内岳 光岳～仁田岳～茶臼岳～上河内岳	長野県飯田市 群馬県群馬市	光岳 右下/上河内岳 左下		2300-2700m	10.7	ほぼ全域	強	食 刺 道 土 崩					下記	なし		○	
623	聖岳 聖岳～聖岳～西沢渡	長野県飯田市 群馬県群馬市	上河内岳	左上	1100-3000m	10.7	相当部分	強	食 声 道 土 崩					自然植生内	金網			
624	萩町 鳩谷 (国道380号線沿い)	長野県白川村	鳩谷	左下	670m附近	09.4	なし	なし	視									

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響				地域全般のシカ対策		写真
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の種生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	
踏査コース・区域						状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による種生への影響、シカ対策、資料、など)										
625	奥穂高岳	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷	穂高岳	左下	1200-3190m	09.8	なし	なし								
新穂高温泉～右俣林道～白出沢～奥穂高岳																
626	白山	岐阜県白川村	白山	左上	1100-2500m	10.7	なし	なし								
大白川～大倉山～東境尾根																
627	白山別山	岐阜県高山市萩川村・郡上市	白山	左下	2050-2399m	10.7	なし	なし								
南龍ヶ馬場～別山～三ノ峰																
628	乗鞍山麓五色ヶ原	岐阜県高山市丹生川町	乗鞍岳	左下	1600-1800m	09.9	なし	なし								
蛇出谷																
629	石徹白のスギ付近	岐阜県郡上市白鳥町石徹白	二ノ峰	左下	950-1200m	10.11	なし	なし						なし		
白山登山口～石徹白のスギ～尾根途中																
630	銚子が峰	岐阜県高山市	二ノ峰	左上	1000-2128m	10.7	なし	なし								
三ノ峰～銚子ヶ峰～石徹白大杉																
631	朝日添川付近	岐阜県郡上市白鳥町石徹白	石徹白	左下	950-1200m	10.11	なし	なし		クマ	クマ糞			なし		
朝日添川沿いの林道																
632	石徹白	岐阜県郡上市白鳥町	石徹白	左上	720m	10.3	一部	中	剥視声					なし		
白山中層神社																
633	大洞峠付近	岐阜県郡上市名宝寒水	那留	右上	1000-1050m	10.11	一部	中	食糞					なし		○
寒水川西側、林道沿い																
634	白尾スキー場	岐阜県郡上市白鳥町六ノ里	那留	右上	1050-1080m	10.11	一部	軽	剥糞					なし		○
スキー場脇のスギ・ヒノキ植林																
635	大和町内ヶ谷	岐阜県郡上市	門原	右上	900-1000m	10.11	一部	軽	食糞					なし		
636	小秀山二ノ谷	岐阜県中津川市加子母	宮地	右下	880-1500m	10.9	なし	なし								
637	登路瀬	岐阜県下呂市金山町	沢	右下	450m	10.11	相当部分	中	食剥視声糞道	イノシシ				耕地周辺	金網	
638	神崎・今島	岐阜県山県市	谷合	右上	300-400m	10.11	一部	軽	食	イノシシ	掘り返し			なし		
639	面平山	岐阜県美濃市	下洞戸	右下	180-330m	10.12	なし	なし		カモシカ	糞角とぎ					○
乙狩川から面平山の北側の谷を入り、面平山中腹まで																
640	北山	岐阜県山県市美山町	下洞戸	左上	360-907m	09.5	一部	軽	視声					なし		
西洞～北山～西洞																
641	奥板山	岐阜県美濃市	苜安	左下	320-460m	10.12	一部	中	剥道		マツ・ナラ枯れ			なし		
奥板山の集落から片知川を渡った南側の山地																
642	広野	岐阜県白川町	金山	右下	450m	10.8	ほぼ全域	軽	剥視声糞	イノシシ	下記	ナラ枯れ	なし			
全体に少数のシカが出現、イノシシが土手を掘ったり畑の作物を荒らす。今年になってシカの影響が出てきたので対策を考えている。																
643	谷汲・名礼・仁柿	岐阜県揖斐川町	谷汲	右下	130-180m	10.11	全域	中	食剥視声糞道	イノシシ	下記	ナラ枯れ	なし			○
アオキの葉、シラキの樹皮が食べられている。イノシシによる土の掘り起こし、泥浴び。																
644	谷汲・名礼・仁柿	岐阜県揖斐川町	谷汲	右下	130m	10.4	相当部分	中	食	イノシシ	掘り返し	ナラ枯れ	なし			
上名礼・仁柿																
645	伊自良湖湖畔	岐阜県山県市	美濃神海	右上	100m	10.9	一部	軽	食剥					なし		
伊自良湖周辺																
アオキに食痕、リョウブに樹皮はぎ。																
646	伊自良川上流域	岐阜県山県市	美濃神海	右上	100-350m	10.12	相当部分	中	剥糞道				マツ枯れ	耕地周辺	電気柵	○
平井の集落から西ヶ谷の北側の尾根沿い																
647	籠倉	岐阜県岐阜市	美濃神海	右下	80m	10.9	一部	中	食視声	クマ						
648	長滝	岐阜県山県市	美濃神海	右上	150-250m	10.11	一部	軽	食	イノシシ	掘り返し	ナラ枯れ				
伊自良湖～みぞれ谷																
649	半道	岐阜県美濃市	岩佐	右上	140-160m	10.12	なし	なし		ノウサギ						
半道の北側の山地						ケモノ道はあるが、何によるかは分からない。ノウサギの糞あり										
650	穴洞	岐阜県美濃市	美濃	左上	90-140m	10.12	なし	なし		下記				耕地周辺	電気柵	
穴洞集落のすぐ裏(西側)の山地						ケモノ道は多い。イノシシかもしれない										
651	安毛	岐阜県美濃市	美濃	左上	100m	10.11	なし	なし		イノシシ	クマ					
安毛地内																
652	籠倉	岐阜県岐阜市	美濃	右下	100m	10.11	一部	軽	食	イノシシ	クマ	下記	ナラ枯れ	なし		
上籠倉～伊洞						掘り起こし(イノシシ)、柿の食害(ツキノワグマ)										
653	谷汲	岐阜県揖斐川町	池野	右上	100m	10.11	中	視声糞道		イノシシ			ナラ枯れ	耕地周辺	ロープ電気柵	
大洞～小洞																
654	大谷山	岐阜県大野町	池野	右上	150-356m	10.10	相当部分	軽	食		イノシシ	掘り返し	ナラ枯れ			下記
野村坂 大谷山 流谷山						スギやヒノキにビニールテープを巻く										
655	金華山	岐阜県岐阜市	岐阜北部	左下	20-329m	10.12	なし	なし						なし		
岐阜公園～金華山頂上																
656	台所山	岐阜県関市	美濃関	左上	45-140m	10.10	なし	なし					ナラ枯れ	なし		
下倉知橋～林道で峠まで～台所山						台所山西側の山塊にある百年公園にて、2009年に行った無人カメラ撮影でも、シカは確認されていない。										
657	金生山	岐阜県大垣市赤坂	大垣	右上	30-170m	10.9	なし	なし								
参道登山口～山頂																
658	国営木曽三川公園	岐阜県各務原市	岐阜	右下	約10-20m	10.10	なし	なし						なし		○
かさだ広場						資料あり(植生調査資料、論文・市販本)										
659	今須ノ祖父江谷	岐阜県関ヶ原町	霊仙山	右上	300m附近	10.5	一部	中	食視		イノシシ					
祖父江谷																
660	養老山	岐阜県養老町	養老	左上	200-660m	09.4	相当部分	中	視声道					植林周辺	ナイロン網	
沢田～養老山～沢田																
661	濃尾大橋	岐阜県羽島市	竹鼻	右上	5m	10.7	なし	なし								
正木町新井、木曾川右岸、濃尾大橋付近																
662	漆原	岐阜県恵那市上矢作町	明智	右下	360m	10.6	なし	なし								
下久呂瀬																
663	時山	岐阜県大垣市	篠立	左上	450m附近	10.5	一部	中	食糞道		イノシシ			なし		
時山																
664	悪沢岳	静岡県静岡市葵区	赤石岳	右上	1100-3141m	09.8	なし	なし						なし		
さわら島～千枚岳																
665	毛無山	静岡県富士宮市	人穴	左上	800-1000m	10.5		軽	食剥					なし		
麓～毛無山麓往復																

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答 No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策			
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策
踏査コース・区域																
666	富士山/宝永火口付近 富士宮登山道新5合目～宝永火口	静岡県富士市	富士山	右下	2350-2450m	10.10	なし	なし	視		ノウサギ	下記		なし		○
667	富士山/東斜面 ふじあざみライン (旧馬返～五合目・古御岳神社)	静岡県小山市	須走	右下	1350-1950m	10.6	ほぼ全域	強	食・剥・視・糞・道					なし		○
668	安倍峠 八幡嶺登山口～安倍峠	静岡県静岡市葵区梅ヶ島	梅ヶ島	右上	1300-1600m	09.9	一部	軽	食・声・糞					なし		
669	山伏 西日陰沢～逢峠～山伏	静岡県静岡市葵区	梅ヶ島	左上	1300-2000m	09.9	一部	中	食・剥・視・糞・道				自然植生内	金網		
670	富士山/西日塚 西日塚周辺遊歩道	静岡県富士宮市	天母山	右下	1100-1200m	09.7	全域	強	食・剥・糞・道・土	イノシシ	掘り返し		なし		○	
671	富士山/浅黄塚 須山登山道 (富士山スカイライン合五勺)・浅黄塚南側	静岡県富士市	印野	左上	1450-1620m	09.7	ほぼ全域	強	食・剥・糞・道				なし			
672	富士山/浅黄塚 浅黄塚一周	静岡県富士宮市	印野	左上	1450-1520m	10.5	相当部分	強	食・剥・視・声・糞・道				なし		下記	○
673	位牌岳 池の平公園～つるべ落としの滝分岐～位牌岳 (尾根沿いのコース)	静岡県長泉町	愛鷹山	右上	800-1350m	09.10	相当部分	強	食・剥・声・糞・道・落・土			下記	なし			○
674	函南原生林 函南原生林内	静岡県函南町	熱海	左上	550-850m	10.6	なし	なし		イノシシ			なし			○
675	玄岳 水ヶ池、玄岳、熱海市青葉町	静岡県函南町・熱海市	熱海	左上	500-800m	09.10	なし	なし					なし			
676	葦山 浄念寺、香山寺付近の山林	静岡県伊豆の国市葦山	葦山	右上	40-100m	09.3	なし	なし					なし			
677	金冠山 戸田峠、金冠山、東側駐車場	静岡県伊豆市	達磨山	右上	627-816m	10.11	相当部分	中	糞・道・ラ				なし			○
678	松川湖・奥野溪谷 松川湖畔	静岡県伊東市	伊東	右下	150-180m	09.6	一部	中	食・視・道・ラ				なし			○
679	松川湖・奥野溪谷 井原の庄～奥野溪谷～松川湖畔	静岡県伊東市	伊東	右下	150-350m	09.10	相当部分	強	食・剥・視・糞・道・ラ				下記			○
680	猫越峠 仁科峠～猫越峠往復	静岡県西伊豆市・伊豆市	土肥	右下	900-1030m	09.6	ほぼ全域	強	食・糞・道・ラ				なし			○
681	猫越岳・三蓋山 仁科峠～猫越岳～三蓋山	静岡県伊豆市・西伊豆市	湯ヶ島	左下	900-1012m	09.9	全域	激	視・声・糞・道・落・土・崩			風割ギャップ	なし			○
682	八丁池 白砂林道～八丁池往復	静岡県伊豆市	湯ヶ島	右下	850-1190m	09.10	相当部分	強	食・剥・道・ラ				なし			○
683	天城山 天城高原ゴルフ場バス停～万二郎浜～石橋立～万二郎浜～湯沢分岐点～バス停	静岡県伊豆市	天城山	左下	1030-1406m	10.6	全域	強	食・視・ラ		構成種の変化					○
684	天城山 奈良本林道～旧片瀬歩道～片瀬峠	静岡県東伊豆町	天城山	左下	800-1200m	09.5	全域	強	食・剥・視・声・糞・道・ラ				なし			
685	伊豆シラスタ池 林道、シラスタ池往復	静岡県東伊豆町	天城山	左下	600-700m	10.3	ほぼ全域	激	食・剥・道・ラ				なし			○
686	向田川遊歩道 向田川自然遊歩道 (石神の滝往復)	静岡県東伊豆町	天城山	左下	300-500m	09.10	ほぼ全域	強	食・道・ラ				なし			○
687	安城峠 白砂林道～八丁池往復	静岡県西伊豆町	仁科	左下	0-50m	10.10	なし	なし					なし			
688	天城峠 天城峠越え	静岡県伊豆市・河津町	湯ヶ野	右上	600-700m	10.11	全域	激	食・剥・糞・道・落・土				なし			○
689	白田川 白田浄水場から白田川上流往復	静岡県東伊豆町	稲取	左上	100-300m	10.3	相当部分	強	食・道・ラ				なし			
690	細野高原 細野高原 (桃野温泉、三筋山山麓)	静岡県東伊豆町	稲取	左上	450-650m	09.6	なし	なし					なし			○
691	三筋山・細野高原 稲取	静岡県東伊豆町	稲取	左上	350-500m	10.11	一部	軽	食				なし			
692	稲取峠 稲取	静岡県東伊豆町	稲取	左下	0-60m	10.11	なし	なし					なし			
693	東大樹芸研究所 青野研究林。6林班境界(北、西、南)、2林班境界、4林班境界～3林班境界(北)～岩樟園	静岡県南伊豆町	伊豆松崎	右下	100-600m	10.10	ほぼ全域	中	食・剥・視・声・糞・道・ラ	イノシシ	下記		なし (下記)		駆除	○
694	石廊崎 石廊崎	静岡県南伊豆町	石廊崎	右下	0-50m	10.11	一部	軽	食	イノシシ	下記		なし			
695	築水池 築水池周辺の遊歩道	愛知県春日井市	高蔵寺	左上	110-150m	10.7	なし	なし					ナラ枯れ	なし		
696	海上の森 雁戸川・寺山川特別地区	愛知県瀬戸市	瀬戸	右下	110-140m	10.3	なし	なし					なし			○
697	碓氷石山 設楽町納庫からの登山道	愛知県設楽町	田口	右上	900-1200m	10.9	一部	中	食・剥				なし			
698	作手菅沼 上菅沼	愛知県新城市	三河湖	右上	630-680m	09.6	全域	軽	食・糞							
699	作手善夫 巴川	愛知県新城市	三河湖	右下	490m	10.10	なし	なし								
700	泉民の森 泉民の森から宇連山	愛知県新城市	海老	右下	200-930m	09.5	なし	なし					マツ枯れ	なし		
701	乳岩 乳岩～明神岳	愛知県新城市	三河本郷	左下	180-900m	10.10	なし	なし					マツ枯れ	なし		
702	作手黒瀬 長ノ山	愛知県新城市	高里	右上	540-550m	10.10	全域	中	糞・ラ							
703	本久 本久の集落の東側山地	愛知県新城市	三河大野	右下	60-130m	10.7	なし	なし			下記	下記	なし			
704	上衣文 (かみそぶみ) 御油	愛知県岡崎市	御油	左上	120-130m	10.6	なし	なし		イノシシ						
705	本宿町 御油	愛知県岡崎市	御油	左上	100-130m	10.7	なし	なし	視	イノシシ、サル						

植生情報第15号 (2011年3月)

踏査地域の概要					地域全般のシカ影響			シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策						
回答No.	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影	それらの動物の具体的影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真
踏査コース・区域																	
状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)																	
784	鈴島 全島内	三重県紀北町	島勝浦	左上	0-101m	10.11	ほぼ全域	強	食、剥、視、糞、道		イノシシ			なし			
785	須賀利町大池	三重県尾鷲市	島勝浦	左下	0-5m	10.8	全域	激	食、剥、糞、ラ								
786	島勝浦 海山区島勝浦	三重県紀北町	島勝浦	左下	5-10m	10.8	全域	強	食、剥								
787	島勝浦 船越池～島勝浦島勝神社	三重県紀北町	島勝浦	左下	5-30m	10.7	ほぼ全域	中	食、剥、糞		イノシシ	サル	下記	下記	ロープ		○
788	鈴島 島内	三重県紀北町三浦	島勝浦	左上	0-100m	10.7	ほぼ全域	強	食、剥、視、糞、ラ		イノシシ			なし		下記	○
789	大白池 大白池周辺	三重県紀北町海山区白浦	島勝浦	左上	0-5m	10.11	ほぼ全域	軽	食、糞					なし			○
790	大白池 須賀利大池	三重県尾鷲市須賀利町	島勝浦	左下	0-200m	10.12	ほぼ全域	激	食、剥、視、糞、ラ		イノシシ	林床攪乱	自然植生内 (下記)				○
791	国道42号(尾鷲～熊野) 国道42号線矢ノ川沿い	三重県尾鷲市	尾鷲	右下	20-350m	10.12	ほぼ全域	強	食、視、糞		サル			なし			○
792	九木神社 九木神社樹林内	三重県尾鷲市九鬼町	九鬼	左下	0-50m	10.9	全域	強	食、剥		サル			なし (下記)			○
793	飛鳥町佐渡	三重県熊野市	七色貯水池	右下	280m	10.4	全域	中	食								
794	櫛ヶ崎 櫛ヶ崎遊歩道 (国道311号線沿い駐車場～櫛ヶ崎)	三重県熊野市南母町	賀田	右下	10-100m	10.12	全域	強	食、糞、道					なし			○
795	室古神社 室古神社の神社林と海岸部	三重県熊野市二木島町	賀田	右下	0-100m	10.12	全域	激	食、糞、道、ラ、土					なし (下記)			○
796	布引の滝 橋杖川上流～布引の滝	三重県熊野市紀和	瀨八丁	左下	150-350m	10.10	ほぼ全域	強	食								
797	高テラ山 高テラ山登山道 (上野～高テラ山)	三重県御前町上野	瀨八丁	右下	250-625m	10.9	ほぼ全域	中	食、剥、糞					なし			○
798	北檜杖 北檜杖～瀬原 (県道740号線沿い)	三重県紀宝町	新宮	右上	30m	10.11	ほぼ全域	軽	食						耕地周辺	金網	
799	奥川並川 菅並の北、奥川並川沿い	滋賀県余呉町	中河内	右下	250-350m	10.7	なし	なし	道								
800	湖北町 海老江の西、琵琶湖岸	滋賀県長浜市	竹生島	右下	85-90m	10.7	なし	なし									
801	朽木 朽木いきものふれあいの里の遊歩道沿い (樹木観察園～ふれあいの森)	滋賀県高島市	養彦野	左下	280-300m	10.10	全域	中	食、剥、視、糞				マツナラ枯れ	自然植生内	ネット		
802	安曇川デルタ 新旭町深清の北東	滋賀県高島市	今津	左下	85m	09.6	なし	なし									
803	甲頭倉～雲仙入谷 甲頭倉～雲仙入谷	滋賀県多賀町	彦根東部	右下	350-688m	09.5	相当部分	中	剥							下記	
804	比良山 神降谷・北比良峠・八雲ヶ原・カマケ・釈迦岳	滋賀県大津市	比良山	右下	250m	10.6	相当部分	強	食、剥、視、糞、ラ、土				ナラ枯れ	なし			○
805	御池岳 国道～御池岳	滋賀県多賀町・東近江市	篠立	左下	400-1241m	10.5	全域	激	食、視、糞、道、土					なし			○
806	御池岳 御池岳周辺	滋賀県東近江市	篠立	左下	550-1200m	09.6	ほぼ全域	強	食、視、糞、道、ラ、土					なし			○
807	御池岳 鈴北岳～日本庭園～御池岳	滋賀県東近江市	篠立	左下	1050-1247m	09.6	一部	中	食、視、糞、道					なし			
808	マイアミ浜 新旭町深清の北東	滋賀県野洲市	近江八幡	左上、右下	0-3m	09.10	なし	なし					マツ枯れ	なし			
809	大萩 八風谷 (国道)	滋賀県東近江市	百済寺	右上	480-560m	10.12	相当部分	強	食、剥、糞、道、土					なし			○
810	紅葉尾 西明寺～竜王山林道	滋賀県日野町	日野東部	右下	400-600m	10.12	相当部分	強	食、剥、糞、道				マツナラ枯れ	なし			
812	熊野 水木林道 (熊野集落上流)	滋賀県日野町	土山	右上	540-600m	10.11	全域	激	食、剥、視、糞、道、ラ、土					なし			○
813	紅葉尾 神崎川沿いの林道	滋賀県東近江市	御在所山	左上	550-670m	10.12	一部	強	食、糞、道、土					なし			
814	音羽山 石山外畑町の東側林道沿い	滋賀県大津市鶴の里	瀬田	左上	約200m	10.10	なし	なし	視					なし			
815	鎌掛 (かいがけ) 鎌掛地先 (南部)	滋賀県日野町	土山	左上	250m	10.11	一部	軽	食、道					耕地周辺	金網、電気柵		○
816	石山外畑町 石山外畑町の東側林道沿い	滋賀県大津市	朝宮	左上	90-120m	10.10	一部	軽	剥		イノシシ	下記	マツ枯れ	なし			
817	丹後上世屋内山 京都府自然環境保全地域、京都府大宮町五十河府道終点から宮津市境702mピークまで、内山ブナ林	京都府京丹後市	日置	左下	500-700m	10.8	なし	なし	視					なし			
818	五波峠 峠から東方へ数百mの稜線沿い	京都府南丹市・福井県おおい町	久坂	右下	600-630m	10.10	全域	強	食、剥、糞、ラ、落					なし		下記	○

植生情報第15号 (2011年3月)

踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策					
回答No.	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真
踏査コース・区域					状況記述(影響に幅がある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)												
858	大台ヶ原 西大台地区	奈良県上北山村	大台ヶ原山	右下	1300-1700m	10.8	全域	激	食、剥視、声、糞、道、土	下記	イノシシ			下記	下記		
859	大台ヶ原 大台ヶ原一帯(ビジターセンター～日出ヶ岳)	奈良県上北山村	大台ヶ原山	右下	900-1600m	10.5	全域	激	食、剥視、声、糞、道、土						自然植生内	金網	○
860	西原 泉谷沿い	奈良県上北山村	大台ヶ原山	左下	600-1000m	10.12	ほぼ全域	強	食、声、糞、道					なし			
861	釈迦ヶ岳 太尾登山口～古田ノ森～釈迦ヶ岳	奈良県十津川村	釈迦ヶ岳	左下	1400-1790m	10.10	ほぼ全域	激	食、剥視、声、糞、道	下記	下記	下記	下記	なし		下記	○
862	沖ノ島 野奈浦～湿地帯植物群落～開加井跡	和歌山県和歌山市加太	加太	左下	0-50m	10.8	全域	激	食、剥視、声、糞					なし			
863	龍神岳 高野龍神スカイライン～護摩壇山～龍神岳(稜線沿い)	和歌山県田辺市	護摩壇山	右上	1280-1382m	10.5	全域	激	食					なし			
864	九重 浦地一峰	和歌山県田辺市熊野町	伏拝	右下	40-200m	09.8	相当部分	中	食、剥視、声					耕地周辺	ロープ		
865	玉置口 玉置口南側の国道と北山川に囲まれた山地	和歌山県新宮市熊野川町飛地	瀨八丁	左上	60-350m	09.8	一部	中	食、剥視、道					なし			○
866	大塔山 山頂付近	和歌山県田辺市・古座川町	木守	右上	-1121m	10.8	ほぼ全域	激	食					自然植生内	金網		
867	赤倉岳 林道より、赤倉岳東方の市境の稜線沿い	和歌山県新宮市・田辺市	紀伊大野	左上	550-782m	10.11	一部	軽	食、剥								
868	小川 長ヶ滝ノ拝	和歌山県串本町	滝の拝	左下	60-70m	10.4	相当部分	強	食								
869	熊瀬川	和歌山県那智勝浦町	滝の拝	右上	100m	10.4	一部	軽									
870	燈明崎	和歌山県太地町	紀伊勝浦	右下	30m	09.1	なし	なし									
871	相瀬 古座川支流、立合トンネル・立合川	和歌山県串本町	三尾川	右上	5-30m	10.4	相当部分	激	ラ								
872	田原 堂道	和歌山県串本町	下里	左下	0-10m	10.4	なし	なし	道								
873	くじ野川	和歌山県串本町	串本	左上	10-30m	10.4	全域	強	ラ								
874	紀伊大島 須江	和歌山県串本町	串本	右上	85m	10.4	なし	なし									
875	清宮海岸 自然探勝路を田後から網代へ	鳥取県岩美町	田後	左下	0-50m	09.10	なし	なし					マツ枯れ	なし			
876	鳥取砂丘 西南部の砂丘入口から東北部の砂丘観光の中心	鳥取県鳥取市	鳥取北部	右上	20-60m	09.10	なし	なし									
877	船上山 船上山ダム周辺から船上山神社	鳥取県勝浦町	船上山	右下	300-650m	10.8	なし	なし						なし			
878	宇倍神社裏山 鳥取市宮下宇倍神社から稲葉山へ(途中まで)	鳥取県鳥取市	稲葉山	左上	40-140m	10.10	なし	なし						なし			
879	大山 大山南壁、文殊谷	鳥取県江府町	伯耆大山	右下	800-1200m	10.6	なし	なし						なし			
880	竹田谷 中津から竹田谷	鳥取県三朝町	三朝	右下	650-750m	10.8	一部	軽					ナラ枯れ	なし			
881	三徳山 坂本上流黒川から南に尾根越え、三徳谷まで	鳥取県三朝町	三朝	右上	250-500m	10.6	なし	なし					ナラ枯れ	なし			
882	水ノ山 水ノ山自然ふれあい館へ水ノ山越え	鳥取県若桜町	若桜	右下	850-1200m	10.8	相当部分	中	食、剥視、声、糞、道、土				ナラ枯れ	下記	電気柵	○	
883	若桜鬼ヶ城 若桜鬼ヶ城址	鳥取県若桜町	若桜	左下	400-440m	10.10	一部	強	食、剥視、糞、道、落					なし			○
884	くらます R29沿い、若桜町中原林道終点at.550mから850mまで	鳥取県若桜町	岩屋堂	右下	700-800m	10.5	相当部分	強	食、剥視、糞、道、落					なし			○
885	大内 酒屋林道終点～688mピーク往復	鳥取県智頭町	坂根	左上	540-680m	10.10	一部	軽	剥視、声		イノシシ	林床破乱(軽)		なし			
886	窓山 奥窓～窓山(林道)	鳥取県日南町	多里	左下	600-850m	10.10	なし	なし						なし			
887	鬼林山 椋子～南の峠	鳥取県日南町	上石見	左上	650-700m	10.10	なし	なし						なし			
888	弥山山地西部 出雲大社～鷲峰～鷲浦	鳥取県出雲市大社町	大社	右上	0-300m	09.4	全域	強	食、剥視、糞、道、落	下記	イノシシ	林床破乱(軽)		耕地・樹林周辺	ロープ・金網	下記	
889	三瓶山 三瓶山北の原～男三瓶山山頂	鳥取県大田市三瓶町	三瓶山西部	右上	600-1126m	10.7	なし	なし						なし			
890	赤名湿地 赤名湿地駐車場～湿地	鳥取県飯南町下赤名	野賀	右下	450m	10.6	なし	なし			イノシシ	掘り返し	マツ枯れ	なし			
891	粟民の森 小田川沿い	鳥取県飯南町小田	頓原	右上	650-800m	10.9	なし	なし			イノシシ	掘り返し		なし			
892	亀井谷 台所～亀井谷	鳥取県益田市匹見町	出合原	右下	800-900m	10.9	なし	なし						なし			
893	安蔵寺山 安蔵寺山登山口～安蔵寺トンネル	鳥取県津和野町日原	安蔵寺山	右上	730-1100m	10.6	なし	なし					ナラ枯れ	なし			
894	鈴ノ大谷川 鈴ノ大谷川	鳥取県吉賀町柿木	花谷	右下	400-450m	10.6	なし	なし						なし			
895	白鳥島展望台 鳥後北端、白鳥島展望台付近	鳥取県隠岐の島町	西村	右下	240m	09.9	なし	なし									
896	時張山 時張山の南西斜面	鳥取県隠岐の島町	隠岐北方	右下	320-380m	09.9	なし	なし									

植生情報第15号 (2011年3月)

踏査地域の概要					地域全般のシカ影響		シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策								
回答No.	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の種生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真	
踏査コース・区域					状況記述 (影響に届く場合の傾向、シカ影響の具体的記述、シカ以外の原因による種生への影響、シカ対策、資料、など)													
897	蛸嶋岩展望台	鳥根県隠岐の島町	隠岐北方	左上	50-180m	09.9	なし	なし										
898	大満寺山	鳥根県隠岐の島町	布施	左上・左下	50-500m	10.5	なし	なし						なし				
899	鷺ヶ峰	鳥根県隠岐の島町	布施	左下	400-550m	09.9	なし	なし										
900	那久岬・油井ノ池	鳥根県隠岐の島町	都万	左上	70-90m	09.9	なし	なし										
901	都万	鳥根県隠岐の島町	都万	左下	0-50m	09.9	なし	なし										
902	男池	鳥根県隠岐の島町	西郷	右上	0-30m	09.9	なし	なし										
903	森山	岡山県高梁市	森山	左上	500m	10.11	なし	なし						なし			○	
904	若杉峠	岡山県西粟倉村	西河内	左上	870-1000m	10.6	一部	軽食糞						なし				
905	西町	岡山県美作市	古町	右下	400m	09.11	相当部分	中	視、道、土			イノシシ		耕地周辺	下記		○	
906	二上山	岡山県美咲町	下弓削	左上	650-680m	10.6	なし	なし										
907	大平山	岡山県高梁市・吉備中央町	有漢市場	右上	600m附近	10.6	なし	なし										
908	自然保護センター	岡山県和気町	周臣	左下	192m	10.7	一部	強食、剥視、糞	下記	下記	下記	マツ枯れ	耕地周辺、緑地	電気柵、針金	下記		○	
909	中庄	岡山県倉敷市	倉敷	右上	50m	10.3	なし	なし									○	
910	竜王山	岡山県浅口市	笠岡	右下	50-100m	10.3	なし	なし				下記	下記	マツ枯れ			○	
911	葦嶽山	広島県庄原市	帝釈峽	左下	750-815m	10.6	なし	なし										
912	星居山	広島県神石高原町	高差	右上	800-835m	10.6	なし	なし										
913	堂床山	広島県安芸高田市八千代町	佐々井	右上	250-550m	09.4	相当部分	中	食、剥、糞			イノシシ		マツ枯れ	なし			
914	赤柴山	広島県安芸高田市	安芸吉田	左下	400-450m	09.12	一部	軽食、声、糞				イノシシ	下記	マツ枯れ	耕地周辺	ロープ、金網		
915	白木町古庭・正地	広島県広島市安佐北区	安芸吉田	左下	200-350m	09.12	ほぼ全域	中	食、剥、視、糞、ラ			イノシシ	めた場	マツ枯れ	耕地周辺	ロープ、金網		
916	あさひが丘	広島県広島市安佐北区	飯室左下/祇園左上	290-350m	09.10	一部	軽食、糞					イノシシ	めた場	マツ枯れ	なし			
917	白木町大姥	広島県広島市安佐北区	可部	右下	220-550m	09.12	一部	軽食、剥、糞、道				イノシシ	めた場	マツ枯れ	耕地周辺	ロープ、電気柵		
918	安宿	広島県東広島市豊栄町	乃美	右上	350-750m	09.9	一部	軽食、剥、視				イノシシ	めた場	マツ枯れ	耕地周辺(下記)	ロープ、金網		
919	広島県緑化センター	広島県広島市東区福田	中深川	右下	140-350m	10.5	ほぼ全域	強食、剥、糞、道、土				イノシシ、サル	マツ枯れ	なし				
920	三津	広島県東広島市安芸津津町	田万里市	右下	50-390m	09.6	相当部分	中	食、剥、糞			イノシシ	めた場	マツ枯れ	耕地周辺	ロープ		
921	松子山大池	広島県東広島市西条町	田万里市	左上	約400m	09.10	一部	軽食、糞				イノシシ	めた場	マツ枯れ	なし			
922	宮島	広島県廿日市市宮島町	殿島	右下	5-50m	09.3	全域	強食、剥、視、糞、道、落				サル	不明	台風倒木	なし			
923	宮島	広島県廿日市市宮島町	殿島	右上	5-50m	09.3	ほぼ全域	強食、剥、視、糞、道				サル	不明	マツ枯れ	なし			
924	大崎上島	広島県大崎上島町	木江	左上	200-300m	10.7	なし	なし						マツ枯れ	なし			
925	高山	山口県長門市青海島	青海島北部	左下	10-210m	10.12	なし	なし					イノシシ	振り返し	マツ枯れ	耕地周辺	電気柵(下記)	
926	平わらび台入口	山口県萩市福井上	長門広瀬	左下	350m	10.12	なし	なし									○	
927	船平山	山口県山口市阿東徳佐上	十種峰	右下	390-410m	10.12	なし	なし									○	
928	十種ヶ峰	山口県山口市阿東高年下	十種峰	右上	710-820m	10.12	なし	なし									○	
929	田床山	山口県萩市椿東	萩	左上	80-350m	10.12	なし	なし					イノシシ	振り返し	マツ枯れ	なし		
930	徳佐りんご園周辺	山口県山口市阿東徳佐下	徳佐中	左下	300-320m	10.12	なし	なし									○	
931	船方総合農場	山口県山口市阿東徳佐下	徳佐中	左上	360-390m	10.12	なし	なし									○	
932	鍋提峠	山口県下関市・長門市	徳山	右下	222-350m	10.12	一部	中	食、剥、視、声、糞、道、ラ					マツ枯れ	耕地・緑地周辺	網柵	有害捕獲	○
933	坂根	山口県長門市徳山	徳山	右上	335-397m	10.12	一部	軽食、剥、糞、道				イノシシ		マツ枯れ	耕地・緑地周辺	網柵	有害捕獲	○
934	一ヶヶ岳	山口県長門市徳山	徳山	右上	220-671m	10.12	相当部分	中	食、剥、視、声、糞、道						耕地周辺	金網		○
935	花尾山	山口県美祿市秋芳町	長門湯本	右下	100-669m	10.12	一部	軽食、糞				イノシシ	下記	マツ枯れ	なし			
936	桂木山	山口県美祿市秋芳町	秋吉台北部	左上	200-701m	10.12	一部	軽食、糞				イノシシ	下記	なし				

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響				地域全般のシカ対策			写真
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	
踏査コース・区域																	
状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)																	
937	明木	山口県萩市明木	佐々並	右上	60m	10.12	なし	なし						なし		○	
938	萩往還沿い	山口県萩市明木新切	佐々並	左下	360m	10.12	なし	なし						なし		○	
939	長者ヶ原	山口県山口市徳地船路	大原湖	左下	330-370m	10.12	なし	なし				マツ枯れ	なし			○	
940	平家ヶ岳 平家屋敷跡付近	山口県錦町	周防広瀬	左上	600-850m	10.11	一部	軽食					なし			○	
941	狗留孫山 狗留孫山修禪寺駐車場～狗留孫山山頂	山口県下関市豊浦町	小車	右下	320-616m	10.12	ほぼ全域	強食・糞・道・ラ・土・崩					あり(下記)	電気柵		○	
942	華山 徳仙の滝～山頂	山口県下関市豊田町	西市	左下	200-650m	10.12	ほぼ全域	中食・刺・糞・道・ラ					マツ枯れ	耕地・植林周辺	網柵	有害捕獲	○
943	華山 徳仙の滝～華山山頂	山口県下関市菊川町	西市	左下	160-713m	10.12	ほぼ全域	強食・刺・糞・道					マツ枯れ	植林周辺	金網		○
944	雁飛山 西畑登山口～雁飛山山頂	山口県美祿市於福町	於福	左上	300-580m	10.12	ほぼ全域	強食・刺・糞・道・ラ					マツ枯れ	なし		○	
945	山口県畜産試験場 山口県畜産試験場、管理事務所を起点・終点とし、境内の道路を踏査	山口県美祿市秋芳町	秋吉台	左下	220-310m	10.10	なし	なし			イノシシ	掘り返し					
946	岩永台 中水田地区から2km程度岩永台へ上った地点を起点・終点とし、百合野の穴(洞窟)までの林内を踏査	山口県美祿市秋芳町	秋吉台	左下	140-270m	10.12	一部	軽食									
947	岩永台 中水田集落～岩永台	山口県美祿市秋芳町	秋吉台	左上	90-280m	10.12	一部	軽食			イノシシ	下記	なし				
948	秋吉台 台山より北側を一周	山口県美祿市	秋吉台	左上	200-250m	10.11	なし	なし					なし			○	
949	秋吉台(龍護峰) 平野登山口～龍護峰山頂～中村登山口	山口県美祿市秋芳町	秋吉台	右上	90-420m	10.12	一部	軽食			イノシシ	下記	なし				
950	吉敷佐畑 良城小学校学校林内	山口県山口市	山口	左上	80-110m	11.1	なし	なし					なし			○	
951	瀬戸原 島地川ダムの島地川流入線の左岸山地	山口県山口市徳地引谷	仁保	右上	250-270m	10.12	なし	なし					マツ枯れ			○	
952	島地川ダム 島地川ダムの島地川流入線の左岸山地	山口県周南市	周防鹿野	左下	290-400m	10.11	なし	なし			イノシシ	下記	なし				
953	猿王岳 中岳登山口～猿王岳山頂	山口県美祿市西厚保町	田部	右下	140-280m	10.12	相当部分	中食・刺・糞・道			イノシシ	掘り返し	下記	耕地周辺	金網・電気柵	○	
954	桜山 桜山登山道入り口～南原寺～桜山総合公園	山口県美祿市伊佐町	伊佐	右上	260-450m	10.12	一部	軽食			イノシシ	下記	マツ枯れ	なし			
955	小野湖西岸 標原・如意寺 緑地保全地区	山口県宇部市標原	湯ノ口	左下	50-110m	10.12	なし	なし					なし			○	
956	荒滝山 犬ヶ追登山口～荒滝山山頂	山口県宇部市東吉部	湯の口	左上	190-459m	10.12	なし	なし			イノシシ	下記	なし				
957	芦谷地区 和字(佐波川河畔)	山口県山口市下小幡	矢田	右上	170-180m	10.12	なし	なし					マツ枯れ	なし		○	
958	和字(佐波川河畔) 和字の佐波川左岸河川敷	山口県防府市	矢田	右上	30-40m	10.5	なし	なし					なし				
959	二鹿 市道二鹿6号線終点から奥川連盛所付近(市道終点～林道二鹿川越線～旧山道線～尾根筋を経て550mのピーク～人工林(杉)の谷筋経由で引き返し)	山口県岩国市	玖珂	左上	250-560m	10.12	なし	なし	なし				下記	なし			
960	城山 標山(千石原)・岩国城・種智院・城山・中電鉄塔(96番)・久津神林道・御庄中学校・御庄川(左岸・右岸)・錦川(右岸)・横山(千石原)	山口県岩国市	岩国	左上	10-300m	10.12	なし	なし			イノシシ	掘り返し	マツ枯れ	なし			
961	露降岳 保健保安林	山口県宇部市吉見	阿知須	左上	170-210m	10.12	なし	なし					なし			○	
962	西浦 エヒメアヤマ自生南限地域	山口県防府市	防府	左下	40-50m	10.12	なし	なし					マツ枯れ	下記		○	
963	大平山 落合峠	山口県防府市大字幸礼	防府	右上	450-480m	10.12	なし	なし					なし			○	
964	華山 リフト西島駅～大剣～山頂～二の森～お花畑～行場	山口県山口市秋穂東	竹島	右上	40-100m	10.12	なし	なし					なし			○	
965	華山 奥野井・高越山南東	山口県山口市秋穂東	竹島	右上	50-60m	10.12	なし	なし					なし			○	
966	高越山 奥野井・高越山南東	徳島県吉野川市山川町	臨町	右下	650m	10.4	全域	激ラ土									
967	山城町赤谷 黒川谷川沿い	徳島県三好市	伊予新宮	右下	650m	10.4	全域	軽食									
968	落合峠 落合峠周辺	徳島県三好市	京上	右上	1300-1600m	09.11	なし	なし					なし			○	
969	剣山 リフト西島駅～大剣～山頂～二の森～お花畑～行場	徳島県美馬市・三好市	剣山	右下	1600-1954m	10.10	ほぼ全域	激食・刺・糞・道・ラ土			下記	下記	自然植生内		下記		
970	長安口 長安口～東側山塊のピーク～長安口	徳島県那賀町	長安口貯水池	右上	230-506m	09.5	ほぼ全域	軽食・刺・糞					マツ枯れ	耕地・植林周辺	ロープ柵	○	
971	出羽島 小豆島スカイライン	徳島県牟岐町	牟岐	左上	0-75m	10.2	なし	なし									
972	鏡子溪(小豆島) 小豆島スカイライン鏡子茶屋手前より伝法川へ下りる巡視路	香川県土庄町	小江	右下	約300m	10.8	一部	軽食			サル	下記				○	
973	本島 本島全域	香川県丸亀市	本島	左上	0-200m	09.10	なし	なし					マツ枯れ	なし		○	
974	鹿島 鹿島全体	愛媛県松山市	伊予北条	左上	0-100m	09.5	全域	激食・刺・糞・道・土					その他(苗木)	金網		○	

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響				地域全般のシカ対策					
						影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真			
踏査地域の概要						地域全般のシカ影響													
踏査コース・区域						状況記述 (影響に關する場合は植生、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)													
1014	与津地	高知県四万十町	窪川	右下	250-300m	10.11	なし	なし				イノシシ	掘り返し		なし				
1015	大鶴津	高知県四万十町	窪川	右下	0-120m	10.10	なし	なし				イノシシ	掘り返し	なし					
1016	黒石	高知県四万十町	窪川	右上	240-260m	10.11	なし	なし				イノシシ			なし				
1017	志和峰	高知県四万十町	窪川	右上	270-290m	10.11	なし	なし				イノシシ	掘り返し		なし				
1018	志和	高知県四万十町	窪川	右上	0-40m	10.11	なし	なし				イノシシ							
1019	馬鞍	高知県中土佐町	窪川	右下	120-180m	10.11	なし	なし				イノシシ	掘り返し		なし				
1020	大矢井賀	高知県中土佐町	窪川	右上	10-100m	10.11	なし	なし				イノシシ			なし				
1021	小矢井賀	高知県中土佐町	窪川	右上	60-120m	10.11	なし	なし				イノシシ							
1022	鈴	高知県黒潮町	興津浦	左下	100-120m	10.8	なし	なし							なし				
1023	荷福	高知県黒潮町	興津浦	左下	200-280m	10.10	なし	なし							なし				
1024	橋川上瀬山園有林	高知県黒潮町	興津浦	左上・左下	100-300m	10.10	なし	なし				イノシシ	掘り返し						
1025	島戸	高知県四万十町	興津浦	左上	270-340m	10.11	なし	なし				イノシシ	掘り返し		なし				
1026	興津浦・三崎山	高知県四万十町	興津浦	右上	20-150m	10.11	なし	なし				イノシシ	掘り返し		なし				
1027	権現山	福岡県北九州市八幡西区	八幡	左下	400-430m	10.7	なし	なし							なし				
1028	畑野水池上流	福岡県北九州市八幡西区	徳力	左上	200-350m	09.11	なし	なし											
1029	平尾台	福岡県北九州市小倉南区平尾	菊田	左下	380-580m	10.10	なし	なし							なし				
1030	ロマンスケ丘	福岡県田川市夏吉	金田	右下	200-250m	10.5	なし	なし											
1031	香春岳(三ノ岳)	福岡県香春町	金田	右下	250-510m	10.5	なし	なし											
1032	福智山	福岡県北九州市小倉南区	金田	右上	170-900m	10.11	なし	なし											
1033	御所ヶ谷	福岡県行橋市津積	行橋	左下	約100-150m	10.11	なし	なし				イノシシ	ぬた堀除け	マツ枯れ	なし				
1034	龍王山	福岡県飯塚市八木山	篠栗	右下	300-615m	10.11	なし	なし				イノシシ	柵にめた場		なし				
1035	日玉山	福岡県飯塚市・福智町・糸田町	田川	左上	100-220m	10.11	なし	なし							なし				
1036	小石原川上流・水浦	福岡県東峰村	小石原	左上	650m	09.6	相当部分	中	食 視 声 糞 道	イノシシ	農作物被害	植林周辺				下記		○	
1037	脊振山	佐賀県神埼市	脊振山	右下	850-968m	09.10	なし	なし											
1038	岸岳	佐賀県唐津市相知町	相知	右上	50-150m	10.2	なし	なし							なし				
1039	九千部山	佐賀県鳥栖市河内町	中原	右上	450-750m	10.9	なし	なし				イノシシ			なし				
1040	大通山	佐賀県伊万里市東山代町	桶久	左下	450-550m	10.9	なし	なし							なし				
1041	今岳	佐賀県伊万里市大坪町	伊万里	左下	150-200m	10.7	なし	なし											
1042	御船山	佐賀県武雄市武雄	武雄	左下	100-200m	10.9	なし	なし							なし				
1043	野崎島	長崎県小値賀町	小値賀島	左下	0-100m	09.10	ほぼ全域	激	食 視 声 糞 道 土 崩	下記					その他		金網		○
1044	伏勢	長崎県大村市	武留路山	左下	250m	09.6	なし	なし				イノシシ			なし				
1045	龍良山	長崎県対馬市厳原町	豆股	左上	150-200m	10.11	一部	軽	食 声 糞	下記	イノシシ	表土攪乱		耕地周辺(下記)	金網、電気柵				
1046	岩野養生	熊本県山鹿市鹿北町	高井川	右上	200-250m	10.11	相当部分	中	食 糞	イノシシ					なし				
1047	中尾	熊本県小国町西里	宮原	右上	600-650m	10.11	なし	なし				イノシシ			なし				
1048	大津山	熊本県南関町	関町	左上	100-250m	10.10	なし	なし							なし				
1049	新宮牧野	熊本県阿蘇市瀬浦	瀬浦寺	左下・右下	830-860m	10.8	一部	軽	刺	イノシシ	掘り返し			なし					
1050	菊池溪谷	熊本県菊池市菊池溪谷	鞍岳	左上	550-600m	10.8	なし	なし							なし				
1051	鞍岳	熊本県菊池市旭志	鞍岳	左上	1000-1100m	10.10	なし	なし							なし				

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	踏査地域の概要					地域全般のシカ影響			シカ以外の原因による影響			地域全般のシカ対策				
	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の影響	それらの動物の具体的な影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真
踏査コース・区域					状況記述（影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的な記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など）											
1091	屋敷野	宮崎県椎葉村	日向大河内	右上	950-1100m	10.10	全域	激	食・剥・糞・道・ラ・土・崩				下記	ロープ電気柵		○
大河内峠〜ウノシ谷					耕地周辺、植林周辺、自然植生内に防護柵。資料あり（植生調査資料、学会発表、報告書、論文・市販本）。											
1092	尾鈴山矢研滝	宮崎県都農町	尾鈴山	右下	450-500m	10.11	全域	強	食・剥・糞・道・ラ				なし			○
キャンプ場入口駐車場〜矢研滝					岩崖地は影響なし。車道沿いも食害あり。											
1093	上面木山山麓	宮崎県川南町	石河内	右上	200-350m	10.10	全域	強	食・剥・視・糞・道・ラ				自然植生内(下記)	金網		○
切原川上流					岩崖地を除く。ダム建設に伴う稀少種の移植先に防護柵。											
1094	矢岳・滝下山	宮崎県えびの市	大塚	右下	600-700m	10.8	全域	強	食・剥・視・糞・道・ラ・土				なし			○
JR矢岳駅〜野崎〜鹿児島県境																
1095	狗留孫峽	宮崎県えびの市	白森岳	左下	300-550m	10.11	全域	中	食・剥・糞				なし			○
大坪平〜葎杉〜狗留孫神社					車道沿いの法面と岩崖地は影響なし。											
1096	堂屋敷	宮崎県小林市須木	田代ヶ八重	左上・左下	400-600m	09.9	全域	強	食・剥・糞・道・ラ				なし			○
木浦木〜鳥田町〜夏木〜堂屋敷					岩崖上と急斜面は「なし」											
1097	国見山山麓	宮崎県西郷市	三納	左上	100-500m	10.9	ほぼ全域	強	食・剥・糞・道・ラ				なし			○
三納札の元〜三納川上流赤木谷					崖地を除く。											
1098	熊山自動車修繕場	宮崎県えびの市	加久藤	左下	300-450m	10.11	ほぼ全域	軽	食・糞				なし			○
演習場内					演習が行われており、ススキ草原などの、食害なしを予想したが、草地〜湿草地であり、自衛隊にシカ対策をお願いした。「ネットは張れない」「靴で踏まない」											
1099	綾南川(川中周辺)	宮崎県綾町	大森岳	左下	150-350m	09.5	全域	中	食・剥・糞・道・ラ	下記			なし			○
川中キャンプ場跡〜綾南川左岸の上流約1km、下流約800m					アフリドリシシやリュウノギやアサギアカネの根木類、下層植生中のシイ・カシ類やヤブニッケイ、地上性ラン科植物、ハシロヨウケイ、ツルクウジ、ヤブコウジ等に食害が目立つ。また、設置では雑草類でコンシキ、タブノキ、落葉樹でネムノキ、イヌビロ、針葉樹でカヤ、モミ、ツバキ、アカマツ、クロマツ、スギ、ヒノキが目立つ。胸高直径30-40cm程度のタブノキが剥皮で腐朽層が入り、林内で不自然に倒れているが見られる。											
1100	巨田池	宮崎県宮崎市佐土原町	佐土原	左上	50m	09.9	なし	なし								
佐土原周辺のため池植生					宮崎平野の「川南」「高鍋」「佐土原」「宮崎北部」「宮崎」は鹿の非侵入域											
1101	えびの高原	宮崎県えびの市	韓国岳	右下	1180-1250m	10.3	ほぼ全域	強	食・糞				なし			○
えびの高原ビジターセンター〜周辺から白紫池までに至る登山道					センター周辺で数頭の群れ2つ確認(目視)。人が数mまで接近しても逃げない。観光客の餌やりの影響があると思われる。											
1102	杉の本谷	宮崎県宮崎市高岡町	有水	右上	150-200m	09.12	相当部分	中	食・糞・道				植林周辺	ロープ	なし	○
杉の本谷の流路沿い。溪畔域を対象とする。																
1103	和石(よれい)・国見山	宮崎県宮崎市高岡町	有水	右上	100-400m	09.10	相当部分	中	食・剥・糞・ラ				なし			○
去川〜和石〜七瀬					ススキチガヤ草原(カヤ場)〜水田には食害なし、その上方の森林域には食害あり。											
1104	加江田	宮崎県宮崎市	日向青島	左上	10-100m	10.11	なし	なし								○
加江田川中下流の右岸					宮崎市以南の日向市(北郷町、南郷を含む)〜串間市にはシカの食害なし。「非侵入域」は、1/25000の日向青島、郷之原、築地原、坂元、鶴戸、萩原、尾平野、油津、椋原、園田、水城、串間、郡内、栗原、庄内、高城は侵入域											
1105	猪八重集落より上流	宮崎県日南市	坂元	右上	80-150m	09.8	なし	なし								○
猪八重集落より上流																
1106	上白木俣・割岩谷	宮崎県日南市	尾平野	右上	200-400m	09.3	なし	なし								○
酒谷川の上白木俣〜割岩谷上流へ																
1107	奴久見	宮崎県串間市	串間	左上	100-200m	09.10	なし	なし								○
奴久見一帯の草原					シカの非侵入域											
1108	五女木	鹿児島県伊佐市	山野	左上	350-500m	10.4	相当部分	軽	食				なし			○
羽月川支流																
1109	木地山	鹿児島県伊佐市	山野	右上	700-800m	10.4	ほぼ全域	強	食・剥・糞・道	イノシシ	掘り返し		なし			○
1110 紫尾山					10.7 相当部分 強 食・剥・糞・道 植生調査資料有り。											
1111 定之段					10.5 全域 激 食・糞・ラ イノシシ 耕地周辺 金網											
1112 鶴田ダム					10.9 ほぼ全域 強 食・糞・ラ											
1113 八重山					10.5 ほぼ全域 強 糞・ラ											
1114 龍ヶ岳					10.9 なし なし											
1115 桜島/海釣り公園					10.3 なし なし											
1116 桜島/有村港展望所					10.3 なし なし マツ枯れ なし											
1117 高隈山					10.3 なし なし											
1118 大隈柄岳					10.9 なし なし イノシシ 下記 下記 なし											
1119 高隈山御岳					10.5 なし なし イノシシ 掘り返し											
1120 高隈山					09.6 なし なし イノシシ											
1121 佐多岬					09.5 なし なし サル 下記											
1122 黒島					10.7 なし なし ヤギ 下記 下記 下記											
1123 鹿之峯					10.11 一部 中 食 耕地周辺 金網 ネット											
1124 住吉大道					10.11 相当部分 強 食 なし											
1125 野間松原山					10.10 なし なし 下記											
1126 屋久島/西部林道					09.3 全域 強 剥・視・声・糞・道 サル なし											
1127 屋久島/小杉谷					09.3 相当部分 強 視 下記 植林周辺 金網											
1128 帝釈・田代山					08.8 相当部分 軽 食・糞・道 なし											

植生情報第15号 (2011年3月)

踏査地域の概要					地域全般のシカ影響				シカ以外の原因による影響				地域全般のシカ対策					
回答No.	地名	都道府県・市区・町村	1/25000地形図図幅	位置	標高域	踏査年月	影響範囲	影響程度	シカの影響・痕跡の種類	その他のシカの影響	シカ以外の動物の具体的影響	それらの動物の具体的影響	その他の植生変化	防護柵の設置	防護柵の種類	その他のシカ対策	写真	
踏査コース・区域					状況記述 (影響に偏りがある場合の傾向、シカ影響の具体的記述、シカ以外の原因による植生への影響、シカ対策、資料、など)													
1129	コビサワラ原生林	静岡県伊豆市菅引	伊東	左上	600-745m	08.8	ほぼ全域	強	食、剥、糞、道、ラ						樹林・ワサビ田圃	網?	○	
コビサワラ原生林周遊																		
1130	天城山	静岡県伊豆市冷川	天城山	左下	800-1300m	08.9	一部	中	剥、視、糞	下記	テン	なし	ササ開花枯死	なし				
天城高原G C付近から万三郎岳					尾根の夏緑広葉樹林が影響が大きい。下層植生の植被率及び多様性低下。植生調査資料有り。													
1131	神狭	兵庫県豊岡市出石町	出石	左下	20-90m	08.7	ほぼ全域	中	食、剥、視、糞、道、土	農作物被害	下記	マツ枯れ	耕地周辺	ロープ				
特殊集落の山麓					農耕地に近いところが影響が大きい。イノシシ、タヌキがいるが影響はほとんどなし。													
1132	畑	兵庫県養父市	八鹿	右上	130-400m	08.11	ほぼ全域	強	食、剥、視、糞、道	農作物被害	下記	下記	マツ枯れ	耕地周辺	ロープ(下記)	下記		
畑集落を取り囲んだ山地					耕地及び水田周辺で影響が大きい。イノシシ、テン、タヌキがあり、イノシシが一部で農作物を掘り起こし被害。イノシシにはトタン囲いで防護。3カ所にトラップあり													
1133	竹原貯水池	兵庫県洲本市草	由良	左上	100-180m	08.10	全域	強	食、剥、視、糞、道、土、崩	下記	下記		耕地周辺	ロープ				
竹原貯水池周辺丘陵					水堀に近いところが影響が大きい。農作物の被害が著しい。イタチ、タヌキがいるが影響はほとんどなし。													
1134	兜岳	長崎県長崎市	長崎西南部	右下	200-240m	08.3	ほぼ全域	激	食、剥、糞、ラ、土									
長崎市内より兜岳方面への林道へ入る																		
1135	小八郎岳	長崎県長崎市	肥前高島	右上	470-490m	08.3	ほぼ全域	激	食、剥、糞、ラ、土									
長崎市八郎岳山塊																		
1136	今里(太祝詞神社裏)	長崎県対馬市美津島町	阿連	左下	60-100m	08.3	相当部分	激	食、剥、糞、土						耕地周辺	ロープ		
太祝詞神社裏より尾根方向へ登る					草本層の植被率低く、A層の流出見られる。階層構造の崩壊。													
1137	上見坂	長崎県対馬市美津島町	厳原	左上	300-320m	08.3	ほぼ全域	激	食、剥、糞、ラ、土(初期)									
上見坂公園近く					本木、激しく表土流出する環境であるが、アカガシなど分解されにくい葉が堆積し、表土流出があまり目立たない。													
1138	万松院	長崎県対馬市厳原町	厳原	左下	50-70m	08.3	ほぼ全域	激	食、剥、糞、ラ、土									
厳原市街の西																		
1139	大嶽山	大分県国東市橋本	鶴川	左上	150-300m	08.7	ほぼ全域	中	食、剥、視、糞、道、土	イノシシ		マツ枯れ	耕地周辺	電気柵			○	
行入ダム～大嶽山					資料あり(植生調査資料、報告書)													
1140	猪の瀬戸コース	大分県由布市湯布院町	別府西部	左中・左下	650-800m	08.10	相当部分	中	食、剥、糞	イノシシ		マツ枯れ	なし					
湯布院塚町～猪の瀬戸																		
1141	祖母山	宮崎県高千穂町	祖母山	右上	700-1200m	07.10	一部	軽	剥、糞									
五力所から祖母山(国見峠)																		
1142	烏帽子岳	宮崎県椎葉村・熊本県杵臼	国見岳	左下	1450-1691m	07.7	全域	強	食、剥、糞、道、ラ								○	
椎葉越～山頂					岩崖のみ影響なし													
1143	国見岳	宮崎県椎葉村・熊本県杵臼	国見岳	左上	1000-1739m	08.8	全域	激	食、剥、糞、道、ラ、土								○	
泉村樫木～登山道路～国見岳山頂																		
1144	石堂山	宮崎県西米良村	石堂山	左下	900-1400m	07.10	全域	激	食、剥、糞、道、ラ、土								○	
井戸内谷コースから山頂への途中まで					岩崖地は「なし」													
1145	高千穂河原	鹿児島県霧島市	高千穂峰	左上	980-1110m	08.10	ほぼ全域	中	食、糞、道				下記	なし			○	
高千穂河原ビジターセンターからつつじコース遊歩道					湯食谷内の樹林内ではあまり被害が目立たないが、台地止ミヤマキリシマ群落縁部のススキ草地で被害が目立つ。局地的に集中的な採食による半壊地が散在中。その他、樺林や草地の遷移進行。霧島山系ではえびの高原で50m以上高から薪付けが行われており、山系全体でのシカ生息密度は非常に高い。特にえびの高原での被害が顕著で、下層植生が進んでおり、天然記念物ノコギリ保護のため防護柵が設置されている。山系東南部にあった本地域ではまだ被害による植生被害は顕著ではないように思われる。なお、山麓のシカ・カンサシ帯では、シカの生息は見られるが、もともと灌叢上に成立した下層植物は貧弱で、被害の程度は不明。またえびの高原中腹のかつての草原帯では、隣接するモミ・ツガ樹林帯に生息する群が夜間帯時夜草帯に出没して草地牧草を食害する光景を20年ほど前に目撃している。													
参考(場所不特定)																		
1146	5万分の一帯広	北海道帯広市(一部、芽室町)	帯広南部・芽室	全面	30-130m	10.6	なし	なし										
帯広市(芽室町)					シカは河川沿いに山裾から降りてきて、年に1回程度、新聞種になる。かつてはそのような新聞種は少なかったはず。													
1147	尾瀬	福島県檜枝岐村・群馬県片品村	碓ヶ岳・三平峠	全面	1100-2010m	97.8-	全域	激	食、剥、視、糞、道、土	クマ	皮剥ぎ	なし					○	
新潟県湯之谷村 至仏山・尾瀬ヶ原					08.8 国立公園なので、環境省がシカ対策委員会設置。2009年は調査を行っている。資料あり(植生調査資料、学会発表、報告書「尾瀬の環境と野生」)。尾瀬の湖沼の低層湿原部分のほとは、植生攪乱が発生していると考えられる。足置層が20-30m掘り下げられており、蒸気層や大雨の場合は水没となっている。													
1148	村上市全域	新潟県村上市				10.9	なし	なし										
					全域に被害情報なし													
1149	関川村全域	新潟県関川村				10.9	なし	なし										
					全域に被害情報なし													
1150	魚沼市全域	新潟県魚沼市				10.11	なし	なし										
1151	糸魚川市	新潟県糸魚川市					なし	なし				下記	下記	ナラ枯れ	なし			
					イノシシ、サル、クマ。水田の踏み荒らし、野菜の食害、果樹の食害。													
参考(締切後の回答)																		
1152	えびの高原	宮崎県えびの市・鹿児島県霧島市	韓国岳	右下	1200-1700m	10.9	全域	強	食、視、糞、道、ラ、土								下記	○
飯岳、白鳥岳、えびの高原、韓国岳					飯岳山頂付近、白鳥岳山頂など一部では影響程度「激」。九州森林管理局が、H21~22にかけて中央山地～霧島のシカ調査をしている。ノコギリ自生地東側などにネット試験を始めている。													
1153	新燃岳・矢岳	宮崎県小林市・鹿児島県霧島市	高千穂峰	左上	-1300m	10.9	全域	強	食、糞、道、ラ、土(一部)								○	
中岳(新燃岳近く)、矢岳																		
1154	御池・小池	宮崎県高岡町・都城市	高千穂峰	右上	370m	10.8	全域	激	食、糞、道、ラ、土(一部)								○	
御池、小池周辺																		
1155	夷守岳	宮崎県小林市	日向小林	左下	600-1200m	10.8	ほぼ全域	強	食、糞、道、ラ、土、崩								○	
夷守岳																		

植生情報第15号 (2011年3月)

附表2. シカ影響アンケート回答の記載内容 (踏査地域の群落ごとの記載).

チェックシート (図1) の設問20~31への回答記載内容をまとめた。1件 (1地域) の回答に対応する回答No. は附表1と共通で、当該地域については附表1を参照。1件の回答に記載された複数の群落型には、アルファベット (A-E) を与えた。群落についての記載がなかった回答は欠番とした。附表1と同様、回答は都道府県別にほぼ北から南に配列した。『群落・群集名 (優占種)』は回答者による記載に依った。『植生タイプ』では以下の略号を用いた。高木林: 森林 (10m以上)、低木林: 森林 (10m未満)、常広: 常緑広葉、夏広: 夏緑広葉、常針: 常緑針葉、夏針: 夏緑針葉、自: 自然植生、二: 二次植生、植: 植栽。『群落全般への影響』の基準は表1を参照。

回答No.	地名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食害・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ不嗜好種 (不) と嗜好種 (嗜)、食痕のある種 (食)							
									その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)
1 A	ボン沼	針広混交林	高木林 混交 自	個体に食害	少数	トドマツ	食痕なし	食痕なし	クマイザサ
2 A	上サロベツ湿原	スマガヤ群落	草原	個体に食害					
B		ツルコケモモ・イボミズゴケ・ホロムイヌゲ	草原	なし					
3 A	川口	シラカンバ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕少数	食痕なし	
4 A	敏音知岳	トドマツ・シナノキ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕少数	食痕なし	チシマザサ (林床に優占)
		暗ムカゴイグサ、エノアジサイ、ヤマブドウ、オニシモツケ (トドマツ植林中)				優占種: トドマツ、シナノキ、ダケカンバ、アカイタヤ、ミズナラ			
5 A	オムサロ遺跡公園	ナラ林 (カシワ×ミズナラ?)	高木林 夏広 自	個体に食害			食痕少数	食痕少数	
		不・トリカブト類、バイケイソウ、ハナウド、ハラ属、キイチゴ属				ヤナギ類の芽、オオヤマザクラ若枝、アザミ類、ラン科、ササ類、牧草、ツリガネニンジン、オオハバユリ、スズランなどに食痕あり。			
6 A	知床岬	海岸草原群落	草原 自				食害枯死・消失	食害枯死・消失	下記
B		トドマツ・ミズナラ林	高木林 混交 自	林床衰退	多数、多数枯死	下記	食害枯死・消失	食害枯死・消失	クマイザサ、チシマザサ
						樹皮剥ぎ/ハルニレ、オヒヨウ、イチイ、ノリウツギ等。林内では林床植生の消滅に加えて、トドマツ以外の樹木の種樹がほぼ消滅し、高さ約2.5m未満の枝葉も採食されて、ディアラインの形成が顕著になっている。このため、森林の更新阻害が懸念されている。本来の林床は採食されてほとんど消滅し、ササ類も減少した。不食種と思われるシラネアオイ、ミミコモリ、ツタウルシ等の多く限られた種が優占している。樹皮剥ぎ 嗜好性の高い種は1990年代前半には樹皮剥ぎで枯死して消滅し、シカ害が最大値 (調査年度で約600頭) に達した1998年には、それまで採食していなかったミズナラ大径木 (60cm程度) まで採食されるようになった。またトドマツ小中径木における角根茎による樹皮剥ぎも著しいが、こちらは枯死にはつながらない。			
7 A	上業別	ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	オオツリバナ	食痕少数	食痕少数	オオハバザサ、クマイザサ
		食: クマイザサ、オオハバザサ、コマユミ、アズキナシ、チシマアザミ、コガネギク、エゾノヨロイグサ、ミヤマタタビ		調査票あり					
B		ハルニレ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
				調査票あり					
8 A	弥生	ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	クマイザサ
		食: オオカメノキ、イチイ、コマユミ、コガネギク、チシマアザミ、ハウチワカエデ、ヤマブドウ、アマニウ、エゾスズラン、エゾイタヤ、オオツリバナ、ヤマゴ、エゾウコギ		調査票あり					
B		トドマツ林	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	木葉なし	
				調査票あり					
9 A	志露峠	ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	オオハバザサ、クマイザサ
		食: ミヤマタタビ							
10 A	羅臼岳登山道	ダケカンバ林	高木林 夏広 自	個体に食害			食痕少数	食痕少数	チシマザサ、クマイザサ
B		暗チシマザサ 食マルバシモツケ、オオカメノキ、ミネカエデ、オガラバナなどの枝先	高木林 混交 自	林床衰退	多数、少数枯死	下記	食害枯死・消失	食痕多数	チシマザサ、クマイザサ
		不: エゾユズリハ、ツタウルシ、シラネワラビ							不嗜好種の他はほとんどが採食されている。樹皮の採食としてオヒヨウ、ハルニレ、イチイ、オオハバダイジュ、キハダなどが著しく、角根茎による樹皮剥ぎはトドマツ小中径木に多い。
11 A	羅臼岳	トドマツ、アカエゾマツ、ダケカンバ	高木林 混交 自	林床衰退	なし		樹皮食害	食痕なし	クマイザサ、チシマザサ?
B			高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	木葉なし	
				林床はツタウルシのみが目立つ					
12 A	知床達山	ハイマツ群落	低木林 常針 自	なし					
B		高山雪田群落	草原 自	個体に食害	なし		食痕多数		
C		暗チシマザサ、エゾゼンテイカ、チシマキンバイソウ、シラネニンジンなど							
		高山湿原	草原 自	個体に食害	なし		食痕少数		
		不: ミネハライ							
13 A	丸瀬布金山	ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	木葉なし	
		食: エゾノヨロイグサ、サラシナショウマ、ハイヌツグ、ミヤマガマズミ、ナナカマド、オオカメノキ、アマニウ		調査票あり					
14 A	瀬戸湖山	ミズナラ林	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	木葉なし	
		食: チョウセンゴミシ、ミヤマガマズミ		調査票あり					
15 A	生田原水穂	ミズナラ林	高木林 夏広 自	個体に食害	少数	オヒヨウ	食痕多数	木葉なし	
		食: アズキナシ、ミヤマガマズミ、イヌエンジュ、エゾムラサキツツジ、アキカラマツ、ミズナラ、キジムシロ、オオツリバナ、ミツバベンケイソウ、ヤマハギ、オオハバザサ、ヒメカンスダ、イブキゼリモドキ、ミヤマザクラ、ハウチワカエデ		調査票あり。林道沿いの斜面中部。鹿道だけでなく、鹿フンも多く、かなり食痕が多かった。砂岩。					
B		ミズナラ林	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	木葉なし	
		食: ハウチワカエデ、エゾマコナ、イブキゼリモドキ、ヤマハギ、ハウチワカエデ、ヤナギタンポポ、ヤマウルシ		調査票あり。林道沿いの斜面中部。鹿道や鹿フンが多かった。砂岩					
C		ミズナラ林	高木林 夏広 自	個体に食害	少数		食痕少数	木葉なし	
		食: イヌエンジュ、ヤマウルシ		調査票あり。林道沿いの斜面中部。鹿道、鹿フンあり。流紋岩					
16 A	東芭露	ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	オオハバザサ
		食: イヌエンジュ		調査票あり					
17 A	武判	ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害			食痕少数	木葉なし	
		食: コガネギク、チシマアザミ、オオカメノキ、アイヌタチツボミシ、チシマアザミ、ヤマブドウ		調査票あり					
B		アカエゾマツ林	高木林 常針 自	個体に食害	少数		食痕少数	木葉なし	
		食: オガラバナ		調査票あり。シカ道、シカ糞多い。					
C		オオハバダイジュ・シナノキ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	クマイザサ
		食: コロンソウ		調査票あり					
18 A	仁田布川	ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	下記	食痕少数	食痕少数	クマイザサ、チシマザサ
		食: オオツルウメドモク、オオカメノキ、チシマザサ、コヨウラクツツジ、オオハバザサ		樹皮剥ぎ: オオハバダイジュ、アカイタヤ、エゾイタヤ。調査票あり					
B		トドマツ林	高木林 混交 二	個体に食害	なし		食痕少数		下記
		食: コヨウラクツツジ、ナナカマド、オシダ、シノバカグマ、ハウチワカエデ、コガネギク、ゴゼンタチバナ、シラネワラビ、チシマアザミ、ハエドクソウ、ミヤマガマズミ、コマユミ		ササ: クマイザサ、チシマザサ、オオハバザサ。調査票あり。林縁には、ヨブスマソウやハンゴンソウが増え、シカの影響?					
18 C		ウダイカンバ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	クマイザサ
		食: ハウチワカエデ、クマイザサ、オオカメノキ、チシマアザミ		調査票あり					

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全層への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
19 A	生田原清里	ミズナラ林 食: オオカメノキ、ヤマウルシ、エゾムラサキツツジ、ハウチワカエデ、ミヤマガマズミ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕多数	本葉なし	
B		ミズナラ林 食: イワガラミ、アキカマツ、ハリギリ、イヌエンジュ、ニガナ	高木林 夏広 自	個体に食害	少数枯死	樹種不明	食痕少数	本葉なし	
21 A	金華	トドマツ林 食: ハウチワカエデ、コガネグク、オオカメノキ、ミヤマガマズミ	高木林 夏広 自	個体に食害	少数	アズキナシ	食痕少数	本葉なし	
23 A	物満内林道	ハルニレ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
24 A	音威富士南西麓	オノエヤナギ?林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ、クマイザサ
25 A	天塩川温泉	ミズナラトドマツ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ(林床に優占)
26 A	観徳(大手沢川)	ハルニレ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
27 A	富岡川向	ミズナラ-ダケカンバ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
28 A	美深ハンケ川	ミズナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
29 A	松山湿原周辺	アカエゾマツ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ(林床に優占)
B		エゾマツ-ダケカンバ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ(林床に優占)
30 A	美深公園「望の森」	ミズナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ(林床に優占)
31 A	激流の滝	ヤマハンノキ-ウダイカンバ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ、チシマザサ
32 A	松山湿原	ミカツギサ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ(湿原周辺)
33 A	忠烈布野水池	ミズナラトドマツ林	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
34 A	仲線小沢	ミズナラ群落 不: ハンゴンソウ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕少数	食痕少数	クマイザサ
B		シラカンバ群落 不: ハンゴンソウ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕少数	食痕少数	クマイザサ
35 A	岩尾内湖	シラカンバ林(純林)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
36 A	南丘森林公園	ハルニレ-ハリギリ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ(林床に優占)
B		ミズナラ-ウダイカンバ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ(林床に優占)
37 A	浮島湿原	ミカツギサ群落 嗜: コバキボウシ。葉身を喰われ、葉柄のみの個体が多い(約半数の個体)。	草原 自	個体に食害			食痕多数	本葉なし	
B		エゾマツ-ダケカンバ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ(密生)
38 A	旭川12世紀の森	ミズナラトドマツ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ(林床に優占)
39 A	層雲峡	植	低木林 夏広 植	個体に食害	少数	ナナカマド	食痕少数	食痕なし	
40 A	黒岳五合目	落葉広葉樹林(ダケカンバなど)	高木林 夏広 自						
41 A	大雪山/赤岳	ダケカンバ群落	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本葉なし	
B		ハイマツ群落	低木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本葉なし	
C		高山風衝草原(チシマツガザクラ、イワウメ等)	低木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本葉なし	
44 A	野付半島	ミズナラ林	高木林 夏広 自	林内構造変化	多数	ナナカマド	食痕多数	食痕少数	ミヤコザサ
45 A	阿寒湖畔	針広混交林 不: ルイヨウボタン、ハンゴンソウ、クリンソウ、ヒトリシズカ、ハルカラマツ、ホトトギス、エンレイソウ属、ミス、キツリバナ他多数。	高木林 混交 二	林内構造変化	多数	下記	食痕多数	食痕多数	クマイザサ
46 A	春国岳	塩湿地~海岸草原 嗜: ウラギク、マルミノシバナ、チシマジョウツナギ、シカグク、オカヒジキ、ホソバハマカザなど	草原 自	個体に食害			食痕多数	食痕少数	オオクマザサ(ミヤコザサ)
47 A	花咲港西	針広混交林 不: シラネウラボシ、バイケイソウ	高木林 混交 自	林内構造変化	多数	下記	食痕少数	食害枯死・消失	
48 A	音別川上流域	針広混交林 不: ハンゴンソウ、クリンソウ	高木林 混交 自	樹皮剥ぎ	イチイ、トドマツ、ナナカマド。現在の林床の食痕は少ないが、採調査で植生がかなり変化してきている。		食痕少数	食痕多数	ミヤコザサ
49 A	釧路湿原	ヨシ-ヤマメシゲ群落	草原 自						
B		ヨシ-イワノガリヤス群落	草原 自						
50 A	サルボ	落葉広葉樹林 不: ハンゴンソウ、フクジュソウ(キタミ含む)。嗜: エゾイラクサ、アキバキ他多数	低木林 夏広 二	林内構造変化	多数	下記	食痕多数	食痕多数	オオクマザサ(ミヤコザサ)
51 A	落石岬	アカエゾマツ林	高木林 常針 自	林床衰退	少数	アカエゾマツ	食痕多数	本葉なし	わずかにミヤコザサが生育
B		ササ草原(ミヤコザサ)	草原 自	オガラバナなど広葉樹は被食により衰退。アカエゾマツ林は越冬地として利用されている。			概ね食害	食痕多数	ミヤコザサ
52 A	ヌブキベツ	トドマツ、ハルニレ、イタヤ、カツラ優占 不: ハンゴンソウ、フクジュソウ、オオアワダチソウ	高木林 混交 自	林床衰退	少数	ハルニレ	概ね食害	食痕多数	ミヤコザサ
53 A	幌加温泉	エゾマツトドマツ林	高木林 常針 自	林内構造変化	なし		食痕多数	食痕多数	クマイザサ
54 A	幌加美里別		高木林 常針 自	アカエゾマツの枝にも食痕あり。温泉宿の周辺に多数の個体が居っている。			食痕多数	食痕少数	ミヤコザサ
		不: ハンゴンソウ。嗜: オヒョウ、アオダモ、オオヨモギ		数年前から毎年見ているが、食痕が見つかる植物の種類が増加している。					

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全層への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
55 A	糠平温泉	針広混交林(トドマツ) 不:エトリカバト	高木林 混交 自	林内構造変化	少数	ナナカマド	食痕多数		ミヤコザサ
56 A	パンケニコロベツ林道	落葉広葉樹林 不:オニルリソウ、ハンゴンソウ、ヨブスマソウ	高木林 夏広 自	なし					
57 A	然別湖	エゾマツ・トドマツ群集(トドマツ) 嗜:ササ	高木林 常針 自	個体に食害	なし	なし	食痕少数	食痕少数	不明
58 A	拓北・仲和	シノノキ・イタヤ 不:フッキソウ、ハンゴンソウ。嗜:フキ	高木林 夏広 自	個体に食害	少数	アオダモ、オヒョウ	概ね食害	食痕少数	ミヤコザサ
B		カラマツ造林地(カラマツ) 嗜:カラマツ	低木林 夏針 植	林内構造変化	少数枯死	カラマツ	食痕少数	食痕少数	ミヤコザサ
59 A	新得山	ミズナラ・アカイタヤ林	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	アオダモ	食痕少数	食痕少数	クマイザサ
60 A	栄穂地区	針広混交林 不:アメリカオニアザミ	高木林 混交 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	ミヤコザサ
61 A	広内	ミズナラ・ウダイカンバ 嗜:オノエヤナギ	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	クマイザサ節
62 A	炭山(道有林)	針広混交林(トドマツ) 不:クリソウ	高木林 混交 自	林内構造変化	なし		概ね食害	食痕多数	ミヤコザサ
63 A	沙流川源流	不明(道路脇の法面(草地)) 不:オオアワダテソウ	草原 植	林内構造変化	なし	なし	食痕多数	本来なし	
B		トドマツ・エゾマツ群集	高木林 常針 自	個体に食害	なし	なし	食痕多数	食痕多数	不明(葉裏に毛あり)
64 A	沙流川源流原始林	エゾマツ・トドマツ群集 嗜:オシダ、エゾメシダ	高木林 常針 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	クマイザサ、チシマザサ
B		クマイザサ群落 不:ハンゴンソウ	草原 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
C		林縁草地	草原 二	個体に食害	なし		食痕多数	食痕なし	クマイザサ、チシマザサ
65 A	久保	嗜:アキタブキ、イネ科の草本。 不:ハンゴンソウ トドマツ人工林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	オオハザサ
66 A	大津・長節原生花園	原生花園	草原 自	なし			食痕なし		
67 A	賀張	カシワ等落葉広葉樹群落 不:ハンゴンソウ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕少数	食痕少数	ミヤコザサ
69 A	アボイ岳	エゾマツ・トドマツ群集	高木林 常針 自	個体に食害	なし		食痕なし	食痕少数	チシマザサ
B		アボイツメクサ群落	草原 自	なし	なし				
C		ウコンツギ-ダケカンバ群落	低木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
70 A	アボイ岳	トドマツ林	高木林 常針 自	林内構造変化	多数	下記	概ね食害	食痕多数	ミヤコザサ、一部スタケ
71 A	幌満川	トドマツ-キタゴヨウ林(トドマツ) 不:エゾオオサクラソウ、エゾズリハ、ハクサンシャクナゲ	高木林 常針 自	林内構造変化	少数	アオダモ	食痕多数	本来なし	一部にミヤコザサスタケ
72 A	えりも岬	海岸草原(エゾノヨロイグサ)	草原 自	なし					
74 A	雨竜沼源	ダケカンバ林 嗜:チシマアザミ(コバナアザミ)	低木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
B		高層湿原	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		チシマザサ群落	低木林 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
75 A	宮城の沢	ベニイタヤ・ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	クマイザサ
76 A	川岸	ハルニレ・ケヤマハンノキ林 不:フッキソウ	高木林 夏広 二	林内構造変化	多数	ハルニレ	概ね食害	食痕少数	クマイザサ節
77 A	東森井江	シノノキ・エゾイタヤ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	クマイザサ
B		カラマツ人工林	高木林 夏針 植	なし	なし		食痕少数	食痕少数	クマイザサ
78 A	右惣沢	トドマツ林	高木林 混交 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	クマイザサ節
79 A	石狩浜	ハマナス群落	低木林 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		ハマニク(テンキグサ)群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
80 A	月形町大沼	ヨシ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
81 A	専修短大演習林	シラカンバ・ミズナラ林、一部にカラマツ植林 食:クマイザサ、オオカメノキ、アキタブキ、エゾイラクサ、キツリフネ、オオヨモギ	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	下記	食痕少数	食痕少数	クマイザサ
83 A	東西林道	トドマツ・針広混交林	高木林 混交 自	樹皮剥ぎ:ハルニレ、オヒョウ、ノリウツギ、Euonymus属。トドマツの小中径木にわずかに角砥ぎによる樹皮剥ぎが見られる。	なし		食痕少数	食痕少数	クマイザサ節
84 A	石狩浜	ハマナス群落	低木林 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		ハマニク(テンキグサ)群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		ススキ草原	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
86 A	利根別自然体養林	アサダ・シノノキ・ミズナラ林	高木林 夏広 自	個体に食害	少数	ツリバナ	食痕少数	食痕なし	クマイザサ節
B		トドマツ人工林	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	クマイザサ節
87 A	桂沢湖左股沢	トドマツ・針広混交林	高木林 混交 自	個体に食害	少数	トドマツ(角こすり)	食痕多数	食痕少数	クマイザサ節

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
88 A	夕張岳	針広混交林	高木林 混交 自	個体に食害	なし		食痕多数	食痕なし	クマイザサ、チシマザサ
	B	蛇紋岩崩壊地 食:タカネクロスゲ、ユウバリカニツリ、ユキバヒゴタイ	草原 自		なし		概ね食害	本来なし	
89 A	藻岩山	雑草地(スキー場コース内) 不:ワラビ	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
	B	ダケカンバ林	高木林 夏広 自	なし	なし				クマイザサ(一部にチシマザサ)
	C	イタヤシナノキ林	高木林 夏広 自	なし	なし				クマイザサ(一部にチシマザサ)
90 A	野幌森林公園	落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	なし					
91 A	西岡公園	落葉広葉樹林(シラカンバ、ヤチダモなど)	高木林 夏広 自	なし					
92 A	川端	ホオノキ・ミズナラ・エゾイタヤ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	クマイザサ
93 A	支笏湖畔	イタヤシナノキ林	高木林 夏広 自	個体に食害	少数	アオダモ	食痕多数	食痕少数	クマイザサ
		嗜:オヒョウ、アオダモ、ノリウツギ、ヒロハノツリバナ、イテイ 食:ウマノミツバ、ヤマニガナ、クマイザサ、アキカラマツ、ヤマブキショウマ、サウシバ、ウド、ミヤマセンキュウ、ハウチワカエデ、オオカメノキ							
94 A	支笏湖東麓	ミズナラ林(ミズナラ、シラカンバ)	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
	B	嗜:ヤマブキショウマ、キンミズヒキ、ヤブハギ、ミヤマザクラ、ノブキ、オンダ、ハエドクソウ、ツリフネソウ ハルニレ林	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	周辺にはクマイザサ
	C	アカエゾマツ・ミズナラ林 嗜:ノリウツギ(ほとんどに食痕)、カンボク、ウマノミツバ、ハエドクソウ、コシアブラ、ミヤマザクラ、ヤマウルシ	高木林 混交 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	クマイザサ、スズタケ
95 A	安平町東部の丘陵地	ハンノキ林	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
		タチギボウシに顕著な食痕が見られた							
96 A	樽前山	ミヤマハンノキ・ナカマダ群落	低木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
97 A	北大苫小牧演習林	ミズナラ林 不:フッキソウ	低木林 夏広 二	林内構造変化	少数		食痕多数	食痕少数	
98 A	ウトナイ湖	ホザキシモツケ-ヨシ群落	草原 自	なし					
	B	落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	なし					ヨシ、ホザキシモツケなどいろいろな植物が見られ、特に影響を受けているようには思えなかった(シカはいると思う)。(写真)
99 A	鶴岡	海岸草原(オオイタドリ・タチギボウシなど)	草原 自	なし	なし		食痕なし		いろいろな植物が生えていて特に影響を受けているように見えなかった。
100 A	勇払海岸(弁天)	砂丘植生(ハマンニク)	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
101 A	オロフレ峠	ハイマツ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
102 A	ポロト湖	ミズナラ林(ミズナラ)	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	ミヤコザサ
		食:マユミ、ミツバツギ、オオウバユリ							
103 A	室蘭岳(麓別岳)	イタヤシナノキ林(ダケカンバ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
104 A	チキウ岬周辺	海岸草原 嗜:オオヨモギ	草原 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ミヤコザサ
105 A	神威岬	草原(ススキなど)	草原 自	なし					
106 A	長橋苗圃	落葉性広葉樹林	高木林 夏広 自	なし					急斜面にいろいろな花が咲いていたので、シカの影響は無いと思う(写真)。
107 A	手稲金山	ミズナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし?	
108 A	神仙沼	ダケカンバ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
	B	中・高層湿原	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
109 A	二セコ高原お花畑	亜高山帯低木林	低木林 混交 自	なし					
110 A	真狩樹木園	トドマツ・シナノキ・オヒョウ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ節
	B	トドマツ人工林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	クマイザサ節
111 A	羊蹄山自然公園	落葉広葉樹林(ダケカンバなど) 不:ムカゴイラクサ 食:ハイスガヤ	高木林 夏広 自	個体に食害			食痕少数		
112 A	砂坂海岸林								
113 A	乙部町	ブナ	高木林 夏広 自	個体に食害	少数	バッコヤナギ	食痕少数	食痕なし	クマイザサ
114 A	小谷石	ミズナラ	高木林 夏広 二	林床衰退	少数枯死	下記	食害枯死・消失	食害枯死・消失	クマイザサ
	B	スギ人工林	高木林 常針 植	個体に食害	少数	スギ	食痕多数	食害枯死・消失	クマイザサ
115 A	奥内	オオバクロモジ・ミズナラ群集(ミズナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ
116 A	九艘泊	ミズナラ・ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
117 A	宇雲雀平	クロマツ植林(クロマツ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
119 A	大宇鹿架	ミズナラ群落(ミズナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地 名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)					
120 A	梵珠山	ブナ林 (ブナ、ミズナラ、クリ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
				やや二次林的、低木層(H:2m)オオカメノキ、オオバクロモジが多く、よく発達。草本層にはスミレサイシン、チゴユリ、キバナアキギリ、ミヤマカンズゲ、ユキザサなど。ササ:クマイザサ、チシマザサ(過半で優占)					
121 A	ミニ白神	ブナ-ミズナラ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				低木層(H:2m)にオオカメノキ、オオバクロモジ優占。草本層にユキザサ、スミレサイシン、トリアシショウマ、サラシナショウマ、トチバナジン、ミゾソダなどが目につく。					
B		サワグルミ林 (サワグルミ、トチノキ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				広葉草本とシダ優占 (草本層被率約80%)。ウバミソウ、ミヤマイラクサ、サラシナショウマ、ヤマトキホコリ、ヨブスマソウ、スミレサイシン、リョウメンシダ、サカゲイノ子、ミゾソダ、ミヤマベニシダなど。					
122 A	田代平湿原	湿原(スゲ類、ミズゴケ)	草原 自	なし					
123 A	くろくまの滝	サワグルミ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				優占種: サワグルミ、カツラ、トチノキ。広葉草本優占 (ミヤマイラクサ、ウバミソウ、ムカゴイラクサ、ジュウモンジシダ、アカソ、キツリフネ、リョウメンシダ、ミヤマベニシダ、サカゲイノ子、ミヤマシシウド、ジャコウソウなど)。					
124 A	岩木山南麓	コナラ-ミズナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ (少)
				低木層 (H:2m) よく発達し、オオバクロモジ、アブラチャン、ツノハシバミ、マルバハンサウ、ウバミズクラなど。草本層にはマイヅルソウ、オオアキノキリンソウ、ミチノクホシモンジシダ、スミレサイシン、タチシオ子など。					
125 A	紅葉山(板留温泉)	ケヤキ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				優占種: ケヤキ、ブナ、ミズナラ、ホオノキ、ハリギリ。広葉草本優占 (草本層被率約70%)。ソバテ、トチバナジン、アマニ、ミヤマナルコユリ、スミレサイシン、ナガバハエドクソウ、ジャコウソウ、フキ、ヒトリシズカ、ウスゲタマフキ、ミヤマイラクサ、ウバミソウ、ウマノミツバ、ウド、ミゾソダ、カノツメソウ、サラシナショウマ、ホウチャクソウ、ムカゴイラクサなど。食痕はなし。					
126 A	酸ヶ湯	ブナ林 (ほぼ純林)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
				ササ: チシマザサ、チマキザサ (優占)					
127 A	蕨温泉	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ、チシマザサ
				広葉草本にも食痕なし。					
B		サワグルミトチノキ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				林床にオシダ、サカゲイノ子、ムカゴイラクサ、ミヤマイラクサ、エゾアジサイ、アカソ、ウバミソウ、リョウメンシダが優占。食痕なし。					
128 A	高川の西	落葉広葉樹林(ブナ、カエデ類)	高木林 夏広 自						オクヤマザサ
129 A	谷地湿原	湿原(ヨシ、ミズゴケ、モウセンゴケ)	草原 自	なし					
130 A	傘松峠の湿原	湿原(ヨシ、スゲ類)	草原 自	なし					
131 A	八甲田山赤倉山	ハイマツ林	低木林 常針 自	なし					
132 A	十二湖	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
				広葉草本(トリアシショウマ、ウバミソウ、エゾアジサイ、トチバナジン、サラシナショウマ、ユキザサ、オシダ、サカゲイノ子、ミヤマベニシダ)に食痕なし。ササ:チシマザサ(やや優占)、チマキザサ					
B		カツラ林 (カツラ、サワグルミ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				林床シダ優占。リョウメンシダ、サカゲイノ子、ジュウモンジシダ、ミヤマベニシダ、オシダ、ミヤマイラクサ、ウバミソウ、ヤグルマソウなどが多い					
133 A	一ツ森峠	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ(林床に優占)
				1カ所のミネカエデ (H:0.5-1m) に葉身欠失、枝切れあり。他のツタウルシ、オオカメノキ、アケハ、イワガラミ、オオバクロモジ、チゴユリ、マイヅルソウ、ツルアドリオシ、ホソバカンスゲ、シラネウラボシ、ユキザサ、ヒヨウノセンカバタミ、ホソバライシダ、ウスバサイシンなどは、いずれも食痕なし。					
134 A	裏山湖	クリ林 (クリ、ミズナラ、ホオノキ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
				林床は広葉草本優占。トリアシショウマ、キバナイカリソウ、シラネアオイ、スミレサイシン、トチバナジンなど多い。食痕なし。					
B		サワグルミ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				林床はシダ優占(オシダ、リョウメンシダ、サカゲイノ子、ミゾソダ等)。ウバミソウ、ユキザサなどの広葉草本を含めて食痕なし。					
135 A	暗門の滝	ブナ林 (ほぼ純林)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ (少)
				ヤマブキシヨウマ (1カ所) に食痕あり。他は広葉草本 (トチバナジン、ヤマソテツ、ゼンマイ、イヌガシソク、トリアシショウマ、スミレサイシン、チゴユリ、ユキザサ、ミゾソダなど) に食痕なし。					
B		サワグルミ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				広葉草本優占(ウバミソウ、ミヤマイラクサ、ヤグルマソウ、アカソ、リョウメンシダ、サカゲイノ子、フキ、ミヤマシシウドなど)。食痕なし。					
136 A	御鼻部山	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ、チシマザサ
				ササ優占だが、歩道沿いのやや強性地のウバミソウ、ノブキ、フキ、ホソバガンクビソウ?、ミヤマトウバナ、ヤマキツノボクシ、ジャコウソウ、トリアシショウマ、エゾニユウ?、エゾアジサイなどに食痕なし。					
137 A	奥入瀬溪流	サワグルミ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				優占種: サワグルミ、ブナ、カツラ、トチノキ、ドロノキ。数カ所のオニシモツツに食痕。その他、1-2カ所でノブキ、ウバミソウに食痕。カモシカによると判断。しかし、群落全般としては食痕は稀で、大部分の場所では、上記の種や樹木に優占するオシダ、リョウメンシダ、ムカゴイラクサ、ミヤマイラクサ、ツタウルシ、ヤグルマソウ、ジュウモンジシダ、エゾアジサイなどに食痕なし。					
138 A	奥入瀬/屏風岩付近	落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	なし					
				優占種: ブナ、トチノキ、ホオノキ、カエデ類					
139 A	十和田湖子ノ口	落葉広葉樹林(カツラ、ブナ、カエデ類など)	高木林 夏広 自	なし					
140 A	山形町戸呂町	ミズナラ群落 (ミズナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
141 A	山形町常畑	サウシバ-ミズナラ群集 (ミズナラ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
142 A	遠島山	ブナ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
143 A	茂井(安家川流域)	サウシバ-ブナ-コナラ群集	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
144 A	藤七温泉	オオシラビソク群集 (オオシラビソク、コメツガ)	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
145 A	門	ミズナラ群落 (ミズナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
146 A	松川自然休養林	トチノキ-ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
				優占種: ブナ、ミズナラ、トチノキ、アカイタヤ					
147 A	黒森山	ミズナラ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕少数	スズタケ、クマイザサ
148 A	秋田駒ヶ岳南麓	ブナ林 (純林)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ(林床に優占)
149 A	鼠入	ブナ群落 (ブナ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
150 A	源兵衛平	ミズナラ群落	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕少数	クマイザサまたはスズタケ

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地 名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全層への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)					
151 A	松茸沢	ミスナラ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕少数	食痕なし	チシマザサ
	B	カラマツ	高木林 混交 二	なし	なし		食痕少数	食痕なし	チシマザサ
152 A	刈壁	カラマツ植林 (カラマツ)	高木林 夏針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
153 A	花原市	スギ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ミヤコザサ
154 A	千徳	スギ植林 (スギ幼木)	低木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
155 A	岳川支流	ブナ 嗜: エゾアジサイ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕多数	食痕なし	クマイザサ
156 A	大塚部山	カラマツ・ミスナラ	高木林 混交 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	チシマザサ
157 A	田瀬	スギ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
158 A	権現山	スギ植林 嗜: ムラサキシキブ、オオバクロモジ	高木林 常針 植	林床衰退			食害枯死・消失	食痕多数	クマイザサ
159 A	土瀬町	カラマツ植林 (カラマツ)	低木林 夏針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
161 A	洞泉	カラマツ植林 嗜: モミジイチゴ、コゴメウツギ、ヤマブキ	高木林 夏針 植	林床衰退	多数	カラマツ	概ね食害	食痕少数	ミヤコザサ
162 A	外山	スギ植林 嗜: ミヤマイラクサ、ムラサキシキブ	高木林 常針 植	林床裸地	なし		食痕少数	食痕なし	スズタケ
163 A	甲子町	カラマツ植林 (カラマツ)	高木林 夏針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ミヤコザサ
164 A	上有住樹山・五葉山	ブナ 不: ヤマタイミンガサ、イケマ	高木林 夏広 自	林床衰退	なし		食害枯死・消失	食害枯死・消失	ミヤコザサ
	B	ヒノキアスナロ	高木林 常針 植	林床衰退	なし		食害枯死・消失	食害枯死・消失	ミヤコザサ
165 A	胆沢区若柳	ヒメアオキ・ブナ群集 (ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
166 A	防沢	ブナ・チシマザサ群集	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	チマキザサ
167 A	市野々	オノエヤナギ群落	低木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
	B	ハンノキ群落	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
	C	スギ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
169 A	吉浜川	オノオレカンバ群落 (オノオレカンバ) 不: ヤマツツジ、ナツハゼ	高木林 夏広 自	林床衰退	なし		概ね食害	食痕なし	ミヤコザサ
170 A	鍛台山	アカマツ群落 (アカマツ) 不: ヤマツツジ	高木林 常針 二	林床衰退	なし		概ね食害	本来なし	
172 A	君が鼻山	スギ植林 嗜: イヌシデ	高木林 常針 植	個体に食害	少数	スギ	食痕少数	食痕なし	ミヤコザサ
174 A	栗駒山	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ、クマイザサ
183 A	蕪栗沼	ヨシ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
184 A	河北皿貝	コナラ 嗜: コゴメウツギ、ミツバウツギ	高木林 夏広 二	なし	なし	なし	食痕少数	食痕なし	アズマネザサ、スズタケ
185 A	大倉山	サワグルミ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
186 A	長窪	クヌギ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ
187 A	龍峰山	アカマツ群落 (アカマツ)	高木林 常針 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ミヤコザサ
188 A	トヤケ森山	ススキ群落 (ススキ)	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
189 A	針浜	コナラ 不: メギ、マムシグサ、サンショウ	高木林 夏広 二	林床衰退	なし	なし	食痕多数	食痕多数	アズマネザサ、スズタケ
	B	コナラ 嗜: スズタケ	高木林 夏広 自	薪炭林でクヌギ植栽? 林床の植生がない場所がある。	少数	ミズキ	食痕少数	食痕多数	スズタケ
	C	スギ 不: フタリスズカ、マムシグサ	高木林 常針 植	個体に食害	少数	スギ	食痕少数	食痕多数	スズタケ、アズマネザサ
190 A	雄勝町水浜	コナラ	高木林 夏広 自	なし	なし	なし	食痕なし	本来なし	
	B	スギ 不: タマブキ、ウワバミソウ、ジュウモンジシダ、ツヤナシノデ	高木林 常針 植	個体に食害	少数	スギ	食痕多数	本来なし	
191 A	京ヶ森	スギ・ヒノキ植林 (ヒノキ)	高木林 常針 植	足跡、糞、シカ道あり。	なし		食痕少数	食痕なし	アズマネザサ
192 A	雄鹿半島	ススキ・シバ群落 不: ベニバナポロギク、イワヒメワラビ、キンカアザミ、マムシグサ。嗜: シバ	草原 二	林床衰退	少数	ミズキ、ヒメコウゾ	食害枯死・消失	本来なし	
	B	クリ	高木林 夏広 二	林内構造変化	少数	ミズキ		本来なし	
	C	スギ 不: ヒトリシズカ、フタリスズカ、ホソバシケシダ、ナツトウダイ	高木林 常針 植	林床衰退	少数	ミズキ、アワブキ、スギ	食痕少数	食害枯死・消失	スズタケ
193 A	牧ノ嶋	コナラ 不: キンカアザミ、マルバダケブキ、センソウモドキ	高木林 夏針 自	林内構造変化	多数	タブノキ、モミ	概ね食害	食痕多数	アズマネザサ
194 A	清崎	アカマツ林 不: アザミ類、ベニバナポロギク	高木林 常針 二	林床衰退	少数		概ね食害	食痕少数	ミヤコザサ

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類	
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)						
195 A	金華山	ブナ林 不ウラジロハナヒリノキ、キンカアザミ、ミミガタテンナンショウ、レモンエコマ、イヌトウバナ、フタリスズカ	高木林 夏広 自	林内構造変化	なし		概ね食害	本来なし		
196 A	青葉山(佐保山)	モミイヌブナ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	スズタケ	
197 A	支倉	クリ-コナラ群集 (コナラ)	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	本来なし		
201 A	玉川温泉	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ	
202 A	大場谷地	ヌマガヤ群集、ミズバショウ-オオカササゲ群集	草原 自	なし			食痕なし	食痕なし	チシマザサ(湿原周辺)	
206 A	乳頭温泉郷	ブナ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記	
210 A	田沢湖	コナラ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ(少)	
214 A	抱返り溪谷	アカシデ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ(少)	
B		サワグルミ林	高木林 夏広 自	優占種：アカシデ、コナラ、クリ、ミズナラ				食痕なし	本来なし	
215 A	乙越沼・泉沢溜池	ヨシ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし		
B		夏緑性河辺林	低木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし		
216 A	親川	イノテタブノキ群集 (タブノキ)	低木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ	
217 A	大内三川	ミズナラ群集 (ミズナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ	
218 A	中俣	スギ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ	
219 A	真昼岳	ブナ林 (純林)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ(少)	
220 A	雄物川河岸	ヨシ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし		
B		ニセアカシア-ヤナギ林 (河辺林)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし		
221 A	黒森山	ブナ林 (純林)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ(やや優占)	
222 A	金峰山	ブナ林 (山頂近くでは純林)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし		
224 A	構台	ブナ	高木林 夏広 自	優占種：ブナ、ミズナラ、アカイタヤ、クリ。林床にユキツバキ優占。				食痕なし	食痕なし	チシマザサ
B		ミズナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ	
C		スギ植林	高木林 夏広 植	なし	なし		食痕なし	本来なし		
226 A	栗駒山北面	オオシラビソ群集	低木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ	
B		チシマザサ-ブナ群集	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ	
227 A	女鹿	タブノキ林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし		
230 A	野沢	スギ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし		
231 A	鳥海山	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ	
B		スギ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ	
235 A	五台沼	スギ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ	
236 A	大長峯	アカマツ群集 (アカマツ)	高木林 常針 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ	
241 A	高館山	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし		
B		コナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし		
247 A	肝煎	スギ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし		
251 A	湯温海	スギ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし		
259 A	鍋倉	スギ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ	
260 A	山形大上名川演習林	ブナ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし		
B		ミズナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし		
265 A	大鳥	ヒメアオキ-ブナ群集 (ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ	
271 A	針生平	マルバマンサク-ブナ群集 (ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ	
272 A	祝瓶山	マルバマンサク-ブナ群集 (ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ、チシマザサ	
273 A	小枕山	ヒメアオキ-ブナ群集 (ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ、チシマザサ	

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全個への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
274 A	金目川	マルバマンサク-ブナ群集(ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ、チシマザサ
275 A	朴ノ木峠	ブナ-チシマザサ群集	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
276 A	大字市野沢	コナラ群落(コナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
277 A	温身平	ブナ-チシマザサ群集	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
278 A	大字子玉川	ブナ群落(ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
279 A	白布温泉	オオバクロモジ-ミズナラ群集(ミズナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ、チシマザサ
280 A	西善妻山	オオシラビソ群集(オオシラビソ)	低木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
281 A	手倉山	コナラ・ミズナラ林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ、アズマザサ
B		アカマツ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ
282 A	松川浦大洲	クロマツ植林	低木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
B		チガヤ群落	草原 自	ササ:ミヤギザサ、アズマザサ、アズマネザサ、ヤダケ			食痕なし	本来なし	
283 A	デコ平	カラマツ	高木林 夏針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	チシマザサ
B		ブナ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	チシマザサ
284 A	裏磐梯/五色沼	アカマツ植林(ミズナラなどが混交)	高木林 混交 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	チシマザサ
285 A	裏磐梯/五色沼	アカマツ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	チシマザサ
286 A	安達太良山	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ
B		ダケカンバ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ
C		ハイマツ林	低木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
287 A	安達太良山東山麓	アカマツ-コナラ林	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		カラマツ植林	高木林 夏針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ、アズマネザサ
288 A	熱海町	コナラ群落(コナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ
289 A	浜尾遊水地	オギ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		セイタカアワダチソウ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		ヨシ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
292 A	南湖	アカマツ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマザサ、アズマネザサ
293 A	会津駒ヶ岳	アオモリトドマツ林 不・オオカメノキ	高木林 常針 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	
B		ブナ林 不・オオカメノキ	高木林 夏広 自	個体に食害					
294 A	尾瀬/燧裏林道	ブナ-ミズナラ 嗜・ヤマブキショウマ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	チシマザサ
295 A	高葉ダム	スギ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
296 A	勿来海岸	海浜砂浜群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
297 A	鮫川河口	アツバキミガヨロン群落	低木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
298 A	八満山	ミズナラ-ブナ林(ミズナラ)	高木林 夏広 自	なし	なし				ミヤコザサ
B		イヌブナ-ブナ林(イヌブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ミヤコザサ?
299 A	八満山	針葉樹植林(スギ、ヒノキ)	高木林 常針 植	なし					
B		落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	低木の刈り払いが行われている以外は、植生に変化は認められなかった。					
301 A	月居山	落葉性広葉樹林	高木林 夏広 自	優占種:ブナ、ミズナラ、カエデ類、シデ類ほか、構成種の変化、低木の樹形の変化などは認められず、いろいろな種類が生えていた。					
302 A	長福山	落葉広葉樹林(モミジ類)	高木林 夏広 自	カタクリ、ツツジ類など、様々な植物が見られるので影響はないと思う。					
303 A	興久慈男体山	落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	いろいろな植物が見られたので、影響はないように見えた。					
305 A	御前山	植林(スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし		
B		ケヤキ林(ケヤキ)	高木林 夏広 植	なし	なし		食痕なし		
306 A	仏頂山	コナラ-アカシデ林	高木林 夏広 自	種組成や低木の樹形の異常など、特に気づかなかった。					
307 A	佐白山	シラカシ林(シラカシ、スダジイ、スギ)	高木林 常広 自	林床は普通にやぶだったので、シカの影響は無いと思う。					
				優占種:コナラ、アカシデ、エンコウカエデ、モミ、スダジイ					
				なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ、ヤダケ

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地 名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)					
308 A	加波山	ブナ-アカガシ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	スズタケ、ミヤマクマザサ?
309 A	上釜	クロマツ植林	高木林 常針 植	なし	なし			本来なし	
310 A	筑波山	ブナ林 (ブナ、アカシデ、ミズナラ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
312 A	茶臼岳	火山荒原	草原 混交 自	なし					
313 A	富士山	ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕多数	食痕少数	
314 A	富士山	不:キオン 嗜:ツリバナ ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	
315 A	奥鬼怒自然歩道	オオバヤナギ林	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕多数	食痕なし	クマイザサ
B		不:キオン、フタリシズカ 嗜:ムカゴイラクサ、ウバミソウ ブナ-ウラジロモミ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
C		クロベ-ブナ-アスナロ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	スズタケ
316 A	土呂部	ススキ草原	草原 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	
B		嗜:ツリガネニンジン ハルニレ林	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	
317 A	土呂部	ススキ草原(ススキ、ワラビ)	草原 二	林内構造変化					
B		不:ワラビ ミズバショウ群生地(スゲ類、落葉広葉樹)	湿原 夏広 自	なし				本来なし	
C		落葉広葉樹林(ミズナラなど)	高木林 夏広 二	林床衰退					
318 A	川俣湖	トチノキ林	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	スズタケ、ミヤマクマザサ
319 A	龍王峽	ミズナラ林 (ミズナラ)	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	
320 A	奥日光ノ湯ノ湖	不:マツカゼソウ、嗜:クサコアカソ、ミヤマイラクサ、テンニンソウ コメツガ林 (コメツガ、クロベ)	高木林 自	林床衰退	なし	なし	根害食害	食害枯死・消失	スズタケ、ミヤコザサ(?)
B		不:シロヨメナ、嗜:スズタケ、ミヤコザサ(?) ハルニレ林 (ハルニレ)	高木林 夏広 自	個体に食害	なし	なし	食痕少数	食痕少数	ミヤコザサ?
321 A	切込湖・刈込湖	ササ群落 (ミヤコザサ)	草原 自	林内構造変化					ミヤコザサ
B		嗜:ミヤコザサ 針葉樹林 (カラマツ、アスナロなど)	高木林 常針 自	林内構造変化					
322 A	刈込湖	ヤナギ林(オノエヤナギ)	高木林 夏広 自	林内構造変化			食害枯死・消失		ミヤコザサ
323 A	戦場ヶ原東部	混交林(ミズナラ、カラマツ)	高木林 混交 自	林内構造変化					
324 A	小田代ヶ原	ハルニレ	高木林 夏広 自	林床衰退	多数、少数枯死	ハルニレ	根害食害	本来なし	
B		不:シロヨメナ、キオン、ハルカラマツ、イケマ ミズナラ-ミヤコザサ群落	高木林 夏広 二	林床衰退	少数、少数枯死	下記	根害食害	食痕多数	ミヤコザサ
325 A	戦場ヶ原	ハルニレ-サワギク群落	高木林 夏広 自	林内構造変化	多数、少数枯死	下記	根害食害	食痕少数	クマイザサ
B		不:シロヨメナ、ハルカラマツ、サワギク ズミ群落	低木林 夏広 自	林内構造変化	多数、多数枯死	ハルニレ、カラマツ	根害食害	食痕少数	ミヤコザサ
326 A	東照宮周辺	トチノキ、アワブキ	高木林 夏広 自	林内構造変化	なし		食痕多数	食痕少数	
327 A	男体山	落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	林内構造変化					
328 A	千手ヶ原	ハルニレ-サワギク群落	高木林 夏広 自	林床衰退	多数、少数枯死	下記	根害食害	食害枯死・消失	クマイザサ
B		不:シロヨメナ、マルバダケブキ、イケマ、フックソウ、ハルカラマツ、カリガネソウ、マムシグサ カラマツ人工林	高木林 夏針 植	林床植地	少数	カラマツ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	クマイザサ、ミヤコザサ
329 A	中宮祠	ミズナラ-ミヤコザサ群落	高木林 夏広 自	林床衰退	多数		根害食害	食害枯死・消失	ミヤコザサ
330 A	鳴虫山	針葉樹林 (スギ、ヒノキ)	高木林 常針 植	林床衰退			食害枯死・消失		
B		落葉広葉樹林 (下層はツツジ類)	高木林 夏広 自	林床植生がとも貧弱だった。			食害枯死・消失		
331 A	日光植物園	落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	個体に食害					
332 A	三ノ宿山	不?:キレンゲショウマ、オオマルバノホロシ サワグルミ、オヒョウ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	
B		不:オオバヤナギ、ヤブムラサキ?、アワブキ?、タマアジサイ?、テンナンショウ sp.、嗜:クサコアカソ、モミジグサ、クロモジ、ウバミソウ、ハクモウイデ オオバヤナギ・フサザクラ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数		
333 A	馬頭	スギ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		コナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(復占種)	植生タイプ	群落全層への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食害・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
334 A	庚申7滝	サワグルミ 不:タマアジサイ、オシダ?、オオバアサガラ、嗜:ヤマアジサイ、ウスグタマキ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
				約3-5m大の岩が転がり、土壌がたまって平坦な面ができていような谷底面で、ヤマアジサイのハッチが食べつくされてる中でタマアジサイのハッチは食べられておらず、オシダも蘆生の形がきれいのまままで食痕もなかった。					
334 B		ケヤキ・ミズキ 不:コチデミザサ?、タニタデ? 嗜:ヤマアジサイ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
				地形は表層基質が動きやすい傾斜の崖壁、アカシデやクマシデなど斜面縁の植生で、林床に近い範囲はもともと植被率が低いような場所だったが、けもの道ができていた。コチデミザサとタニタデはその道のそばで群生していたが食痕は見つけられなかった。ヤマアジサイはいずれも樹高が低くなっていた。					
335 A	古賀志山	コナラ林(コナラ)	高木林 夏広 自	なし	なし	なし	食痕なし	本来なし	
	B	コナラ-アブラツツジ林(アブラツツジ)	低木林 夏広 自	なし	なし	なし	食痕なし	本来なし	
336 A	不動岳周辺	スギ・ヒノキ植林 不:オオバノイノモトソウ	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	
337 A	大島屋山	コナラ-モンゴリナラ林 不:フタリスズカ	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	リュウブ	食痕少数	本来なし	
338 A	高館山	スタジイ林(スタジイ)	高木林 常広 自	なし	なし	なし	食痕なし	本来なし	なし
	B	コナラ林(コナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし	なし	食痕なし	食痕なし	アズマネザサ等
	C	アカシデ-イヌタデ林(アカシデ)	高木林 夏広 自	なし	なし	なし	食痕なし	食痕なし	アズマネザサ等
341 A	太平山	ヒノキ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
	B	シラカシ林	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
342 A	巖石山・太平山	落葉広葉樹林	高木林 夏広 二	なし					
				人手が入っていないところは、イチリンソウ、ミスミソウ、マルバコンロンソウ、スミレ類などが見られ、シカの影響がない場所に見えた。					
343 A	小松温泉	ヌマガヤイボミズゴケ群集、ミスギク-ミヤマシノ 嗜:ミツガシラ、クロバナノウグ、ミズハシヨウ	草原 自	林床裸地	少数、少数枯死	シラビソ、オオシラビソ			
				とにかくひどい、訪れる人も少ないため、壊滅的な打撃を受けている。3km程度南方に鬼怒川温泉があるが、その被害は、鬼怒川と比較にならない。登山客の数の違いによる被害の差が出ていいると思われる。ウラジロコバヤイなどの毒草を食ひ満ちなく食べられている。ミツガシラ、クロバナノウグ、ミズハシヨウは特に嗜好性が高い。ムジナグサは復占する面積が広いので、不嗜好種と考えられる。					
344 A	白毛門	落葉広葉樹林(ブナ、ミズナラ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし		
	B	落葉広葉樹低木林(ブナ、ミズナラ、リュウブ)	低木林 夏広 自	構成種の偏り、変形した低木などはなかった。斜面が急すぎてシカはいやなのか？					
				なし	なし		食痕なし		
				構成種の偏り、変形した低木などはなかった。斜面が急すぎてシカはいやなのか？					
345 A	谷川岳	高原草原	草原 自	なし					チマキザサ
				いろいろな植物が見られるので、シカの影響はないように思った。					
346 A	茂倉沢	サワグルミ-ジュウモンジシダ群集 嗜:アカソ、シラネセンキュウ、オクノカンスゲ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	チマキザサ
				赤谷プロジェクトにより周辺の1kmメッシュ50ヶ所に設置された自動撮影カメラのうち、数ヶ所でシカが撮影されたとのこと。					
347 A	玉原高原	ブナ-チマキザサ群集	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
348 A	丸沼高原スキー場周辺	サワグルミ林 不:キオン、ミヤマライカサ、サワギク、テンナンショウsp	高木林 夏広 自	林内構造変化	少数	オヒョウ、ミヤマアオダモ	食痕多数	食痕少数	クマイザサ
				低木に枝折					
349 A	津沢	クリ-ミズナラ群集 嗜:アイズヒメアザミ、ヤマツツジ、ガマズミ属	高木林 夏広 二	林床裸地	なし		食害枯死・消失	本来なし	
				1995年に数10株生育していたアイズヒメアザミ(環境省御種)は茎先が食害された1株のみで減少。ヤマツツジはほとんどの枝が食害を受けている。シカの背丈までの植物は壊滅的だが、高木層・亜高木層への被害は今のところ少ない。					
	B	スギ植林地 不:キオン 嗜:ナブアザミ	高木林 常針 植	林内構造変化			根害食害	本来なし	
350 A	法師温泉	サワグルミ-ジュウモンジシダ群集 食:オクノカンスゲ、ウバハシヨウ、シラネセンキュウ、ミソソバ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
351 A	本白根山	オオシラビソ-ダケカンバ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
352 A	万座温泉	シラビソ林 嗜:イタドリ	高木林 常針 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	チマキザサ
353 A	草津白根山	高山草原(コマクサ)	草原 自	なし					
	B	亜高山帯針葉樹林(シラビソなど)	高木林 常針 自	コマクサなどのさまざまな高山植物が無事に咲いていた。					
				なし					チマキザサ
				いろいろな高山植物が見られたので、シカの影響はないように思った。					
354 A	袈裟丸山西面	ススキ群落など 不:ハルカラマツ、シロヨメナ、イケマ、シロバナノヘビイチゴ	草原 二	林内構造変化			根害食害		
	B	カラマツ林	高木林 夏広 針 植	林内構造変化	少数		根害食害	食痕多数	スズタケ、ミヤコザサ節
	C	シロヨメナ、ウリハダカエデ、オオバアサガラ ミズナラ林 不:シロヨメナ、嗜:コマツツジ、ベニバナツクバネウツギ、リュウブ	高木林 夏広 二	林床衰退	多数、少数枯死	リュウブ、ウラジロモミ	根害食害	食害枯死・消失	下記
				ササ:スズタケ(被害甚大)、チマキザサ節(被害軽微)					
355 A	袈裟丸山	マイヅルソウ-コマツツジ群集 不:ヒメスゲ	高木林 常針 自	林内構造変化	少数		根害食害		ミヤコザサ
	B	ミヤコザサ-ミズナラ群集 不:シロヨメナ、ヒメスゲ、ヤマカモジグサ	高木林 夏広 二	林床裸地	少数	下記	食痕多数	食害枯死・消失	スズタケ
	C	ミヤマクマワラビ-シオジ群集(サワグルミ林) 不:シロヨメナ、ミヤマムグラ(よく分からないが個体数が多かった)	高木林 夏広 自	林床裸地	少数、少数枯死	サワグルミ	食害枯死・消失	本来なし	
				昨年調査した隣接する袈裟丸山西面でも被害は同様で、一部に残されているシオジ林(おそらく分布北限地域)の林床も埋地化し、浸食を受けやすいあるいは抜け始めている。漢字林ではサワグルミが集中的な樹皮剥ぎ被害を受けている。サワグルミの樹皮剥ぎは、本地域の北方に隣接する片品川流域地域でも確認している。					
356 A	袈裟丸山	サワグルミ-シオジ林 食:カノツメソウ、クワガタソウ	高木林 夏広 自	林内構造変化	なし		食痕多数	本来なし	
357 A	赤城山	ミズナラ林 不:ヤマドリカブト、嗜:ヤグルマソウ	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	リュウブ	食痕少数	食痕少数	ミヤコザサ
358 A	赤城山/覚満湖温泉(サラサドワン)		低木林 夏広 自	個体に食害	多数	サラサドワン、リュウブ	食痕少数	食痕なし	ミヤコザサ
	B	ヌマガヤ-ススキ(ススキ)	草原 夏広 自	個体に食害					ミヤコザサ
				植生保護のための柵を設置している(シカ食害調査)。					
359 A	農工大FM草木	シオジ・サワグルミ・トチノキ・カツラ・イタヤカシ 不:クサツツジ?(大群落ができていた)、嗜:ツツジシノブ、ミヤマクマワラビ、イッポンクサ、ヒメツツジ、コンロンソウ、ヤマアザミ、アカシヨウ、ミヤマハコバ、モミジガサ、オウモミジハグマ、コガネコノメソウ、ニッコウネコメソウ、ハナネコメソウ、ツルネコメソウ、イワネコメソウ	高木林 夏広 自	林床衰退	なし		食痕多数	食痕多数	ミヤコザサ
				低木層、高木層が少なくない。					

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
B		ミズナラ・クリ・イヌブナ 嗜: クロヒナズメ、フクオウソウ	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	リュウブ	食痕多数	食痕多数	ミヤコザサ
				ミヤコザサの去年の裏は防鹿柵内の方が多く確認できる。防鹿柵内の去年の植生調査でサラシナショウマの開花個体はFM標本での初めての確認だった。去年はアシボソの群落ができていた。今年はこれからだろうか。					
361 A	樺名山	ススキ 嗜: ユウスゲ、ノハナショウブ	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		ミズナラ 嗜: ヤマブキショウマ、ハルナユキザサ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
362 A	樺名山	ミズナラ林	高木林 夏広 二	なし					
B		ススキ草原	草原 二	なし					
C		湿生草原(エソヌカホ優占群落)	草原 自	なし					
				イノシシにより地面が掘り返されている。					
363 A	赤城山南麓	アカマツ林	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	アズマネザサ
				林床雑樹への食痕があるが、年1回下草刈りを実施しているため人為的なものとの見分けが困難。					
B		コナラ・クロヒナズメ林	高木林 夏広 二	個体に食害			食痕少数	食痕少数	アズマネザサ、ミヤコザサ
				林床雑樹への食痕があるが、年1回下草刈りを実施しているため人為的なものとの見分けが困難。					
C		ヒノキ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				ヒノキ林床は下草刈りと光量不足によって本来裸地化しており、シカ影響との区別が困難。ただし、シカ道は林内に多数ある。					
364 A	鳴神山	常緑針葉樹林(スギ)	高木林 常針 植	なし					
				スミレなどの植物がみられたので、影響はないように見えた。					
B		落葉広葉樹林(アカヤシオなどツツジ類)	低木林 夏広 自	なし					
				アカヤシオが咲き乱れ、樹形にも異常がなかったので影響はないように見えた。					
365 A	西ノ入	スギ植林 嗜: アオキ、タマアジサイ	高木林 常針 植	林床衰退	なし		食痕多数	食痕なし	
B		園路沿い 嗜: ツリフネソウ、コアカソ	草原 自	なし	なし		食痕多数		
C		湿地(水田放棄したものを管理) 嗜: マコモ、アサザ、ヒシ	植	個体に食害	なし		食痕少数		
				園内の池のヒシも食害されている。					
366 A	みかほスーパー林道	シオジ林 不: ヒイラギソウ	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	
B		ヒノキ植林地 不: クサタチバナ、イケマ、コフウロ	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		根ね食害		
				土壌跡で食害が顕著。クサタチバナやイケマが目立ち、本来何が多かったかわからない状況。					
367 A	神流川本谷	カラマツ植林地 不: アンソソ、オオバアサガラ、レモンエゴマ、コバノイラクサ、ホソエカエデ	高木林 夏針 植	林床裸地	なし		食害枯死・消失	食痕多数	スズタケ
				嗜好性が高い種については、林床植生が崩壊しているため推定できない。					
B		ツツジ林 嗜: マルバササキライ、ツリバナ	高木林 常針 自	個体に食害			食痕多数	本来なし	
				石灰岩絶壁に続く急斜面のため、シカの侵入は少ないとみられる。しかし、嗜好性植物は食害を受けている。					
368 A	宝登山	落葉広葉樹林	高木林 夏広 二	なし					
				草本層にいろいろ生えていたので影響はないと思う。					
369 A	両神山	混交林	高木林 混交 自植	個体に食害			食痕少数		
				優占種: スギ、ヒノキ、カエデ類、トチノキなど					
370 A	養山	コナラ林(コナラ、クヌギ)	高木林 夏広 二	なし	なし				
				林床植生は普通にやぶだったので、シカの影響は無いように見えた。					
B		公園(サクラ、シバ、ヤマツツジ)	高木林 夏広 植	個体に食害	なし		食痕多数		
				公園の芝生、ヤマツツジの樹形が剪定されたにしては不自然に小さくなっていて、シカによる食害と判断した。動物の足跡もシカかどうか確認できなかった。あまり自信はない。					
371 A	東大秩父演習林	スギ植林 不: ハシロドコロ、フタリシズカ	高木林 常針 植	林床裸地	少数、少数枯死	スギ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	クマザサ
B		イヌブナ林 不: ハシロドコロ	高木林 夏広 自	林床裸地	多数、少数枯死	下記	食害枯死・消失	食害枯死・消失	クマザサ
C		コメツガ林	高木林 常針 自	林内構造変化	少数	コメツガ	食痕多数	食痕多数	クマザサ
				リュウブ、アワブキ、ハクウンボク					
372 A	秩父御岳山	落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	なし					
				いろいろな植物が見られたので、影響はないように見えた。					
373 A	三峰神社	混交林 不: オオハノミノトソウ(写真)、マムシグサ、タマアジサイ、シロヨメナ、ガクツツギ、フタリシズカ	高木林 混交 自植	林床衰退	少数	下記	食痕多数	食害枯死・消失	
				優占種: スギ、ヒノキ(植林と参道沿いの木)、トチノキなどの自然林。樹皮剥ぎ: リュウブ、ナツツバキ(写真)					
374 A	刈場坂時・旧正丸峠	落葉広葉樹林(ミズナラ、リュウブ)	高木林 夏広 自	個体に食害	多数	下記	食痕少数	食痕少数	
				樹皮剥ぎ: リュウブ、アカマツ(角とぎ)、サクラ? 一部地域の皮剥ぎがとも目立っていた。					
B		針葉樹植林(スギ、ヒノキ) 不: アセビ、イノモトソウ(著しく目立っているわけではない)	高木林 常針 植	樹皮剥ぎ: ヒノキ(数本)、スギ(1本)			食痕少数	食痕少数	
				リュウブの皮剥ぎが見られる林と隣接した林で確認される傾向があった。					
375 A	黒山三滝	人工林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	スズタケ
				通った道に民家がらほらあり、野生動物の糞や足跡の痕跡、鳴き声もあまり認められなかった。人による刈り取りと考えられる場所はあった。					
B		クヌギなどのマント群落	低木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				くもの巣の罅が続き、シカも使ったさそうな幅の狭い、日射が厳しい道だった。舗装された車道から入った。ササは見えない。					
376 A	黒山三滝	針葉樹植林(スギ、ヒノキ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕少数		
				林床植生が豊富な地域なので、影響は無いといっても良いと思う。					
377 A	笠取山・狩野峠	ミヤコザサ・シモツクシ群集 不: マルバダケブキ 嗜: ヒメスゲ、ノアザミ、オオバギボウシ	草原 自	個体に食害			食痕多数	食痕少数	ミヤマクマザサ
378 A	秩父有間山	ヤマタイミンガサ・サワグルミ群集 不: ハシロドコロ、オオバアサガラ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
B		クリ・コナラ群集	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	スズタケ
				カタクリが多数みられるなど、林床植生への影響は少ないよう。					
C		スギ・ヒノキ林	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
				一部に影響があるものの、ほとんど無いに等しい。					
379 A	多摩主山	コナラ林(純林)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				低木層(マルバウツギ、ヤブムラサキ、ヒサカキ、クロモジ、ヤマツツジなど)よく発達し、食痕は認められない。					
380 A	回発戸	シラカシ群集	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ
B		水田雑草群落		なし	なし		食痕なし	本来なし	
382 A	印旛沼	コナラ林とスギ植林のモザイク	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
383 A	房総のむら	アカマツコナラ林	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ
385 A	日向	スギ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
387 A	平山町	イヌシデコナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
388 A	権現の森	タブノキムクノキ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ(少)
390 A	笠森観音	スダジイ林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
393 A	梅ヶ瀬溪谷	溪谷林	高木林 夏広 自	優占種: スダジイ, スギ大木(植栽) 混在 個体に食害					
394 A	高岩沢	スギ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
395 A	高岩沢	スギ林	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
396 A	東大千葉演習林	スダジイ林 不: アリドオシ、イブセンリョウ	高木林 常広 自	林床衰退	なし		食害枯死・消失	本来なし	
B		スギ林 不: イブセンリョウ、ホソバカナワラビ、アセビ	高木林 常針 植	林床衰退	なし		概ね食害	本来なし	
397 A	三石山	植林地(スギ) 不: オオバノイノモトソウ	高木林 常針 植						
398 A	豊美島	コナラ混交林 不: シロダモ、アセビ、ウグイスカグラなど。嗜: アオキ、スダジイ、ヤマブキ、萌など	高木林 混交 二	個体に食害	少数	モミ、ネズ	食痕多数	食痕多数	スズタケ
399 A	石草山	コナラ林 不: シロダモ、イブセンリョウ、マンリョウ、オオバノイノモトソウ、オニシバ	高木林 夏広 二	林床衰退	なし		概ね食害	本来なし	
B		スギ・ヒノキ林	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		概ね食害	本来なし	
C		スダジイ林	高木林 常広 二	林内構造変化	少数	ウラジロガシ(古い食痕)	食痕多数	本来なし	
400 A	荒木根山	スギ・ヒノキ林 嗜: アオキ(高さ1m以下の個体に食痕多い)、ガマズミ、キヨスミイボタ	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	メダケ(少)
401 A	吉浜川周辺	タブノキイノデ群集(タブノキ、エノキ) 不: リョウメンシダ、アリドオシ 嗜: アオキ、アスカイノデ	高木林 混交 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	アズマネザサ
403 A	大山不動尊	スダジイ林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
404 A	伊予ヶ岳	落葉広葉樹林(ヤマハゼなど)	低木林 夏広 自	なし	なし				
405 A	富山南西斜面	スダジイ-ホソバカナワラビ群集	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
406 A	金山ダム	アラカシ-ウラジロガシ林 不: イブセンリョウ	高木林 常広 二	林床衰退	なし		食痕少数	本来なし	
407 A	内浦山農民の森	ウラジロガシ林 不: ホソバカナワラビ、コバノカナワラビ、イブセンリョウ、マツカゼソウ、シタキソウ、オオバノイノモトソウ、エゴマ	高木林 常広 二	林床衰退	なし		食痕多数	本来なし	
B		スダジイ林 不: アリドオシ、タイムタチバナ、アセビ、イヌガシ、コング、イブセンリョウ、コバノカナワラビ、シキミ	高木林 常広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
408 A	那古	スダジイ-ホソバカナワラビ群集	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
409 A	石堂寺	スダジイ林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
410 A	館山野島の森	マテバシイ林	高木林 常広 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
411 A	高塚山	スダジイ-アカガシ林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
412 A	小松寺	モミ優占林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	アズマネザサ
B		スダジイ優占林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	アズマネザサ
414 A	雲取山	シラビソ-オオシラビソ群集 不: バイケソウ	高木林 常針 自	林床衰退	少数枯死	シラビソ	食害枯死・消失	食痕多数	ミヤマクマザサ
B		ミヤマクマザサ-シモツケ群集 不: マルバダケブキ	草原 二	林床衰退			概ね食害	食痕多数	ミヤマクマザサ
415 A	川乗谷	イヌブナ林	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	リョウブ(古い)	食痕少数	本来なし	
B		サワグルミ林 嗜: クサコアカソ	高木林 夏広 二	林内構造変化	なし		食痕多数	本来なし	
C		スギ林 不: オオバノイノモトソウ 嗜: クサコアカソ、ヤマツツジ、ヤマアジサイ	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		食痕多数	本来なし	
416 A	成木川	ミズナラ-コナラ群集	高木林 夏広 二	林内構造変化	少数	リョウブ	食痕多数	本来なし	
B		スギ林 不: ハリガネワラビ、イワヒメワラビ(林縁の一部に優占) 嗜: ニガイチゴ、リョウブ、モミジイタゴ、マルバツツギ、ムラサキシキブ、セキヤクアキチヨウシ、ヤマアジサイ、ユズメウツギ、クサコアカソ(いずれも林縁)	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	
417 A	鷹ノ巣山	ススキ-ヤマトノオ群集 不: マルバダケブキ、ワラビ、イケマ 嗜: オオバギボウシ	草原 自	林床衰退			食痕多数	食害枯死・消失	スズタケ
418 A	東農大奥多摩演習林	スギ植林 不: オオバアサガラ、ホソバナンショウ	高木林 常針 植	林床衰退	少数、多数	スギ	概ね食害	本来なし	

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地 名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全層への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)					
B		サウグルミ林 不:トリカブト属、フタリシズカ、ハシリドコロ、オオバアサガラ	高木林 夏広 自	林床衰退	なし		概ね食害	本来なし	
C		ミズナライヌブナ林 不:トリカブト属、フタリシズカ、ハシリドコロ	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	カエデ属、キハダ	概ね食害	食害枯死・消失	
419 A	高水三山	フナ	高木林 夏広 自	林床裸地	なし		食害枯死・消失	食痕多数	
420 A	御岳山	イヌブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
421 A	高水三山	落葉広葉樹とスギ	高木林 混交 二	優占種:イヌブナ、フナ、ミズナラ、モミ。湿性立地の広葉草本(ヒメフワバミソウ、オオモミジガサなど)にも食痕は認められない。					
422 A	鷲丘陵	コナラ林(コナラ、ヤマザクラ)	高木林 夏広 二	スミレやヤマツツジが咲いていて、樹形に変化などなかったため、影響がないように思う。					
423 A	青梅丘陵	針葉樹植林(スギ、ヒノキ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし		
B		落葉広葉樹林(コナラ、シデ類、サクラ類)	高木林 夏広 二	人の出入りが多く、下草刈りが行われている場所だったので、シカの影響は認められなかった。					
C		常緑広葉樹林(アラカシ、スダジイなど)	高木林 常広 二	人が歩いた道はたくさんあったが、シカの影響は認められなかった。					
424 A	野山北・六道山公園	コナラ林	高木林 夏広 二	特に植生の変化は認められなかった。					
425 A	三頭山	フナ林	高木林 夏広 自	個体に食害	少数、多数	下記	食痕少数	食痕多数	ミヤマクマザサ
426 A	三頭山	フナ林	高木林 夏広 自	ツリバナ、オオツリバナ、オオカメノキ、リョウブ					
427 A	三頭山	ヤマタイミンガサ-サウグルミ群集	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
B		オオモミジガサ-フナ群集	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	スズタケ
C		スギ植林	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕なし	本来なし	
428 A	浅間嶺	落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	スミレ、カタクリ、シロバナエンレイソウなどがみられ、シカの影響がある植生には見えなかった。					
429 A	笹尾根	植林地(スギ、ヒノキ) 不:ツルシキミ(写真)	高木林 常針 植	冬期であったため、主に確認できたのはシカ道。					
B		落葉広葉樹林 不:コアジサイ	高木林 夏広 自	優占種:コナラ、ミズナラ、クヌギ、ホノノキ。冬期であったが、林床植生はある程度確認できたので、影響はそれほど大きくない。					
C		カラマツ林(カラマツ)	高木林 夏針 植	個体に食害	少数	リョウブ(一部の個体)(写真)	食痕少数		
430 A	今熊山	針葉樹植林(スギ、ヒノキ)	高木林 常針 植	なし	なし				
B		落葉広葉樹林(イヌブナ、シデ類、カエデ類)	高木林 夏広 自	獣道があったが、林床植生は豊富なので、シカの影響は無いと思う。					
431 A	多摩川永田地区	ハリエンジュ群落	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		ススキ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		オギ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
432 A	陣馬山	カシワ、コナラ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B			草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
433 A	陣馬山・景信山	針葉樹植林(ヒノキ)	高木林 常針 植	林床衰退					
B		落葉広葉樹林(シデ類、モミジ類、その他)	高木林 夏広 二	(林床衰退は)登山者による踏み付けや下刈りの可能性もある。					
434 A	高尾山	落葉広葉樹(コナラなど) 不:ミヤマシキミ	高木林 夏広 自	林床構造変化					
435 A	高尾山	モミシキミ群集	高木林 常広 自	落葉時のため、食痕、シカ道は確認できなかった。					
B		ケヤキ-イロハモミジ群集	高木林 夏広 自	林内構造変化 いろいろな植物が見られるので、影響は小さいように思うが、ミヤマシキミが目立っている場所があったのが気になった。					
436 A	長沼公園(多摩丘陵)	コナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ
437 A	多摩森林科学園	落葉広葉樹林(サクラ類)	高木林 夏広 植	なし					
438 A	多摩森林科学園	モミ-アラカシ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	アズマネザサ
440 A	新島	スダジイ-オオシマカンスゲ 群集 不:アオノクマタケラン、タイミンタチバナ、マンリョウ、ヤブコウジ、アリドオシ、アサヒカサネ、シロダモ、ホソハカサワラビ。嗜:オオシマカンスゲ、シュラン、アオキ	高木林 常広 二	個体に食害	なし		食痕多数	食痕なし	ハチジョウスズタケ
B		トベラ-マサキ 群集 嗜:トベラ	低木林 常広 自	個体に食害	少数	トベラ	食痕少数	食痕なし	アズマネザサ
C		オオバヤシャブシ-ニオイウツギ群集 不:ヤマシソ	低木林 混交 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
D		オオシマザクラ-オオバエゴノキ群集 不:シロガモ、ナツトウダイ 嗜:オオシマカンスゲ、アオキ	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	ハチジョウスズタケ
441 A	御蔵島	ユズリハ-ヤマガルマ林	低木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ミヤマクマザサ
B		スダジイ林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ハチジョウスズタケ
442 A	八丈島	海岸植生(ハマボス、ハチジョウススキ)	草原 自	なし					

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地 名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全層への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)					
443 A	沢井	スギ植林	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
444 A	名倉	コナラ-ケヤキ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	スズタケ他
445 A	津久井城山公園	コナラ林 (コナラ、アラカシ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	下記
446 A	大室山	コナラ	高木林 夏広 二	林内構造変化	なし		食痕多数	食痕多数	スズタケ
B		不:オオバアサガラ	高木林 夏広 自	林床衰退	なし		概ね食害	食痕多数	スズタケ、ミヤマクマザサ
447 A	彦根山	アカマツ	高木林 常針 自	ササ枯れ目立つ。	個体に食害	なし	食痕少数	本来なし	
B		不:フタリシズカ、マツカゼソウ、アシボソ	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		食痕多数	食痕少数	ミヤマクマザサ
448 A	ホオツギ山	ヒノキ林伐採跡 (スズタケ散在)	草原 植	ピーク付近のみカラマツ林。ミヤマクマザサは雑生化している。テンニンソウの生育密度が高い。	なし	なし	食痕なし	食痕なし	スズタケ
B		スギ林	高木林 常針 植	伐採跡で植生としてはスズタケの散在。シカ(雌)の生個体一頭を目視、ネットにからまって暴れていた。	個体に食害	なし	概ね食害	食痕なし	アズマネザサ
449 A	菟釣山	ブナ	高木林 夏広 自	林床衰退	なし		食痕多数	食痕多数	スズタケ、ミヤマクマザサ
450 A	屏風岩山	ブナ、ミズナラ	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	ミズキ	概ね食害	食痕多数	スズタケ
B		不:マツカゼソウ、ミツマタ	高木林 常針 植	ササ枯れが目立つ。	林床衰退	少数	ヒノキ	概ね食害	本来なし
451 A	玄倉川周辺	ブナ	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	ミズキ、エゴノキ	概ね食害	食痕多数	スズタケ
B		不:マツカゼソウ、エゴマ	高木林 常針 植	ササ枯れ目立つ。	林床衰退	少数	ヒノキ	概ね食害	食痕多数
452 A	檜洞丸	落葉広葉樹林(コナラ、カエデ類など)	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	落葉広葉樹	食害枯死・消失	食痕多数	
B		不:ミツマタ(写真)、マツカゼソウ、サンショウ、マムシグサ、アセビ、タマアジサイ	高木林 夏広 自	林内構造変化	少数		食痕多数	食痕多数	
453 A	畦ヶ丸	ブナ イヌブナ	高木林 夏広 自	林床衰退	多数枯死	リョウブ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
454 A	大山	針葉樹植林	高木林 常針 植	林床衰退			食痕多数		
455 A	桜ヶ丘	クヌギ-コナラ群集	高木林 夏広 二	マツカゼソウが優占、またはその他の植物が衰退している場所があった。	なし	なし	食痕なし	食痕なし	
456 A	三国山	ブナ、ミズナラ	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	ミズキ	概ね食害	食痕多数	スズタケ
B		不:ヤマカモジグサ、フタリシズカ、オオバケイソウ	高木林 常針 植	ササ枯れが目立つ。	林床衰退	なし	概ね食害	食痕多数	スズタケ
457 A	三国山	ブナ、ミズナラ	高木林 夏広 自	林床衰退	なし		概ね食害	本来なし	
458 A	沢沢丘陵	混交林(スギ、ヒノキ、コナラ、クヌギ)	高木林 混交 二	不:フタリシズカ、マツカゼソウ。嗜:ミヤマイボタ	なし	なし			
459 A	桑野丘陵	クリ-コナラ群集	高木林 夏広 二	個体に食害	少数		食痕少数	食痕なし	スズタケ
B		ヤブコウジ-スダジイ群集	高木林 常広 自	個体に食害	少数		食痕少数	本来なし	
C		スギ植林	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
460 A	金時山	常緑針葉樹林(ヒノキ?)	高木林 常針 植	林床衰退					
461 A	箱根三国山	ヤマボウシ-ブナ群集	高木林 夏広 自	シカの痕跡は確認できていないが、林床植生がとても貧弱だった。	なし	なし	食痕なし	食痕なし	スズタケ
462 A	仙石原湿原	ススキ群落	草原 二	食痕には気付かなかったが、いわゆるケモノ道はあり(イノシシの可能性あり)、今後の推移を見守る必要がある。	なし	なし	食痕なし	本来なし	
B		ヨシ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
463 A	湘南平・高瀬山	落葉広葉樹林(コナラ、シデ類など)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし		アズマネザサ
B		常緑広葉樹林(スダジイ、アラカシ、タブノキ等)	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし		
464 A	鎌倉	混交林(コナラ、スダジイ、ヤブツバキ)	高木林 混交 二	なし	なし				アズマネザサ
465 A	神武寺・鹿取山	混交林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし		
466 A	箱根三国山	ブナ林	高木林 夏広 自	優占種:モミジ類、サクラ類、アラカシ、アカガシ	なし	少数	リョウブ	食痕なし	食痕なし
467 A	霧山	落葉広葉樹林(ウメ)	低木林 夏広 植	なし					一部でハコネダケが密生
468 A	芦ノ湖畔白浜	スギ-ヒノキ植林	高木林 常針 植	人が持ち込んだ植物(ウメ、カミヤツデ他)が見られるが、シカの影響は見られない。	林内構造変化	なし	食痕なし	本来なし	
469 A	箱根駒ヶ岳	イトスゲ-リョウブ群集	低木林 夏広 自	低木の食痕が目立ち、周囲より草本相の植被率が明らかに低い場所がある。	なし	なし	食痕なし		
471 A	真鶴半島	常緑広葉樹林(クスノキ、スダジイ、クロマツ)	高木林 常広 自	なし	なし				本来なし
472 A	毘沙門・蛸崎	海岸植生	低木林 常広 自	なし	なし		食痕なし		
473 A	城ヶ島	海岸植生(ハチジョウススキ)	草原 自	優占種:イソギク、ハチジョウススキ、トベラ、クコ、マサキ	なし	なし	食痕なし		

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全層への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
				目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)					
				その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
474 A	大字中東	ミズナラ群落(ミズナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
475 A	大字中東	ブナ群落(ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
477 A	奥胎内	コナラ林	低木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
478 A	福島潟	ヨシ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
479 A	角田山	ミズナラ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
480 A	新潟佐潟	ヨシ群落	草原 二	冷温帯落葉樹林～海洋性カシワ林(低木林を含む)			なし	なし	
481 A	阿賀野川左岸	ヤナギ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
483 A	寺泊	エゾイタヤケヤキ群集(エノキ、オニグルミ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チマキザサ、ヤヒコザサ
B		オクチョウジザクラ-コナラ群集(コナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
484 A	信濃川河岸	ヨシ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
492 A	木地屋白池	シラカンバミソソバ食・ミソソバ、ヤマニガナ	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	チマキザサ
B		ブナ-チマキザサ	高木林 夏広 自	カモシカによるものである可能性。			なし	なし	
494 A	大倉川	オギ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		サワグルミ群落	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		スギ群落	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
496 A	立山ノ一ノ越	雷田植生	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
516 A	おまい山	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ?
522 A	白山	ダケカンバ群落	高木林 夏広 自	ブナ実生(多数)、コハウチワ、ハウチワ、ヒトツバカエデ、ナナカマド、ナツツバキ、ヒメアオキ、リョウブ、マルバマンサク、オオハクモジ、ユキグニミツハツツシ、エゾアジサイ、コアジサイ、イワガラミ、サンショウ、タカノツメ、コシアブラ、ヤマウルシ、ツタウルシ、ツクバネ、サワフタギ、アキシバ、クルマバハグマ、ゼンマイ、ハクサンカメバヒキオコシ、チゴユリ、シシガシラ、シオデ、ギンリョウソウなどを観察し、食痕を認めなかった。					
B		アカミノイヌツゲクロベ群落	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
C		チシマザサ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	チシマザサ
523 A	白山	コメバツザクラ-ミネズオウ群落	低木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		ハイマツ群落	低木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
C		ハクサンボウフウ-モミジカラマツ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
524 A	雄島	タブノキ	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
525 A	三里浜	海浜植生(ハマゴウ、カワラヨモギなど)	草原 自	なし					
526 A	池河内湿原	湿原(ヨシ)	草原 自	なし					
527 A	玉川	ヤブマオ、ハマベノギク、ハマゼリ	草原 自	いろいろな湿原植物見られたのでシカの影響はないと思った。					
528 A	朝日	コナラ、アカマツ	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし		
529 A	三里山・行司岳	オクチョウジザクラ-コナラ群集	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
B		スギ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		タニウツギ群落	低木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
530 A	三里山	オクチョウジザクラ-コナラ群集	高木林 夏広 二	なし			食痕なし	食痕なし	
531 A	高倉峠	ブナ	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし		
532 A	岩見湿原	湿原	草原 自	なし					
533 A	池河内湿原	湿原(ハンノキ、ヨシ、スゲ)	草原 自	優占種:アリトウグサ、ノギラン、ミミカキグサ。貴重な湿生植物がいろいろ生えていたので、シカの影響はないように見えた。					
534 A	大島半島大島トンネル	蛇紋岩性灌木林	低木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
535 A	大島半島犬見	蛇紋岩性灌木林	低木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
536 A	和田	クロマツ	低木林 混交 自	個体に食害			食痕少数	本来なし	
537 A	天徳寺	不・マツカゼソウ	低木林 混交 二	林床衰退			食痕多数	食害枯死・消失	
538 A	野鹿の滝	スギ林	高木林 常針 植	電気柵を境にササ、ユキミバナ消失。			林床衰退	なし	
		不・マツカゼソウ、イワヒメワラビ、ダンドボロギク、オオバサガラ、オオバノイモトソウ、オオバノハチジョウシダ		ミカエリソウは食われているが、開花個体も多く、好まれてはいないよう。					

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食害・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
B		トチノキ林	高木林 夏夏 自	林床衰退	少数	リョウブ、ミズキ	食害枯死・消失	本来なし	
539 A	名田庄三重	コナラ林(コナラ、シラカシ、スダジイ) 隣接のスギ植林の林縁では、不イワヒメワラビ、ダンポボロギク、ベニバナボロギク	高木林 夏夏 二	林内構造変化	多数、少数枯死	下記	根ね食害	本来なし	
540 A	上根来	不イワヒメワラビ、アブラギリ、マツカゼソウ	高木林 混交 二	林床衰退			食害多数		
541 A	清里	不トチノキ	高木林 夏夏 自	個体に食害	なし		食害少数	食痕なし	
542 A	瑞穂山	落葉広葉樹林(ミズナラ) 不バイケイソウ、マルバダケブキ	高木林 夏夏 自	林床衰退			食害枯死・消失		
543 A	国師ヶ岳	シラビソ-オオシラビソ群集(シラビソ優占) 不ハナヒリノキ(食われていないが、とくに増えてはいない)	高木林 常針 自	個体に食害	少数	シラビソ	食害多数	本来なし	
544 A	西沢渓谷	落葉広葉樹林(カエデ類ブナ)	高木林 夏夏 自	なし					
545 A	西沢渓谷	ブナ群落	高木林 夏夏 自	林床衰退	なし、少数		根ね食害	食害枯死・消失	
546 A	笠取山	コメツガ、ウラジロモミ	高木林 常針 自	個体に食害	多数	ウラジロモミ	食害多数	食痕多数	
547 A	甲斐駒ヶ岳北麓	コナラ林	高木林 夏夏 二	林床衰退	多数	ナツツバキなど	根ね食害	食害枯死・消失	クマザサ
B		スギ林	高木林 常針 植	林床衰退	少数	スギ	根ね食害	本来なし	
548 A	乙女高原・小橋山	スキースズラン群集 不マルバダケブキ、キオン。嗜:ヤナギラン、アヤマ、ノハラアザミ	草原 二	個体に食害	少数		食害多数	食痕なし	
549 A	乙女高原	スキースズラン	草原 二	個体に食害			食害少数	本来なし	
B		ミズナラ-ヤエガワカンバ-シラカンバ林	高木林 夏夏 二	個体に食害	少数	ウリハダカエデ	食害少数	食痕なし	ミヤコザサ
550 A	琴川ダム	サワラ林(フジシダ-サワラ群集)小島山 嗜:サワツグ、ミヤマクマワラビ、クサコアカソ(林縁)	高木林 常針 自	個体に食害	なし		食害少数	本来なし	
B		カラマツ林 不シラネワラビ(部分的に優占)	高木林 夏針 植	林床衰退	多数	下記	根ね食害	本来なし	
551 A	乾徳山	山地上部高木林(ブナ、ミズナラ、カラマツ)	高木林 混交 自	林床衰退	多数	下記	根ね食害	食痕多数	
B		山地下部高木林 不フタリスズカ、マツカゼソウ、マムシグサ	高木林 混交 自	林床衰退	少数	下記	根ね食害	食痕多数	
552 A	三窪高原	スキースズラン群集 不マルバダケブキ	草原 自	個体に食害	少数	リョウブ	食痕なし	食害マヤマザサ	
B			高木林 自	個体に食害			食痕少数	食痕なし	ミヤマクマザサ
553 A	柳沢峠	サワグルミ林 嗜:ウツバミソウ	高木林 夏夏 自	林床裸地	なし		食害枯死・消失	食痕少数	スズタケ
B		ブナ-ウラジロモミ林	高木林 混交 自	個体に食害	少数枯死	下記	食痕少数	食痕少数	ミヤコザサ(優占)
554 A	後山山道	サワグルミ林(サワグルミ、シオジ) 不フタリスズカ、オオバサガラ、ガクウツギ(食痕はあるが、低木では他にくらべて残されている)	高木林 夏夏 自	林床衰退	少数	下記	食害枯死・消失	本来なし	
555 A	北岳・左俣沢	シラビソ オオシラビソ コメツガ	高木林 常針 自	なし	なし				
B		オオバヤナギ ドロノキ	高木林 夏夏 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		ヤハズハンノキ ダケカンバ ヒロハカツラ	高木林 夏夏 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
556 A	広河原	落葉広葉樹林 不コバノイラクサ、クサボタン(?)	高木林 夏夏 自	林内構造変化					
B		落葉広葉樹林(川沿い) 不カイツラコウ、コウシヤマハツカ(?)、カニコモリ、レイジソウ、ミツガワフ	低木林 夏夏 自	林内構造変化					
557 A	大菩薩峠	ミヤマクマワラビ群集 不ヤマアワ、嗜:シオガマギク、ヨツバヒヨドリ、チダケサシ、アキノキリンソウ	草原 自	個体に食害			食痕少数	食痕少数	ミヤマクマザサ
558 A	大菩薩峠麓	落葉広葉樹林 不ササ	高木林 夏夏 自	林内構造変化			食痕多数	食痕多数	
B		針葉樹林(ウラジロモミ(一部カラマツ)) 嗜:ササ	高木林 混交 自	林内構造変化	多数	ウラジロモミ(写真)			
559 A	小倉山	ミズナラ-コナラ林 不タケノグサ(疎開地の一部に群生)、セキヤノアキチョウジ	高木林 夏夏 二	林床衰退	多数、少数枯死	下記	根ね食害	本来なし	
B		ウウミズザクラ-クリ林 不ゼンマイ、ハリガネワラビ、フタリスズカ	高木林 夏夏 二	林床衰退	多数、少数枯死	下記	食害枯死・消失	本来なし	
560 A	三頭山鶴峠	ブナ林 不ハシリドコロ、トリカブトsp.	高木林 夏夏 自	林床衰退	多数	リョウブ	根ね食害	食痕多数	スズタケ
B		ヒノキ林 不オオバサガラ	高木林 常針 植	林内構造変化	少数	ヒノキ	食痕多数	本来なし	
561 A	夜叉神峠	ミズナラ林 不ルイヨウボタン、オクマワラビ	高木林 夏夏 二	林床衰退	少数	ツリバナ	食痕多数	食害枯死・消失	スズタケ
562 A	柵形山	スキースズラン群集 不マルバダケブキ、ハンゴンソウ、嗜:クササチバナ、ツリガネニンジシ	草原 二	個体に食害			食痕多数	食痕多数	クマイザサ
563 A	笹子峠	ミズナラ-クリ林 嗜:ヤマツツジ、ホツツジ、アキノキリンソウ、シロヨメナ、ミツバウツギ	高木林 夏夏 二	個体に食害	少数	リョウブ(比較的新しい)	食痕少数	食痕なし	ミヤマクマザサ、スズタケ
B		オニイタヤ林 嗜:シラネセンキュウ、ノブキ、ヤマアジサイ	高木林 夏夏 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
564 A	扇山	イヌフナ群落 不・フタリシズカ	高木林 夏広 自	個体に食害	少数	リョウブ	食痕少数	本来なし	
	B	スギ人工林 不・シモバシラ	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
565 A	上戸川	シラカンバアカマツ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
566 A	三ツ峠山	ブナ林 嗜・レンゲシヨウマ、ヤマトユキザサ、ヤマタイミンガサ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
567 A	御坂黒岳	落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	なし					
	B	ブナ群落	高木林 夏広 自	なし					
	C	針葉樹植林	高木林 常針 植	なし					
568 A	三ツ峠山	落葉広葉樹林 不・レイジンソウ	高木林 混交 自	個体に食害			食痕多数		
569 A	御坂黒岳	オオモミジガサブナ群集	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
	B	スギ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
	C	シラビソ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
570 A	本栖湖	ミズナラ林 嗜・ハンカイシオガマ	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
571 A	竜ヶ岳	ササ草原(ミヤコザサ)	草原 自	なし					ミヤコザサ
	B	落葉広葉樹林(ヤマボウシなど)	低木林 夏広 自	なし					
572 A	パノラマ台	落葉広葉樹林(コナラなど)	高木林 夏広 自	なし					
	B	常緑針葉樹林(青木ヶ原樹海の一部)	高木林 常針 自	なし					
573 A	青木ヶ原	ミズナライヌブナ林 不・フタリシズカ、ハリガネワラビ	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	アオハダ	食害枯死・消失	本来なし	
	B	ツグヒノキ林	高木林 常針 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
	C	イヌブナ林(大室山) 不・フタリシズカ(多)、クサギ(少)、ホソバテンナンショウ(少)	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	下記	食害枯死・消失	食痕多数	スズク(もとも少ない)
574 A	富士山/大室山	ブナイヌブナ群集 不・フタリシズカ	高木林 夏広 自	林床衰退	なし		食害枯死・消失	本来なし	
	B	クロベ林	高木林 常針 自	林内構造変化	なし		食痕なし	本来なし	
575 A	梨が原	ススキカワラマツ群落 不・テンニンソウ、ハンゴンソウ、フタリシズカ。嗜・オオバギボウシ、サラシナショウマ	草原 二	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	
	B	ヤマハノキ林(ブナ・ヤマボウシ群集) 不・フタリシズカ、テンニンソウ、サウギク	高木林 夏広 二	林内構造変化	少数	マユミ	食痕少数	本来なし	
576 A	御正体山	ヤマタイミンガサ、ブナ、ウラジロモミ 不・バイケイソウ	高木林 混交 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
	B	イタヤカエデ、オオイタヤメイゲツ 嗜・オンダ	高木林 夏広 自	個体に食害	少数	リョウブ	食痕多数	食痕少数	ミヤコザサ?
577 A	三里地区	耕作地と遊休農地	草原 混交 植	個体に食害	少数	春・リョウブ、冬・モミ	食痕多数	食痕少数	不明
578 A	富士山/奥庭	シラビソカラマツ林	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
579 A	富士山/御中道	ダケカンバ 嗜・タカネバラ	低木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
	B	シラビソ・コメツガ林	低木林 常針 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
580 A	富士山(5-7合目)	火山荒原(オノエイタドリ(フジイタドリ))	草原 自	なし					
581 A	山中湖	コナラ、ミズナラ 嗜・ササバギランなどがまだ見られる。	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
	B	ススキ 嗜・シオガマギク	草原 二	個体に食害			食痕少数	本来なし	
583 A	白馬大池	オオシラビソ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
	B	ダケカンバ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし		
	C	ハクサンボウフウ・モミジカラマツ群集	草原 自	なし			食痕なし	本来なし	
584 A	風吹大池	クロベ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし		
	B	オオシラビソ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし		
	C	ヌマガヤ草原	草原 自	なし					
585 A	戸隠高原	ミズナラ 嗜・オンダ、ツリバナ	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	クマイザサ

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全層への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食害・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
586 A	北アルプス八方尾根	オオシラビソ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
B		ショウジョウスケ草原	草原 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
588 A	北アルプス遠見尾根	オオシラビソ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
589 A	烏帽子岳	ブナ、ミズナラ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
B		オオシラビソ、ダケカンバ	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
590 A	湖の丸高原	ミズナラ林	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	クマイザサ
591 A	経井沢(浅間山東麓)	ミズナラ-ダケカンバ林	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
592 A	上高地	ケショウヤナギ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		ハルニレ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	シナノザサ
C		サワグルミ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
593 A	檜ヶ岳	ダケカンバ群落	低木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
B		高山草原(ウラジロタデなど)	草原 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
594 A	上高地	ヤナギ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	シナノザサ(クマイザサ)
B		トウヒ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	シナノザサ(クマイザサ)
C		コメツガ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
596 A	入山辺忍沢	ウラジロモミ、ミズナラ、ヒノキ	高木林 混交 自	林床衰退	多数、少数枯死		食痕多数	食痕多数	スズク
597 A	荒船山	ミズナラ林	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	ナツツバキ	食害枯死・消失	食痕少数	ミヤコザサ、スズク
		嗜:シモツクソウ		葉がそこらじゅうに溢れている。裸地が目立ち、それ以外の場所はササだけに覆われており、単純な植生になっている。					
598 A	乗鞍高原	ススキ	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		嗜:オオカサモチ、マツムシソウ							
		嗜:オオカサモチ、マツムシソウ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	クマイザサ
599 A	白樺峠	シラカンバ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
600 A	奈川渡ダム下流	ミズナラ群落(ミズナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	スズク
				食痕は多数確認した。当初シカのものかとも思ったが、カモシカの個体と異境を確認したので、食痕はカモシカのものかと判断した。周辺の無人カメラでもシカは写らなかった。					
601 A	高ボツ高原	ススキ-スズラン群集	草原 二	個体に食害			食痕少数	食痕少数	ミヤコザサ
		不:フウノハナワラビ、嗜:ヨツバヒヨドリ、ミヤマギイチョウ、オトコヨモギ							
602 A	霧ヶ峰	ススキ-スズラン群集	草原 二	個体に食害			食痕少数	本来なし	
		嗜:マツムシソウ、ゼンテイカ		花を選んで食べている。					
603 A	霧ヶ峰	高山草原(ヨツバヒヨドリ、アカバナシモツクなど)	草原 自	なし					
				いろいろな高山植物が咲いていたのでシカの影響はないように見えた。					
604 A	霧ヶ峰高原	高層湿原	自	少数、少数枯死		マユミ	食痕多数	本来なし	
				湿原の被害調査は昨年11月(数回調査:報告書有り)から始まり、本年9月まで行われる。本年は調査後の5月より行われつつあり、植物生育期の被害の要因が把握される(天然記念物のため調査許可に時間がかかったこと、期間も短い。調査主体は、地元の霧ヶ峰自然環境保全協議会(諏訪地方事務所)で、筆者が担当。(樹皮剥ぎは)マユミのみが選択的に被害を受けている。					
605 A	織枯山	シラビソ-オオシラビソ群集	高木林 常針 自	個体に食害	多数、少数枯死	シラビソ、オオシラビソ	食痕多数	食痕少数	クマイザサ
		不:トリカブト類(ホソバトリカブト?)		上述のとおり、シラビソ・オオシラビソへの樹皮剥ぎは調査範囲の中では亜層帯を主体としているが、食害は明らかに拡大傾向にある。標高2200m以上で見られる世界的に有名なシマガレ現象への影響さえ危惧される状況となった。この地域は美濃のため最近12年間は毎年訪れているが、林床基木のうちマイヅルソウやゴゼンタナバナは、この10年間でかなり減少したとの印象がある。記録写真によると、モミ属の樹皮剥ぎは2003年にも見られるが、顕著になったのは2007年以降のことである。					
606 A	織枯山	シラビソ-オオシラビソ林	高木林 常針 自	個体に食害	多数、少数枯死	シラビソ、オオシラビソ	食痕多数	食痕多数	
				主に伊勢湾台風(1959年)による風倒地の更新林、シラビソ・オオシラビソの成木の約1割程度は樹皮剥ぎを受けている。稚樹には枝葉食害あり。オオシラビソに比べシラビソにおいて食害多い。					
607 A	北横岳	ササ草原(ミヤコザサ)	草原 自	林内構造変化					ミヤコザサ
		不:ヤツガタケアザミ		食痕などは特に確認していないが、アザミだけが優占しているような不自然な植生が見られた。					
608 A	丸山・白駒池	ササ草原	草原 自	林内構造変化					
B		不:ヤツガタケアザミ、ホソバトリカブト、ササ類が目立つ		不嗜好種以外の植物が少なかった。					
		不:コメツガ群落	高木林 常針 自	林内構造変化					
		不:ホンジャクナゲ		不嗜好種以外の植物がとて少なかった。					
609 A	麦草峠	シラビソ-オオシラビソ群集	高木林 常針 自	個体に食害	少数	シラビソ	食痕少数	食痕少数	ミヤマクマザサ
B		イネ科草原	草原 自				食痕多数	本来なし	
610 A	北沢(ハヶ岳)	針葉樹林(コメツガ、カラマツ、シラビソ)	高木林 混交 自	林床衰退	なし		食害枯死・消失(写真)		
		不:ハリブキ、キタザワラシ		シカによる食害で、林床が衰退しているように見えた。					
B		落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	林内構造変化	なし		食痕多数		
		不:ヤツガタケアザミ							
611 A	飯盛山	低木林(ズミ)	低木林 夏広 自	なし					
				シカ以外の影響が大きい場所以外にはいろいろな植物が見られたので影響はないように思えた。					
612 A	三国山・高天原山	ミズナラ林	高木林 夏広 二	林床衰退	なし		概ね食害	本来なし	
		不:レンゲツツジ、ニイタカスゲ、シロバナノヘビイチゴ、嗜:ベコバナツクバナ、ツツジ、コマユミ、ネジキ		低木は食害により壊滅的な状態。					
B		コメツガ林	高木林 常針 自	林内構造変化	少数	ウラジロモミ	概ね食害	食痕少数	チマキザサ類
C		不:シラネウラボ		林内にシカ道が縦横無尽にできている状態。					
		ダケカンバ林	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	ウラジロモミ	概ね食害	食痕多数	下記
		不:マルバダケブキ、キオン、サンヨウブシ、バイケイソウ、ヤマトボンガラ		ササ:スズク(被害甚大)、チマキザサ類(被害軽微)。					
613 A	木樫入山	サワグルミ-ヒロハカツラ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
		不:バイケイソウ 嗜:ギョウジャニンニク							

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食害・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)					
614 A	入笠山	ミスナラ林 嗜: イタドリ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	
616 A	下青木	アカマツ・広葉樹林 不: オオバアサガラ	高木林 混交 二	林床衰退	多数、多数枯死		食害枯死・消失	食害枯死・消失	クマイザサ
617 A	青田山	ヒノキ人工林	高木林 常針 植	林内構造変化	多数、多数枯死	ほぼすべて	食害枯死・消失	食害枯死・消失	ミヤコザサ節
618 A	豊口山	カラマツ人工林 不: イケマ、マルバダケブキ、イワガネゼンマイ、ヨツバヒヨドリ	高木林 夏針 植	林床裸地	なし		食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
B		シラビソ-オオシラビソ群集 (コメツガ林) 不: ヒロハノヘビノボラス、シロヨメナ	高木林 常針 自	林床衰退	少数	ウラジロモミ	概ね食害	本来なし	
C		シラビソ-オオシラビソ群集 (ウラジロモミ林) 不: イケマ、バイケイソウ、マルバダケブキ、サウギク、イヌヤマハッカ(?)	高木林 常針 自	林床裸地	多数	ウラジロモミ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
619 A	水晶山	コナラ林 嗜: アキノキリンソウ、オケラ、シラヤマギク、ナガバノコウヤボウキ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
620 A	櫻ヶ島~西沢渡	サウグルミ林 不: フタリスズカ、ハナタデ、ミスヒキ、ムカゴイラクサ、コソノイラクサ、クサコアカソ	高木林 夏広 自	林床衰退			食痕多数	本来なし	
B		イヌバナ林	高木林 夏広 自	林床裸地			食痕多数	食害枯死・消失	下記
621 A	光岳	ミズナラ、クリ 不: フタリスズカ、クサコアカソ	高木林 夏広 自	林床裸地			食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
B		フナ、サウラ、ウラジロモミ 不: ミヤマタニタデ	高木林 混交 自	林床裸地			食害枯死・消失		
C		イワオトギリ、チシマフウロ、イネ科草本 不: バイケイソウ	草原 自						
622 A	光岳・上河内岳	シラビソ 不: バイケイソウ、マルバダケブキ	高木林 常針 自	林床裸地	少数	リョウブ	食害枯死・消失	本来なし	
B		ハイマツ	低木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		ミヤマダイコンソウ	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
623 A	聖岳	マルバダケブキ、バイケイソウ 不: バイケイソウ、マルバダケブキ	草原 自				食害枯死・消失	本来なし	
B		タカネツメクサ	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		上、下部温帯~亜高山帯	高木林 混交 自	林床裸地	なし		食痕多数	食害枯死・消失	スズタケ
629 A	石徹白のスギ付近	フナ、ミズナラ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
631 A	朝日添川付近	ミズナラ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	チシマザサ
633 A	大洞峠付近	スギ植林 不: シロモジ 嗜: コアジサイ	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	
634 A	白尾スキー場	スギ-ヒノキ植林	高木林 常針 植	個体に食害	少数	ヒノキ	食痕なし	本来なし	
635 A	大和町内ヶ谷	クリ-ミズナラ群落	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕少数	食痕なし	
B		スギ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕少数	本来なし	
637 A	登路瀬		高木林 常広 植	個体に食害	多数	スギ・ヒノキ			
638 A	神崎・今島	スギ 嗜: アオキ	高木林 植	個体に食害	なし		食痕少数		
639 A	面平山	コナラ群落 (コナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		スギ-ヒノキ植林 (スギ、ヒノキ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
640 A	北山								
641 A	奥板山	コナラ群落 (コナラ) 嗜: リョウブ	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	リョウブ	食痕なし	本来なし	
B		スギ-ヒノキ植林 (スギ、ヒノキ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
642 A	広野	ヒノキの植林地 不: ササ	高木林 常針 植	個体に食害	少数	ヒノキ	食痕少数	食痕少数	
643 A	谷汲・名礼・仁柿	スギ 嗜: アオキ、シラキ	高木林 常針 植	林床衰退	少数	シラキ	概ね食害	食痕少数	
644 A	谷汲・名礼・仁柿	コナラ 食: カタクリ、ササユリの花芽を食害	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	シラキ	食痕多数	食痕少数	
646 A	伊自良川上流域	コナラ群落 (コナラ) 嗜: リョウブ	高木林 夏広 二	林床衰退	多数、少数枯死	下記	食痕なし	本来なし	
648 A	長滝	スギ 嗜: アオキ	常針 植	個体に食害	なし		食痕多数		
649 A	半道	スギ-ヒノキ植林 (スギ、ヒノキ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ
650 A	穴洞	スギ-ヒノキ植林 (スギ、ヒノキ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
652 A	難倉	スギ 嗜: アオキ、イヌガヤ	常針 植	個体に食害					
653 A	谷汲	スギ 嗜: アオキ	高木林 常針 植	林床衰退					
654 A	大谷山	スギ ヒノキ コナラ 嗜: アオキ	常針 植	個体に食害	なし		食痕なし		

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
655 A	金華山		高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
656 A	台所山	コナラ群落(コナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ
658 A	国営木曾三川公園	カワラヨモギ-カワラサイコ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		エノキ群落	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
659 A	今須/祖父江谷		高木林						
嗜:アオキ									
661 A	濃尾大橋	河辺林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				ヨシ原(自然草原)もほぼ同様。					
663 A	跨山						食痕多数		
嗜:アオキ									
664 A	悪沢岳	ブナ-ウラジロモミ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		シラビソ-オオシラビソ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		ハイマツ群落	低木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
665 A	毛無山	イヌブナ林	高木林 夏広 二	なし	少数	リョウブ	食痕少数	食痕なし	スズタケ
B		スギ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		イロハモミジ-ヤキ群集 不:カンスゲ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	スズタケ
666 A	富士山/宝永火口付近	タイツリオウギ-イワオウギ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		カラマツ低木群落	低木林 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
667 A	富士山/東斜面	カラマツ人工林 不:テンニンソウ、マルバダケブキ	高木林 夏針 植	林内構造変化	なし		概ね食害	食害枯死・消失	スズタケ
B		カラマツ-ダケカンバ群落	高木林 夏針 自	林内構造変化	なし		食痕少数	本来なし	
				低木層欠落、カニコウモリなど高茎草本が小型化。					
668 A	安倍峠	ブナ林	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	スズタケ、ミヤマクマザサ
669 A	山伏	ブナ林	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	スズタケ
B		コメツガ林	高木林 常針 自	個体に食害	少数	下記	食痕少数	食痕少数	ミヤマクマザサ
				樹皮剥ぎ:ダケカンバ、シラカンバ、ウラジロモミ					
670 A	富士山/西臼塚	ブナ-ヤマボウシ群集 不:バイケイソウ、コクサギ、シロヨメナ、ヒロハノハネガヤ(?)、嗜:コアカソ、モミジガサ	高木林 夏広 自	林床衰退	少数、少数枯死	ウラジロモミ	概ね食害	食痕多数	スズタケ
B		ススキ群落	草原 二	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	
C		不:シロヨメナ、イヌヤマハッカ、コクサギ、嗜:ミズキ、キハダ、コアカソ ウラジロモミ人工林	高木林 常針 植	林床裸地	多数、少数枯死	ウラジロモミ	概ね食害	本来なし	
				1997年の台風による人工林の風倒跡地。ミズキ、キハダなどの種樹の芽がよく食べられている。					
671 A	富士山/浅黄塚	ブナ-ウラジロモミ群落	高木林 混交 自	林内構造変化	多数、多数枯死	ウラジロモミ	概ね食害	食害枯死・消失	スズタケ
B		カラマツ人工林 不:シロヨメナ、イケマ、マルバダケブキ	高木林 夏針 植	林床衰退	なし		概ね食害	食害枯死・消失	スズタケ
				ウラジロモミの多くの個体で根元部分が剥皮されている。					
672 A	富士山/浅黄塚	ブナ-ヤマボウシ群集(ブナ-ウラジロモミ林) 不:バイケイソウ	高木林 混交 自	林内構造変化	少数枯死	下記	概ね食害	食害枯死・消失	スズタケ
B		ヒノキ林	高木林 常針 自	個体に食害	少数	ウラジロモミ	食痕少数	本来なし	
C		カラマツ林 不:マルバダケブキ、ルイヨウボタン	高木林 夏針 植	林床裸地	少数枯死	ミヤマイボタ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
				カラマツの不成植林。林床にシロヨメナなどの不嗜好植物が繁茂し、スズタケが衰弱した周囲の自然林内への侵入拡大がみられる。					
673 A	位牌岳	ブナ林	高木林 夏広 自	林床裸地	少数	タシナサフタギなど	食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
B		アカガシ林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				樹皮剥ぎ:ウラジロモミ、ミヤマイボタ、イヌザクラ、サワグルミ。2008年からスズタケの衰退を観察。全面枯死に近い状況だが、枯死種が残っており、不嗜好植物の拡大はまだ生じていない。					
674 A	因南原生林	シキミ-モミ群集	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ハコネダケ
B		ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ハコネザサ
675 A	玄岳	ササ草原	草原 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
B		イヌシデ-コナラ群落	夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
676 A	蓮山	スギ・ヒノキ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
677 A	金冠山	ススキ草原	草原 二	個体に食害			食痕少数	食痕少数	クマイザサ類
B		アセビ低木林	低木林 常広 自	個体に食害	少数		食痕少数	食痕なし	クマイザサ類
678 A	松川湖・奥野溪谷	スギ・ヒノキ植林	高木林 常針 植	林床衰退	なし		概ね食害		
679 A	松川湖・奥野溪谷	スギ・ヒノキ植林 不:オオバノイノモトソウ、イワヒメワラビ	高木林 常針 植	林床裸地	少数	エゴノキ	概ね食害	本来なし	
				林道沿いの路傍などの影響も大きい。					
680 A	猫越峠	アカガシ-ブナ群落	高木林 混交 自	林床衰退	なし		食害枯死・消失	食害枯死・消失	
				隣接地にはコバノイシカグマ、イワヒメワラビなどの不嗜好植物が林床、林縁などで優占。					
681 A	猫越岳・三蓋山	ブナ林 不:アセビ	高木林 夏広 自	林床裸地	少数		食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
				林床は広面に埋地化しており、過去に生育していた(であろう)スズタケがほとんど消失している。林冠ギャップではアセビの株が数個体生育。比較的広い落葉跡地ではコケが生えている。					

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(復占種)	植生タイプ	群落全への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
682 A	八丁池	ヤマボウシ・フナ群集 不:シロヨメナ	高木林 夏広 自	林床裸地	少数		食害枯死・消失	食害枯死・消失	
683 A	天城山	落葉広葉樹林(フナ、ヒメシャラ) 不:アセビ(低木層~上層のほとんどを占める)、ツルシキミ、ヤマトリカブト	高木林 夏広 自	林床衰退			食害枯死・消失		
684 A	天城山	サウグクミ林 不:アセビ	高木林 夏広 自	林床衰退	多数、少数枯死	下記	概ね食害	本来なし	
B		フナ林 不:アセビ、ミヤマシキミ	高木林 夏広 自	林床衰退	多数、少数枯死	下記	概ね食害	食痕多数	スズタケ
685 A	伊豆シラヌタ池	モミ群落	高木林 混交 自	林床裸地	少数		食痕少数	食害枯死・消失	
686 A	向田川遊歩道	スギ・ヒノキ植林 不:カナワラビ類	高木林 常針 植	林床衰退	なし		食害枯死・消失		
B		ヤブツバキ・イヌシデ群落	夏広 二	林床衰退	なし		食害枯死・消失		
687 A	安城峠	トベラウバメガシ群落	低木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
688 A	天城峠	モミ・シキミ群落	高木林 常針 自	林床衰退	少数		食害枯死・消失	本来なし	
B		イロハモミジ・ケヤキ群落 不:マツカゼソウ	高木林 夏広 自	林床裸地	多数		概ね食害	本来なし	
C		アカガシ林	高木林 常広 自	林床衰退	多数		概ね食害	本来なし	
690 A	細野高原	ススキ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし		
691 A	三筋山・細野高原	トダシバ・ススキ群落	草原 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
692 A	稲取峠	トベラウバメガシ群落	低木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
693 A	東大樹芸研究所	スダジイ・コナラ(スダジイ) 不:キツネノコブシ、イヌセンリョウ、ナシダ。 唯:アオキ、イヌビロ、ハマヨウガ	高木林 常広 自	林内構造変化	少数	下記	食痕多数	本来なし	
694 A	石廊崎	クサギ・アカメガシ群落 不:アオジソ、ジャケツイバラ	低木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
695 A	築水池	コナラ群落(コナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ケネザサ
696 A	海上の森	コナラ群落	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし		
B		ハンノキ群落	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし		
697 A	碓氷石山	リョウブの二次林	低木林 夏広 二	個体に食害	多数、少数枯死	リョウブ、カエデsp.	食痕なし	食痕なし	
698 A	作手菅沼	スギ林 不:ククリソウ、ドクゼリ	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		食痕多数	本来なし	
699 A	作手菅夫	スギ林	高木林 常針 植	なし			食痕なし	本来なし	
702 A	作手黒瀬	スギ林 不:アセビ	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		不明	本来なし	
703 A	本久	スギ・ヒノキ植林(ヒノキ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	下記
B		コナラ群落(コナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	メダケ(下記)
C		伐採跡地群落	低木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	メダケ(下記)
704 A	上衣文(かみそぶみ)町	アベマキ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ
705 A	本宿町	アベマキ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	アズマネザサ
706 A	福津峠・基古山	スギ・ヒノキ植林 嗜:コアカソ	高木林 常針 植	なし	なし		食痕少数	食痕なし	
708 A	篠島	海岸性照葉樹林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
711 A	鞍掛峠	シロモジ、シデ類、アブラチャン、ウリハダカエデ	低木林 夏広 二	林内構造変化	少数		食痕多数	食痕多数	ミヤコザサかチマキザサ(記憶不確か)
712 A	藤原岳(孫太尾根)	シデ類、スギ、シロモジ、カエデ類、モミ、イヌブナ 不:バイケイソウ	夏広 自	林内構造変化	なし		概ね食害	食害枯死・消失	チマキザサ
713 A	藤原岳山麓	スギ林 嗜:ヒカゲイノコヅチ、ノコンギク	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	ネザサ
714 A	竜ヶ岳	ササ(種類不明)	草原 混交 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
715 A	多度山麓	コジイ、アカマツ、コナラ 不:ウラジロ	高木林 混交 二	林床裸地			食害枯死・消失	食痕多数	
716 A	多度映の南丘陵	コナラ・アカマツ林 不:ナキリスダ、ニガイチゴ、フユイチゴ、ウスゲコバノイシカグマ、ウラジロ、コシダ、イフヒメワラビ、ハリガネワラビ	高木林 混交 二	林床裸地	少数	リョウブ	食害枯死・消失	食痕多数	ネザサ
718 A	多度山	コジイ・カシ類林 不:イロヒメワラビ、マツカゼソウ、ダンドボロギク。 嗜:イタドリ、ハダカホオズキ、ニガイチゴ	低木林 常広 二	個体に食害	少数	リョウブ	食痕少数	食痕少数	ケネザサ
719 A	八雲溪谷	コナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ類
720 A	御在所山	ツツジ類、リョウブ、ソヨゴ	低木林 夏広 自	個体に食害	少数		食痕少数	食痕少数	チマキザサ
721 A	湖の山温泉~雲母峠	アラカシ林(アラカシ、コナラ) 不:マツカゼソウ 嗜:スズカアザミ	高木林 常広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	ネザサ
722 A	伊坂貯水池	コナラ林 不:コウヤボウキ 嗜:ネザサ類	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕多数	ネザサ、ケネザサ

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食害・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
723 A	横山新田	コナラ-アカマツ林	低木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕なし	食痕少数	ネザサ、ミヤコザサ
724 A	加太	スギ-ヒノキ林 不: マツカゼソウ、イワヒメワラビ、ダンドボロギク、ワラビ。嗜: コアカソ(かなり食痕が目立つ)	高木林 常針 植	林床衰退	なし		食痕多数	食痕多数	ネザサ
725 A	彌山池	タブノキ-コナラ林 不: レモンエゴマ。嗜: 溜池内のカヤツリグサ類、ヒナタイノコヅチ、イタドリ、アザミ類(スズカアザミ)、ウツギ、ヒサカキ	高木林 混交 二				食痕多数	食痕多数	ネザサ
726 A	加太(かぶと)	コナラ-アラカシ林 嗜: イタドリ、コアカソ	低木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕多数	食痕多数	メダケ、ネザサ
B		スギ-ヒノキ林	高木林 常針 植	林床衰退	なし				
727 A	雨引山山麓	スギ-ヒノキ林 不: ミヤマカンスゲ	高木林 常針 植	林床裸地	なし		食痕多数	食痕少数	ネザサ
729 A	経ヶ峰山麓	スギ・ヒノキ植林と伐採跡(ススキ草地、クサギ)	高木林 常針 植	林床裸地	少数	スギ、ヒノキ	概ね食害	食痕多数	
731 A	箕内池	タブノキ-コナラ林	低木林 混交 二	個体に食害	なし		食痕多数	食痕多数	ネザサ
733 A	法花温泉	コナラ-アカマツ林	低木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	ネザサ
734 A	鳥ヶ原-法花	夏緑性雑木林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
735 A	桂畑	スギ-ヒノキ林	高木林 常針 植	個体に食害	少数	スギ	食痕多数	食痕多数	スズタケ
B		林縁群落 不: レモンエゴマ、マツカゼソウ、オタカラコウ、ダンドボロギク、オオバアサガラ。食: ススキ、ウツギ	低木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕多数	食痕多数	スズタケ
736 A	桂畑・南長野	スギ-ヒノキ植林林縁 不: イロヒメワラビ、フユイチゴ、マツカゼソウ、ヒカゲスゲ、イズセンリョウ、シシミ、ウラボシ。嗜: ネザサ、ススキ、ウツギ、ヒサカキ、ナウシロクミ、ネズミモチ	高木林 常針 植	個体に食害	なし		概ね食害	食害枯死・消失	ネザサ
737 A	布引の滝	スギ林 不: Rubus spp.	高木林 常針 植	なし	なし		食痕少数	食痕多数	メダケ
738 A	経ヶ峰東南麓	スギ植林	高木林 常針 植		なし		食痕多数	食痕少数	
739 A	穴倉・足坂周辺	スギ林	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	ネザサ
740 A	産品と分帯一部	コナラ林(コナラ、アラカシ、ハンノキ) 嗜: ケネザサ	低木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	ケネザサ
741 A	片田中町	コナラ林 嗜: キショウブ	低木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	ネザサ
742 A	榎原温泉東部	コナラ-コジイ林 嗜: アオキ、ネザサ、メダケ(草刈りが行き届いていない、よくわからない)	高木林 混交 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	ネザサ、メダケ
743 A	美里町三郷	ヒノキ-スギ林 不: ホシダ、クサギ 嗜: ネザサ	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	ネザサ
745 A	霧生	スギ林 不: マツカゼソウ、Rubus spp.	高木林 常針 植	林床衰退	なし		概ね食害	本来なし	
746 A	赤目峯(赤目溪谷)	ケヤキ-カエデ類林 不: ベニバナボロギク、ダンドボロギク、イワヒメワラビ、ミヤマキクマン、オオバノハチジョウシダ、ミズヒキ。嗜: アザミ類、コアカソ、イノデ、サイコクイノデ、キツネノマゴ、ヤマハッカ、ネザサ、ウワバミソウ	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕多数	食痕少数	ネザサ、ミヤコザサ
B		スギ植林	高木林 常針 植	林床裸地	なし		概ね食害	食害枯死・消失	ネザサ
747 A	大洞山	カエデ類、アサガラ、オオバアサガラ、ヤマトアオダ 不: バイケイソウ。嗜: オシダ	高木林 夏広 自	林内構造変化	なし		食痕多数	食痕多数	ミヤコザサ
748 A	大洞山東麓(中腹)	スギ-ヒノキ林 不: ワラビ、ダンドボロギク。嗜: ヤマトツツジ、モチツツジ、リョウブ、イタドリ、チガヤ、ツルヨシ	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	
749 A	矢頭山麓(矢津神社)	スギ植林(ホソバタブ、シロガモ混交) 不: マツカゼソウ。嗜: ウスギナツノタムラソウ	高木林 混交 植	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	スズタケ
750 A	神島	照葉樹林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
751 A	三峰山	ブナ-ミズナラ林 不: イロヒメワラビ、コバノイシカグマなどのシダ類、ダンドボロギク、ベニバナボロギク、マツカゼソウ、アゼビ、ミヤマヤマコサ、カヤツリ。嗜: ムラサキシキブ、ヤブムラサキ、メギ、サンショウ、コアジサイ、マルバウツギ、ハイカウツギ、ヤマツツジ、カマツカ、コバノガマズミ、イヌツゲ、サルトリイバラ、イヌシヂ、ヤブイバラ、コアカソ、ナガバモミジイチゴ	高木林 夏広 自	林床裸地	少数	下記	概ね食害	食害枯死・消失	スズタケ、ミヤコザサ
752 A	三重大平倉演習林	スギ人工林 不: マツカゼソウ、イワヒメワラビ、ミヤマシキミ、シキミ	高木林 常針 植	林床衰退	少数	リョウブ、ヤブツバキ	食痕多数	食害枯死・消失	スズタケ、ミヤコザサ
B		ブナ、ミズナラ 不: ミヤマシキミ、イワヒメワラビ。嗜: ミヤマクマワラビ、ガクウツギ、リョウブ、ヤマツツジ、アオスゲ類	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	リョウブ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
754 A	国東山		高木林 常広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	スズタケ
755 A	柳ヶ池	ヒノキ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
756 A	円座	河辺草原	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
757 A	朝熊ヶ岳		低木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
758 A	木樫山	ミズナラ、ブナ、ヒメシャラ	低木林 夏広 自	林床衰退	少数		概ね食害	食痕多数	
759 A	飯高町蓮	夏緑広葉樹林、スギ植林とも 不: ヌズリハ、Phytolacca	高木林 夏広 自	林内構造変化	なし		食痕多数	本来なし	
761 A	南中村	スギ林 不: Rubus spp.	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		食痕なし	食痕なし	

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全般的影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食害・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)			その他の具体的状況(上記に集約できない状況)				
762	A	神岳	低木林 常広 二	林床衰退	なし	概ね食害	本来なし	本来なし	
		不:アセビ			優占種:アラカシ、アカマツ、シロダモ、ヒサカキ、コジイ、ヤブツバキ、アセビ、ヤマツツジ、ヒノキ(楮)				
763	A	野又谷流域	スギ・ヒノキ植林	高木林 常針 植	林床衰退	少数	概ね食害	食痕多数	
		不:イボタノキ			バリバリノキ、タイミンタチバナ混生。				
764	A	大和谷	アカガシ、アラカシ、カゴノキ	高木林 常広 二	個体に食害	なし		本来なし	
		不:イボタノキ、オオバノイモトソウ、ベニバナボロギク、ナチシダ、オニヒカゲワラビ、シキミ、イワタバコ、マツカゼソウ、ヒカゲノカズラ、ユズリハ、ソウコウノ、ケヤキ、ガクウツギ、ムラサキシキブ、リュウブ、ウツギ、ニギイチゴ、イボタノキ							
766	A	大内山川	スギ林	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		食痕少数	本来なし
		不:モロコシ			構造変化しつつあり、陽光地での食害顕著。わずかな食痕を確認(香気などの食痕は少ない)。				
768	A	網掛山	低木林 常広 二	林内構造変化	なし	概ね食害	食痕多数	食痕多数	
		不:アラカシ			優占種:アラカシ、イロハモミジ、ヒメヤシラ、カゴノキ、コナラ				
769	A	村山川左又流域	アラカシコジイ林	高木林 常広 二	個体に食害	少数	スギ、ヒノキ(楮林)	食痕少数	本来なし
		不:ナチシダ、ダンドボロギク			優占種:アラカシ、コジイ、リンボク、クリなど				
770	A	東宮川左又流域	アラカシウバメガシ林	高木林 常広 二	個体に食害	少数	スギ、ヒノキ(楮林)	食痕多数	本来なし
		不:ハスノハカズラ、ナチシダ、イワヒメワラビ、ダンドボロギク			優占種:アラカシ、ウバメガシ、クリ、カゴノキ、タイミンタチバナ、ヤブツバキなど				
771	A	進行瀨〜塩ヶ浜	照葉樹林	高木林 常広 二	林床裸地	少数	ハマナツメ	食害枯死・消失	本来なし
		不:ハマゴウ、ヒオウギ、アブラギリ、ダンドボロギク、レモンエゴマ			林床植生はほぼ壊滅。樹皮剥ぎ:若干の低木で確認。				
772	A	塩瀬浜	ハマナツメ(海跡湖周辺)	低木林 夏広 自	個体に食害	多数	ハマナツメ	食痕多数	本来なし
		不:チョウジソウ、レモンエゴマ、ノウルシ、ハスノハカズラ、ダンドボロギク、タケノグサ			この海跡湖周辺には350株ほどのハマナツメが生育しているが、そのほとんどの株の若い萌芽幹の先端が採食され、樹皮を剥かれた株も多い。				
774	A	押瀬	放棄水田群落	草原 二	林床衰退	なし		不明	本来なし
		不:ハンゲショウ、キイチゴ属			スギ植林と放棄水田。オープン環境で食害が顕著。				
775	A	大台ヶ原	ウラジロモミ、ツガ、フナ、ミズナラ	高木林 混交 自	林床裸地	少数枯死		食害枯死・消失	食害枯死・消失
		不:マツカゼソウ、アセビ							
776	A	大台ヶ原	フナ、ウラジロモミ	高木林 混交 自	林床衰退	多数、少数枯死	下記	食害枯死・消失	食害枯死・消失
		不:ミヤマシキミ、コバノシカガマ、イワヒメワラビ、トモエソウ			樹皮剥ぎ:トウヒ(跡が古い)、ウラジロモミ(跡が古い)、サラサドウダン、リュウブ、ミヤコザサは再茎が低くなっている。スズタケは枯死あるいは結実前のもが目立つ。樹皮が剥かれたように何も見えないブナも観察された。大台ヶ原の三重丸山頂上付近で2008年まで数年間、調査時調査を三重自然誌の会で実施したことがある(2259千分の1地形図)。大台ヶ原山頂上、大形峠左下、上下、河合右上)。調査当時すでにシカ食害がひどく、かつて見られた林床の植物も見ることができない状況であった。とくに西谷間では、1994年頃にはスズタケが優占していたブナ林も2000年頃にはスズタケの枯死により、見通しがよくなくなってしまった。またアオナギ林にはアオナギがよく見られたが、現存は全く見ることができなくなった。それに対し、現在ミヤマシキミ、イワヒメワラビ、コバノシカガマが増加し、種組成の単純化が進んでいる。				
777	A	諏訪池(海跡湖)	湖畔の湿地	草原 自	個体に食害	少数	イボタノキ	食害枯死・消失	本来なし
		不:ハスノハカズラ、アケボノソウ、ヤナギタデ、チョウジソウ			この湿地にはツツシナルコ、クロハライ、サンカウイ、カンガレイ、ヒメガマ、ハンゲショウ等が生育していたが、今回の調査では確認できず、ヤナギタデやチョウジソウが増加していた。				
	B	海岸低木林	低木林 混交 二	林内構造変化	なし		食痕多数	本来なし	
		不:ヒオウギ、マンリョウ、ハマゴウ 嗜:イボタノキ			以前この低木林内には、トバラが生育していた記憶があるが、今回確認できなかった。イボタノキが多く生えているところでは、ティアラインが形成されている。				
	C	アラカシ、コナラ	低木林 混交 二	個体に食害	少数	コバンモチ、ナワシロギミ	食痕なし	本来なし	
					ヒメユズリハには角研ぎをした形跡があった。この二次林の林床はウラジロで覆われているところが多い。				
778	A	天神山	低木林 常広 二	林内構造変化	なし		食痕多数	本来なし	
		不:ハスノハカズラ、ナチシダ			優占種:アラカシ、コジイ、カゴノキ、シロダモ、タイミンタチバナ、ヒサカキ、ウバメガシ				
779	A	芦浜池	ハマナツメ群落	低木林 夏広 自	個体に食害	多数枯死	ハマナツメ	食害枯死・消失	本来なし
		不:ハスノハカズラ、イワヒメワラビ、マツカゼソウ、チョウジソウ、ノウルシ			芦浜池周辺には900株ほどのハマナツメが生育し、その前面にはヒトモトススキの群生が見られた。しかし2009年の調査では、ハマナツメの樹皮が剥かれ、萌芽幹や若芽が喰死・枯死あるいは枯死前前のハマナツメの激減が認められた。またヒトモトススキも葉が食べられ枯死や若芽消失したものが激増している。				
780	A	寺倉浦	アイアシ、シオクク、ハマサジ等塩湿地と背後の低木林	草原 自	個体に食害	多数	下記	概ね食害	本来なし
		不:イワタゲギキ、ノウルシ、チョウジソウ、ハンカイソウ、イヨカズラ、ホウロクイチゴ			樹皮剥ぎ:ハマゴウ、ハマナツメ、ネズミモチ、イボタノキ、寺倉浦のいくつかの入り口にはハマサジ、シオクク、ナガミノニシメ等が顕著な塩湿地植生が発達。その背後にはコシ、アイアシ、ヒトモトススキ等の群落が見られ、ハマゴウやハマナツメ、シオクク等の海岸性の低木類も数見できるといった植生が成立していた。今回の調査によりナガミノニシメやハマサジ、ヒトモトススキ、アイアシ、ヨシ等が激減し、ハマナツメやハマゴウも幹の樹皮が剥かれ若い株が採食されていることが確認された。				
781	A	大台ヶ原ノコシ楮		高木林 混交 自	林床裸地	少数枯死		食害枯死・消失	食害枯死・消失
		不:マツカゼソウ、アセビ 嗜:ヤマツツジ、イヌツゲ			優占種:ウラジロモミ、ハリネミ、オオイタヤメイゲツ、コメツガ、ミズナラ、フナ。コシシヨドリでは、ヤマツツジ、イヌツツジに食害が目立ちつつある。周辺は裸地、表土流出。				
782	A	天狗倉山	ヒノキ	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし
		不:ネズミモチ			この登山道周辺はほとんどヒノキ人工林で、今のところヒノキへの食害は認められない。しかし中腹部のヒノキ林では林内に生育するネズミモチやコバンモチにはシカと思われる食痕が認められた。				
783	A	八重垣神社	スダジイ、タイミンタチバナ	高木林 常広 自	個体に食害	少数	ミサオノキに集中	食痕少数	本来なし
784	A	鈴島	シイ林(スダジイ、コジイ)	高木林 常広 自	林床衰退	多数	ヒノキ、ハマナツメ、ハゼノキ	概ね食害	本来なし
		不:サカキカズラ、ヤママイ、マンリョウ、ハスノハカズラ、ダンドボロギク、ベニシダ、ウラジロ、ソウダ。 嗜:ハマナツメ、ハナミョウガ、クコ、ナウシロイチゴ、カサカサ			主要種:スダジイ、コジイ、アラカシ、ウバメガシ、ヒメユズリハ、タイミンタチバナ、トバラ、シャリノイ(他)。(ヒノキの樹皮剥ぎ) 楯林部分、面的にはわずか。				
785	A	須賀利町大池	照葉樹林	高木林 常広 自	林床裸地	多数、多数枯死	ハマナツメ	食害枯死・消失	本来なし
		不:ハスノハカズラ、チョウジソウ、オモト			林床植生は壊滅。論文(藤井伸二 2009 植生情報 13: 87)				
786	A	鳥勝浦	照葉樹林	高木林 常広 自	林床衰退	多数	ビロードムラサキ	食痕多数	本来なし
					特定の植物に食害が集中。				
787	A	鳥勝浦	コジイ林	高木林 常広 自	林床衰退	少数	ビロードムラサキ	食痕多数	本来なし
		不:ヤママイ、イズセンリョウ			ビロードムラサキは枯れたものも認められる。他にリュウビンタイへの食害も目立つ。				
	B	ハマナツメ群落	低木林 夏広 自	個体に食害	少数	ハマナツメ	食痕多数	本来なし	
		不:チョウジソウ 嗜:フサスゲ、トダスゲ、コヤブラン			ハマナツメ群落は、船越池の周辺に約1ヘクタールほどの広さで成立しその林床には上記のスゲ類やチョウジソウが多く見られる。10年前までは林床のスゲ類が採食される程度であったが、ここ数年前からハマナツメの樹皮が剥かされたり、新芽や萌芽幹が食べられたりするようになった。				
788	A	鈴島	塩湿地植物群落(海跡湖周辺)	草原 自				食害枯死・消失	
		嗜:シハナ			島内に2つ見られる小さな海跡湖のうち、南側の池周辺にシハナの群落が見られたが、2008年に島に渡ったシカの食害により、消滅。当時はシオクの群落も存在していたが、今回の調査でこの群落も消滅寸前であることが判明。2000年当時のシハナの植生調査資料と、食後の資料あり。				
	B	スダジイ群落	高木林 常広 二	個体に食害	少数	下記	食痕多数		
		不:ハマナツメ群落			樹皮剥ぎ:コバンモチ、ホルトノキ、ヒメユズリハ、アラカシ				
	C	ハマナツメ群落	低木林 夏広 自	個体に食害	少数	下記	食痕多数		
		嗜:イヌビロ、ナワシロギミ、トバラ、不:ハスノハカズラ、ヒオウギ、サカキカズラ、マンリョウ			樹皮剥ぎ:ハマナツメ、イヌビロ、ナワシロギミ。島の北側に見られる海跡湖周辺にはハマナツメ群落が発達している。このハマナツメも萌芽幹や新芽が採食されている。今回の調査では樹皮が剥かれている個体もみられた。また海岸部にはトバラ、ネズミモチ等が優占する低木林が発達しているが、島に渡ったシカ(2頭?)により樹皮剥きの被害により、大部分の低木が枯死している。				
789	A	大白池	ハマナツメ	低木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし
		不:ハスノハカズラ、ツツブキ			今のところハマナツメの樹皮剥ぎは認められないが、萌芽幹がいくつか食べられた。				
790	A	大池	タフ、シロダモ	高木林 常広 二	林床裸地	多数	下記	食害枯死・消失	本来なし
		不:ハスノハカズラ、オモト、バリバリノキ、ナチシダ、マンリョウ、イズセンリョウ、ヤママイ			樹皮剥ぎ:ネズミモチ、ハリネミ、ヤブツバキ。本群落は砂浜に続く陸地に成立しているが、かつては低木類も繁り、見通しがよくなった。しかし2000年以降になってからと思われるが、ティアラインが顕著になり、見通しがよくなっている。				
	B	ハマナツメ群落	低木林 夏広 自	林床裸地	多数枯死	ハマナツメ	食害枯死・消失		
		不:チョウジソウ			海跡湖である大池の湖際には、2004年頃まで1000株を越えるハマナツメが生育し、大きな群落を形成していた。また群落の林床にはツクシタルコ、チョウジソウやヒゲシナシ等が多くみられ、湖際にはハマナツメ群落に併せてヒトモトススキ群落も発達していた。しかし2000年頃からシカの食害が顕著になり、ヒトモトススキが消失、2007年にはチョウジソウ以外の林床植物がすべて消失し、ハマナツメも500株弱に半減してしまい絶滅の危機に瀕している。				

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
C		海岸植物 不:ハマゴウ、ヒオウギ	草原 自	林内構造変化	多数	トベラ、ナワシログミ	概ね食害		
792 A	九木神社	スタジイ、タイミンタチバナ 不:センリョウ、バリバリノキ、イワヒメワラビ、ダンドボロギク、ハスノハズラ、ヒメユズリハ、クスノキ、ミヤマノキギリシダ、ミズバヒ	高木林 常広 自	個体に食害	多数	下記	食痕多数	本来なし	
				樹皮剥ぎ:ミサオノキ、モチノキ、コバンモチ、タブノキ、カクレミノ。九木神社の樹叢は国の天然記念物に指定され、その林床にはクサマルハチやリュウゼン草などのシダ植物や生育し、低木層にはミサオノキなどの競争性の低木類も見られる。2、3年前から1年前後あったクサマルハチの葉身が薄く、ミサオノキの大部分が樹皮を剥離されるようになった。クサマルハチには今のところ芽がみられるが、危険な状況である。クサマルハチまでシカが葉食するのかわからないが、周囲の環境は変わっていないので、消失しつつある原因はシカと推察される。					
793 A	飛鳥町佐渡	棚田土手	草原 二	林内構造変化	なし		食痕多数	本来なし	
				矮性化している。					
794 A	橋ヶ崎	ススキ、ヒトモトススキ	草原 自	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	
				本群落は、海に面した坪の台地上に成立している。ここには岩壁にハマハラシノブやキノコニシオギク、アゼトナ等が生育し、所々にススキとヒトモトススキが混生した小群落が発達している。今回の踏査でハマハラシノブが激減していることが明らかになった。他にススキ、テリノイバラ、ツルボ、ナワシログミなどがシカによく食べられていた。					
B		スタジイ-タイミンタチバナ 不:ヤマアイ、ハスノハズラ、イズセンリョウ、モロコシソウ	高木林 常広 自	林床衰退	なし		食痕多数	本来なし	
				本群落は遊歩道沿いの海岸側に成立しているが、以前は谷筋の林床にはコクモウジャク、シロヤマシダが群生していた。しかし今回の踏査では全く見当たらなかった。それに対して、モロコシソウが増加していた。またカギカズラもところどころで食べられていた。					
C			草原 自	個体に食害			食痕多数	本来なし	
795 A	室古神社	ススキ 不:ハスノハズラ	草原 二	個体に食害			概ね食害	本来なし	
				以前はススキやヤマオコギリ類が繁茂した草地であったが、現在は荒地状に荒廃している。シカの糞も見られる。また近くには直径30cmほどのウバメガシが生育し、その根元から萌芽幹が多数出ているがすべて先端が消失している。おそろしくシカに採食されたものと思われる。					
B		スタジイ 不:センリョウ、イズセンリョウ、アリドオシ、ヤマビロ	高木林 常広 自	林床衰退	なし		食害枯死・消失	本来なし	
				以前林床にはシダ植物が多く見られた記憶があるが、今回の踏査では林床の植物が非常に少なくなっていた。					
C		ヒノキ人工林 不:センリョウ、イズセンリョウ、アリドオシ、ヤマビロ、シタキソウ	高木林 常針 植	林床衰退	なし		概ね食害	本来なし	
				当ヒノキ林は上記のスタジイ林に隣接している。ここにはマルバオウゴンシダやカタシロシダ、ヒカゲアマツササ等貴重なシダが見られたが、今回の踏査ではヒカゲアマツササは採食を免れて(不嗜好?)いたが、他のシダ植物の多くは採食されたものと推察された。また林床も一部腐植化し、表土の流出も一部ではあるが認められた。					
797 A	高チラ山	ヒノキ・スズ人工林 嗜:ガクウツギ、リュウブ、ヤマツツジ、イヌツゲ、コガクウツギ	高木林 常針 植	個体に食害	少数	ヒノキ	食痕多数	本来なし	
				ウバメガシ林					
B		ウバメガシ林 嗜:ガクウツギ、リュウブ、ヤマツツジ、イヌツゲ、コガクウツギ	低木林 常広 二	個体に食害	少数	リュウブ	食痕多数	本来なし	
798 A	北檜杖	コシイ 嗜:カワゼンゴ、スゲ類、クチナシ、ネザサ	高木林 常広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	ネザサ
799 A	奥川並川	冷温帯落葉広葉樹林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
800 A	湖北町	ヤナギ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
801 A	朽木	コナラ林 不:アセビ、コバノイシカガマ、イワヒメワラビ	高木林 夏広 二	林内構造変化	少数	下記	概ね食害	食痕多数	ネザサ、スタケ(少)
				(優占種)コナラ、アカマツ、ホオノキ、ヤマザクラ。樹皮剥ぎ:リュウブ、ソヨゴ、ノリウツギ。コナラの枯死木、衰弱木が多い(ツル枯れ)。アカマツの新枯死も多い。林床の相当部分にはアセビが優占。スタケは食害でほとんど枯死。					
802 A	安曇川デルタ	ヤナギ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
803 A	甲頭倉〜雲仙入谷	スギ・ヒノキ植林	高木林 常針 植	個体に食害	多数、多数枯死	スギ、ヒノキ	食痕多数	食痕多数	
				スギ、ヒノキの樹皮剥ぎが多く、ササも良く食べられている。石灰岩地帯で岩の周りは草本がよく残る。					
804 A	比良山	ススキ群落 不:アカマツ 嗜:タニウツギ	草原 二				食痕多数	食痕多数	イヌクワガワサ
				1、2年前より群落高低下、植被率低下。					
B		タニウツギ群落	低木林 夏広 二	林床衰退	多数	タニウツギ	食痕多数	食害枯死・消失	イヌクワガワサ
805 A	御池岳	ケヤキ・サザクラ 不:スゲの一種	低木林 夏広 二	林内構造変化	なし		概ね食害		
				スゲの一種(ニシノホンモンシズゲ?)以外はかなり小型化している。表土の流出が発生している。					
B		ミズナラ・オオイトヤメイゲツ	高木林 夏広 二	林床衰退	なし		食害枯死・消失	本来なし	
				低木類・草本類のほとんどが消失。					
C		オオイトヤメイゲツ 不:ニリンソウ、コバイケイソウ	低木林 夏広 二	林内構造変化	なし		食痕少数	本来なし	
				林床はコバイケイソウ群落が成立。草本の他種はわずかにみられるのみ。					
806 A	御池岳	オオイトヤメイゲツ 不:バイケイソウ	低木林 夏広 二	林内構造変化	なし		概ね食害	食害枯死・消失	
				スズタケ					
B		スズタケ 不:イワヒメワラビ	草原	林内構造変化			食害枯死・消失	食害枯死・消失	
807 A	御池岳	ササ、コケ 不:カワキチン	草原 夏広 自	個体に食害			食痕少数	食痕少数	
				樹皮剥ぎについては未確認。					
808 A	マイアミ浜	ハタガヤ群落	草原 二	なし			食痕なし	本来なし	
809 A	大萩	ミズキ・アカメガシワ林(ミズキ) 嗜:ミズキ、スゲの一種(カンスゲ?)、ネザサ	高木林 夏広 二	林床裸地	多数	ミズキ	概ね食害	食害枯死・消失	ネザサ
				深い谷で表土流出が著しい。樹皮剥ぎは何度も繰り返され採食されている。					
B		コナラ林(コナラ)	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	リュウブ	食痕少数	本来なし	
				車道の傍で急斜面のため採食地としてあまり利用されていないようだ。裏や獣道がみられる。					
810 A	紅葉尾	コナラ林(コナラ) 不:アセビ	高木林 夏広 二	林内構造変化	少数	リュウブ	概ね食害	本来なし	
				カシノナガキクイムシの穿孔がコナラにみられる。林内の低木類はアセビが主。					
B		コナラ林 ホオノキ・アカシデ(コナラ) 不:シキミ、アセビ	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	リュウブ	概ね食害	食害枯死・消失	スズタケ
				林床の低木類はシカの嗜好性の種で構成。カシノナガキクイムシの穿孔が複数のコナラに有。					
C		コナラ林 ヤマザクラ・アカシデ(コナラ) 不:アセビ、イワカガミ	高木林 夏広 二	林床裸地	少数	リュウブ	食害枯死・消失	本来なし	
				かつて新成林であったようで、立木密度は低い状態にされている。ヒサカキ等はわずかに残るのみ(消失著しい)。					
811 A	西明寺	コナラ・ヤマザクラ(コナラ) 不:シキミ	高木林 夏広 二	林内構造変化	少数	ヤブツバキ、リュウブ	食害枯死・消失	本来なし	
				ヤブツバキとシキミ以外の低木類は消失している。					
B		コナラ・ヤマザクラ(コナラ) 不:ヤブツバキ(葉)	高木林 夏広 二	林床裸地	少数	ヤブツバキ	食害枯死・消失	本来なし	
				ヤブツバキを除いて低木類は消失。林道沿いの急傾斜地のため土壌流失が発生している。					
812 A	熊野	コナラ・アカマツ(コナラ) 不:シキミ	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	スタジイ	食害枯死・消失	本来なし	
				低木層はヤブツバキ優占。ヤブツバキに樹皮剥ぎはみられない。					
B		ウリハダカエデ(ウリハダカエデ・クマノミズキ) 嗜:ヤブムラサキ	高木林 夏広 二	林床裸地	少数	下記	概ね食害	本来なし	
				樹皮剥ぎ:カラスザンショウ、アカメガシワ、イヌシデ					
C		コナラ・イヌシデ(コナラ、ヤマザクラ) 嗜:ムラサキシキブ	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	イヌツゲ	概ね食害	本来なし	
				シカ5頭を目標。					
813 A	紅葉尾	アカガシ・ウラジロガシ林(アカガシ) 不:アセビ、ソヨゴ 嗜:ヒサカキ	高木林 常広 二	個体に食害	なし		概ね食害	本来なし	
				林内の低木・草本層に落葉広葉樹は存在しない。消失した可能性あり。					
B		ミズナライヌシデ林(ミズナラ) 不:シキミ	高木林 夏広 二	林床衰退	なし		食害枯死・消失	本来なし	
				林内の低木層・草本層には落葉広葉樹は存在しない。消失したと思われる。					

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
C		アカマツ・コナラ林(コナラ) 不:アセビ	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
815 A	鎌掛(かいがけ)	コナラ・アカノツメ 嗜:ヒサカキ、エゴノキ	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	ミヤコザサ
816 A	石山外畑町	コナラ群落 嗜:リョウブ	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	リョウブ	食痕なし	食痕なし	ネザサ
817 A	丹後上世屋内山	ブナ・チシマザサ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
818 A	五波峠	コナラ林 不:コバノイシカグマ(一部)	高木林 夏広 二	林床裸地	少数	リョウブ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	不明
819 A	三園峠	ブナ林 不:アセビ、エゾユズリハ、コバノイシカグマ、ヒサカキ、オオイワカガミ	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	リョウブ、コハウチワカエデ	概ね食害	本来なし	
B		ブナ林 不:コバノイシカグマ	高木林 夏広 自	林床裸地	少数	コハウチワカエデ、リョウブ	食害枯死・消失	本来なし	下記
C		サワグルミ林(サワグルミ、トチノキ、ブナ) 不:コバノイシカグマ、トリカブトsp.、オオバアサガラ。疎開地ではイワヒメワラビ(大群生)、ダンドロロギク	高木林 夏広 自	林床裸地	少数	ミズキ	食害枯死・消失	本来なし	
820 A	桑谷山西方	スギ林 不:オオバアサガラ、イワヒメワラビ、コバノイシカグマ、マツカゼソウ	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		概ね食害	本来なし	
821 A	花背	ミズナラ林 不:アセビ	高木林 夏広 二	林床衰退	多数、少数枯死	リョウブ、シラキ	食害枯死・消失	本来なし	
B		スギ林 不:イワヒメワラビ、ベニバナロギク、ナキリスゲ(いずれも林縁)	高木林 常針 植	林床衰退	少数	スギ(根張りの部分)	食害枯死・消失	食害枯死・消失	不明(古い枯れ跡のみ)
822 A	貴船山西方	スギ林 不:オオバノイノモトソウ、オオバノハチジョウシダ、ダンドロロギク、マツカゼソウ、イワヒメワラビ、ナキリスゲ、エゴノキ(いずれも林縁)	高木林 常針 植	林床衰退	少数	下記	食害枯死・消失	食痕多数	スズクエ(下記)
823 A	大峰山	先駆低木林(エゴノキ、ウツギ、タラノキ等) 不:イワヒメワラビ、オオバノイノモトソウ 嗜:アズマヤマザサ	低木林 夏広 二	個体に食害	少数	エゴノキ	食痕多数	本来なし	
B		コナラ群落(コナラ)	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	リョウブ、ホオノキ	食痕なし	本来なし	
824 A	天ヶ瀬ダム	スギ植林(スギ) 不:エゴノキ、マツカゼソウ、ミカエリソウ、オオバノハチジョウシダ。嗜:アズマヤマザサ	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		食痕少数	本来なし	
826 A	箕面渓谷	ケヤキ・イロハモジ群集 不:イズスセリョウ、ベニシダ、オオバノイノモトソウ、イワヒメワラビ、嗜:ウツギ、コアカソ	高木林 混交 自	林床衰退	なし		概ね食害	食痕なし	
B		コジイ・カナメモチ群集 嗜:ネズミモチ、コアカソ	高木林 常広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
830 A	信太山丘陵大野池	アカマツ・コナラ林	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ
831 A	倉見	アベマキ・コナラ群集(コナラ) 不:コバノイシカグマ、イワヒメワラビ、マツカゼソウ	高木林 夏広 二	森林、低木、草原が混在。			食痕多数	食痕多数	チマキザサ、ネザサ
832 A	新屋	ススキ群落	草原 二	個体に食害	なし		食痕少数		
833 A	鉢伏高原大平頭	ススキ・ホクテアザミ群集	草原 二	なし	なし		食痕なし	食痕少数	チマキザサ
B		ブナ・クモジ群集 不:シラネワラビ、シノブカグマ、嗜:イヌツゲ、リョウブ、タンナサワフタギ、クモジ、ヤマソソ、コムネカエデ、スギ(自生)	高木林 夏広 自	個体に食害	少数	スギ(自生)	食痕少数	食痕少数	チシマザサ
835 A	奥海(オネミ)	不:ダンドロロギク、ミツマタ、イワヒメワラビ							
836 A	砥峰高原	ススキ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ?
837 A	鶴居	アベマキ・コナラ群集(コナラ) 不:イワヒメワラビ、マツカゼソウ	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	ソヨゴ、リョウブ、イヌツゲ	食痕少数	食痕少数	
838 A	仁位	アベマキ・コナラ(コナラ)	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕なし	本来なし	
839 A	奥小屋	コナラ群落 林床にはほとんど下草が認められないため、不明。	高木林 夏広 二	林床裸地	なし		食痕なし	食痕なし	
B		スギ・ヒノキ植林 林床にはほとんど下草が認められないため、不明。	高木林 常針 植	林床裸地	なし		食痕なし	食痕なし	
840 A	亀山	コナラ・アベマキ群集 不:アセビ、イワヒメワラビ	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	リョウブ	概ね食害	本来なし	
B		カナメモチ・コジイ群集	高木林 常広 自	林床衰退	なし		食痕なし	本来なし	
841 A	黒川(妙見山麓)	クスギ群落 嗜:クスギ(萌芽)	低木林 夏広 二	林内構造変化	なし		食痕多数	食痕なし	ネザサ
842 A	西宮市甲山	コナラ群落	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ節
843 A	六甲山	ネザサ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	ネザサ
B		コナラ・アベマキ群集	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	ネザサ、ミヤコザサ
C		アカマツ・モチツツジ群集	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	ミヤコザサ
844 A	先山	スダジイ群落	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
845 A	広田	スダジイ群落 嗜:フジ、ヒサカキ、モッコク、ネズミモチ	高木林 常広 二	林床衰退	少数	モチノキ	概ね食害	食痕少数	
846 A	社家地区	ヒメユズリハ・ウバメガシ群落 不:ヤブツバキ。嗜:コウヤボウキ、モッコク、ネズミモチ	高木林 常広 二	林床衰退	多数	ヒメユズリハ	食害枯死・消失	食痕少数	ネザサ

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食害・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
847 A	八木地区成相池	スギ植林 不:シキミ、シロダモ、ハスノハカズラ、テイカカズラ、ツツキ、イブセンリョウ	高木林 常針 植	林床衰退	多数	スギ	概ね食害	本来なし	
848 A	由良	嗜:ヒサカキ、ソヨゴ、サルトリイバラ	高木林 常広 二	林床衰退	少数	モチノキ、カクレミノ	食痕多数	本来なし	
849 A	稲田新池	スギ植林、その林縁 不:イワヒメウラビ、ジャケツイバラには食痕なし	高木林 常針 植	林床衰退	なし		概ね食害	食痕少数	ネザサ
850 A	諭鶴羽山	ヤブツツキ群落 不:シロダモ、シキミ、テンナンショウsp.、オモト、嗜:ヒサカキ、ウリハダカエデ	高木林 常広 二	林床衰退	なし		概ね食害	本来なし	
851 A	諭鶴羽山	ヤブツツキ群落 不:シキミ、シダ、嗜:ヒサカキ、ヤブツツキ、ネズミモチ	高木林 混交 二	林床衰退	少数	ヤブツツキ、ネズミモチ	概ね食害	本来なし	
852 A	諭鶴羽山	ウバメガシ群落 不:アオツツラジ、シキミ、イブセンリョウ、オモト、イワヒメウラビ、ナルトサワギク	低木林 常広 二	林床衰退	なし		食害枯死・消失	本来なし	
853 A	春日山原始林	カナメモチコジ群集ほか 不:シキミ、アセビ、イヌガシ、ナギ、ナンキンハゼなど。嗜:アオキ(採食され、頻度は少ない)、クロガネモチ、ソヨゴ、ヤブツツキなど	高木林 常広 自	林床衰退	多数、少数枯死	下記	食害枯死・消失	本来なし	
854 A	奈良公園	シバ草地 不:レモンエゴマ、ナンキンハゼ。嗜:最近ではイブセンリョウへの採食が著しく、消失した群落もある。	草原 植		多数、少数枯死	下記	概ね食害		
856 A	大和葛城山	ブナアサシデ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
857 A	大台ヶ原	ヒノキ群落 不:ツルシキミ	高木林 常針 自	林床衰退	少数枯死	オオカメノキ、ウラジロモミ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
858 A	大台ヶ原	ブナウラジロモミ群落 不:ミヤマシキミ、バイケイソウ、カワチブシ、ヤマシキヤク、コバノイシガマ、嗜:キク科草本、スゲ属	高木林 混交 自	林内構造変化	多数、少数枯死	下記	食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ、ミヤコザサ
B	トウヒ群落	不:カワチブシ、ミヤマシキ 嗜:キク科草本	高木林 常針 自	林内構造変化	多数、少数枯死	下記	食痕多数	食痕多数	ミヤコザサ
C	ミヤコザサ群落	嗜:ミヤコザサ(形態は変化するが衰退しない)	草原 自	林内構造変化			食痕多数	食痕多数	ミヤコザサ
859 A	大台ヶ原	トウヒ林 不:バイケイソウ	高木林 常針 自	林床衰退	多数枯死	下記	食害枯死・消失	食痕多数	ミヤコザサ
860 A	西原	ケヤキ群落(ケヤキ)	高木林 夏広 自	林床衰退	多数	ケヤキ、ホオノキ、リョウブ等	概ね食害	本来なし	
861 A	釈迦ヶ岳	ブナ林、ブナウラジロモミ林 不:ワラビ、ヒメワラビ属sp.、クサギ	高木林 夏広 自	林内構造変化	なし	下記	概ね食害	食痕多数	ミヤコザサ?、スズタケ
B	トウヒ林	不:クケ(群類)	高木林 常針 自	林床衰退	多数	トウヒ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	
C	ツツギ		高木林 常針 自	林床衰退	多数	トウヒ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	
862 A	沖ノ島	スダジイ林 不:ホソバカナワラビ、ベニバナボロギク、ダンドボロギク	高木林 常広 自	林床衰退	多数		食痕少数		
863 A	熊神岳	アカシデイヌシデ群落	低木林 夏広 自	林内構造変化			食痕少数	食痕多数	
865 A	玉置口	コジニ次林 嗜:ヒメユズリハ	高木林 常広 二	個体に食害	少数	下記	食痕少数	本来なし	
B	スギ・ヒノキ植林	不:イブセンリョウ。嗜:オシダ科のシダ類	高木林 常針 植	樹皮剥ぎ	なし	なし	食痕少数	本来なし	
C	ウバメガシ群落		常広 二		なし	なし	食痕なし	本来なし	
866 A	大塔山	ブナシラキ群集	高木林 夏広 自	林内構造変化			食痕多数	食痕少数	
867 A	赤倉岳	ヒノキ林	高木林 常針 植	個体に食害	多数	ヒノキ	食痕多数		
868 A	小川	河辺林	高木林 夏広 自	林内構造変化	なし		食痕多数	本来なし	
869 A	熊瀬川	スギ林	高木林 常針 植	林床衰退	なし	なし	食痕なし	本来なし	
870 A	燈明崎	海岸性照葉樹林	高木林 常広 自	(食痕は) 注意を払わなかったので十分な確認ができていない。	なし	なし	食痕なし	本来なし	
871 A	相瀬	スギ林	高木林 常針 植	林床衰退	なし		食痕なし	本来なし	
872 A	田原	放棄水田群落(イネ科とカヤツリグサ科)	草原 二	林縁のマント群落は芝地化。(食痕は) 注意を払わなかったので十分な確認ができていない。	なし	なし	食痕なし	本来なし	
873 A	くじ野川	スギ林 不:マンリョウ	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		食害枯死・消失	本来なし	
874 A	紀伊大島	海岸性照葉樹林	高木林 常広 自	林床はマンリョウのみが生育。	なし	なし	食痕なし	本来なし	
878 A	宇倍神社裏山	シラカシ林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
880 A	竹田谷	ブナ・ミズナラ二次林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕少数	食痕なし	チシマザサ
881 A	三徳山	ヤブツツキクラス代償植生	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし		チシマザサ
882 A	水ノ山	ブナ林 嗜:イヌガヤ、カエデ類、クロモジ、サンカヨウ、ギンバイソウ、クロバチキオコシ、ツツメソウなどの食害目立つ	高木林 夏広 自	林内構造変化	少数	天然スギ	概ね食害	食痕少数	チシマザサ
883 A	若板鬼ヶ城	シカラシ・コナラ優占林 嗜:イボタノキを強く食害	高木林 混交 二	林床衰退	少数		概ね食害	食害枯死・消失	

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地 名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)					
884 A	くらます	落葉広葉樹二次林	高木林 夏広 二	林床衰退	少数		食害枯死・消失	本来なし	
885 A	大内	スギ・ヒノキ人工林	高木林 常針 植	個体に食害	少数	ヒノキ	食痕少数	本来なし	
886 A	窓山	スギ・ヒノキ人工林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
887 A	鬼林山	ヒノキ人工林新植地	低木林 夏針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
888 A	弥山山地西部	コナラ-アカマツ林 不:アブラギリ、シロダモ、ハスノハカズラ。嗜:タブノキ、アオキ、ネザサ	高木林 混交 二	林床衰退	少数、少数枯死	下記	食痕少数	食痕少数	ネザサ
889 A	三瓶山	クロモジ-ブナ群集 (ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		カラ・シデ二次林 (イヌシデ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		カラマツ植林	高木林 夏針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
890 A	赤名湿地	ハンノキ群落 (ハンノキ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		スギ-ヒノキ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		コナラ群落 (コナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
891 A	県民の森	スギ・ヒノキ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		クロモジ-ブナ群集 (ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
892 A	亀井谷	クロモジ-ブナ群集	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		サワグルミ林 (サワグルミ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
893 A	安蔵寺山	クロモジ-ブナ群集 (ブナ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		スギ・ヒノキ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
894 A	鈴ノ大谷川	カシ萌芽林 (シラカシ群落) (シラカシ)	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		スギ・ヒノキ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
895 A	白島崎展望台	海岸生照葉樹林	低木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
896 A	時張山		高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
897 A	颯燭岩展望台	海岸性落葉樹林	低木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
898 A	大満寺山	スギ-ヒノキ植林 (スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
899 A	鷲ヶ峰	スギ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
900 A	那久岬・油井ノ池	カシワ林	低木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		スギ林	高木林 常針 植	なし			食痕なし	食痕なし	
901 A	都万	海岸生照葉樹林	低木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
902 A	男池	照葉樹林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
903 A	蕨山	ススキ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
904 A	若杉峠	ブナ群落	高木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	チシマザサ、チマキザサ
905 A	西町		高木林 夏広 二	個体に食害	なし				チシマザサ
908 A	自然保護センター	水生植物群落 嗜:ミクリ、ヒシモドキ、カンガレイ	草原 植	個体に食害			食害枯死・消失	本来なし	
909 A	中庄	アカマツ スダジイ など	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
910 A	竜王山	アカマツ	高木林 常針 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
913 A	堂床山	アカマツ二次林 (アカマツ) 嗜:ススキ、トダシバ 不:イワヒメワラビ	高木林 常針 二	個体に食害	少数	リョウブ	食痕少数	食痕少数	ケネザサ
914 A	赤柴山	アカマツ二次林 (アカマツ) 嗜:ケネザサ、コバノミツバツツジ、ナガバノミジイチゴ、ヒサカキ、イヌツゲ	高木林 常針 二	個体に食害		リョウブ、エゴノキ	食痕多数	食痕多数	ケネザサ
915 A	白木町古屋・正地	スギ植林地とその林縁部 (スギ植林) 嗜:イヌツゲ、オオバノハチジョウシダ、カヤ、ウツギ、コバノミツバツツジ、ケネザサ、スゲsp. 不:アセビ、イワヒメワラビ、オオバノハチジョウシダ、シロダモ	高木林 常針 植	林床衰退		イヌツゲ	食痕多数	食痕多数	ケネザサ
B		アカメガシワ群落 (アカメガシワ) 不:オオバノハチジョウシダ、シロダモ。嗜:スギ(低木)、カヤ、林床にはスギの低木のみ	高木林 夏広 二	個体に食害	なし		概ね食害、食害枯死・消失		
916 A	あさひが丘	アカマツ二次林 (アカマツ) 嗜:ススキ 不:アセビ	高木林 常針 二	個体に食害	少数	リョウブ	食痕少数	食痕なし	
917 A	白木町大樋	アカマツ-コバノミツバツツジ林 (アカマツ) 不:イワヒメワラビ。嗜:リョウブ、ムラサキシキブ、コガクウツギ、ヒノキ(幼木)、サルトリイバラ、クロモジ、コバノミツバツツジ	高木林 常針 二	個体に食害	少数	下記	食痕少数	食痕少数	

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(復占種)	植生タイプ	群落全への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
918 A	安宿	アカマツ二次林(アカマツ) 不:シロダモ、アセビ。嗜:イヌツゲ、ススキ、トダシバ	高木林 常針 二	個体に食害	少数	リョウブ	食痕少数	食痕少数	ケネザサ
919 A	広島県緑化センター	コナラ二次林 不:ウラジロ、コシダ、イワヒメワラビ。嗜:ススキ、植栽ツツジ類、イヌツゲ	高木林 夏広 二	林床衰退	多数	下記	概ね食害		
920 A	三津	アカマツ二次林(アカマツ) 不:アセビ、ウラジロ。嗜:ススキ	高木林 常針 二	個体に食害	少数	リョウブ、ヤブツバキ	食痕少数	食痕少数	ケネザサ
921 A	松子山大池	アカマツ二次林(アカマツ) 不:アセビ、シロダモ。嗜:ススキ、トダシバ、ケネザサ	高木林 常針 二	個体に食害			食痕少数	食痕少数	ケネザサ
922 A	宮島	モミ・ミズバヤイ群集(モミ) 不:アセビ、イヌガシ、ミズバヤイ。嗜:モミ、リョウブ、サカキ、イロハモミジ(植栽)	高木林 常針 自	林床裸地	少数枯死	リョウブ、ヤブツバキ	食害枯死・消失	本来なし	
923 A	宮島	アカマツ・コバノミツバツジ林(アカマツ) 不:アセビ、ウラジロ、コシダ、イヌガシ。嗜:ススキ、リョウブ、サカキ、ヒサカキ	高木林 常針 二	林内構造変化	少数	リョウブ、ヤブツバキ	食痕多数	本来なし	
924 A	大崎上島	針葉樹植林(ヒノキ)	高木林 常針 植	なし	なし				
B		コナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし				
C		常緑広葉樹林(ネズミサシ、ヤマモモなど)	高木林 混交 二						
926 A	平わらび台入口	スギ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
927 A	船平山	スギ植林	高木林 常針 植	N 34. 41851° , E 131. 51577° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	本来なし
B		ススキ草地	草原 二	N 34. 42584° , E 131. 73750° (WGS 84)	なし			食痕なし	食痕なし
C		シバ草地	草原 二	N 34. 42621° , E 131. 73753° (WGS 84)	なし			食痕なし	本来なし
928 A	十種ヶ峰	落葉広葉樹中木林	低木林 夏広 二	N 34. 441532° , E 131. 68912° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	食痕なし
B		落葉広葉樹高木林	高木林 夏広 二	N 34. 44553° , E 131. 69324° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	食痕なし
C		ヒノキ植林	高木林 常針 植	N 34. 44580° , E 131. 69319° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	本来なし
D		ススキ草地	草原 二	N 34. 44639° , E 131. 69569° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	本来なし
E		スギ植林	高木林 常針 植	N 34. 44436° , E 131. 69718° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	食痕なし
930 A	徳佐りんご園周辺	アカマツ・コナラ混交林	高木林 混交 二	N 34. 36271° , E 131. 70023° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	食痕なし
B		アカマツ中木林	低木林 常針 二	N 34. 38684° , E 131. 73367° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	本来なし
931 A	船方総合農場	人工草地	草原 植	N 34. 39428° , E 131. 70355° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	本来なし
B		アカマツ高木林	高木林 常針 二	N 34. 39568° , E 131. 70549° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	食痕なし
C		落葉広葉樹林	低木林 夏広 二	N 34. 39455° , E 131. 70531° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	食痕なし
932 A	綱提峠	スギ 不:ヒメユズリハ、ウラジロ(シダ)。嗜:ヒサカキ	高木林 常針 植	個体に食害	多数	スギ	食痕多数	本来なし	
B		コナラ、シラカシ、アカマツ、タブノキ 不:ユズリハ。嗜:ヒサカキ	高木林 常針 二	個体に食害	少数	ここには無し	食痕少数	本来なし	
C		ヤブニッケイ、ヤマザクラ、アラカシ、ヤブツバキ 不:イズセンリョウ。嗜:チャ、アオキ	高木林 常広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
933 A	坂根	不:ウラジロ(シダ)。嗜:ヒサカキ	高木林 混交 二	個体に食害	少数	スギ	食痕少数	本来なし	
B		不:シロダモ、ヤブツバキ。嗜:ネズミモチ、ヒサカキ	高木林 常広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
934 A	一位ヶ岳	スギ・ヒノキ植林 不:イズセンリョウ、ハイノキ、ユズリハ、シロダモ、ヒサカキ、ヤブニッケイ、サカキ、マンリョウ、マツカゼソウ、キジョラン、コバノカナワラビ、コバノイシカグマ、ナチシダ、オオハノイモトソウ。嗜:ヤマアジサイ、スゲsp.	高木林 常針 植	林内構造変化	少数	スギ、ヒノキ	食痕少数	本来なし	
B		スダジイ・コナラ群落 不:イズセンリョウ、マンリョウ、アセビ、ハイノキ、シロダモ	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	スギ	食害枯死・消失	本来なし	
C		ススキ群落 不:ススキ、スゲsp.。嗜:イヌツゲ、コバノガマズミ	草原 自	なし	なし		食痕少数	本来なし	
935 A	花尾山	スギ植林 不:ミツマタ、フイチゴ。嗜:アキチヨウジ、コアカソ、ヤマアジサイ、ヨシノアザミ、ヒカゲイノコツチ、クサギ、チャ、イワガネセンマイ、ホシダ、オニヒカゲアラビ	高木林 常針 植	なし	少数	スギ	食痕少数	本来なし	
B		ヒノキ植林 不:ヒサカキ、シロダモ、アラカシ、ヤブニッケイ、アセビ、フイチゴ。嗜:アオキ、イヌガヤ	高木林 常針 植	なし	多数	ヒノキ	食痕少数	本来なし	
936 A	桂木山	スギ植林 不:フイチゴ、ノコンギク、イヌコウジュ、ヤマアイ。嗜:コアカソ、アキチヨウジ、ヨシノアザミ	高木林 常針 植	なし	なし		食痕少数	本来なし	
B		スギ植林 不:フイチゴ、ヤブツバキ、ウリノキ、イワガネセンマイ、オオハノハチジョウシダ、イデ、リョウメンシダ。嗜:アオミズ、アキチヨウジ、アオキ	高木林 常針 植	なし	なし		食痕少数	本来なし	
937 A	明木	常緑広葉樹高木林	高木林 常広 二	N 34. 33949° , E 131. 41345° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	本来なし
938 A	救世道沿い	ヒノキ植林(中木)	低木林 常針 植	N 34. 30767° , E 131. 45529° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	本来なし
939 A	長者ヶ原	コナラ高木林	高木林 夏広 二	N 34. 26789° , E 131. 66487° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	食痕なし
B		クヌギ・コナラ高木林	高木林 夏広 二	N 34. 27464° , E 131. 66357° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	本来なし
C		スギ植林	高木林 常針 植	N 34. 27315° , E 131. 67114° (WGS 84)	なし	なし		食痕なし	本来なし

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
D	アラカシ高木林	高木林 常広 二	なし	なし			食痕なし	本来なし	
				N 34. 23972° . E 131. 67241° (WGS 84)					
940 A	平家ヶ岳	シラカシ林	高木林 常広 自	個体に食害	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ
941 A	狗留孫山	梅林園	低木林 夏広 植	林床裸地	なし		食痕多数	食痕多数	ヤダケ
不: キジョラン, コバノイシカグマ, イワヒメワラビ, ナチシダ, キジノオシダ, オオバノイノモトソウ。嗜: ヤダケ, サツキ, ツツジ類, ナフシログミ, イ, イノデ				サツキの補綴にディアラインあり。					
B	アカガシ群落	高木林 常広 自	林床衰退	なし			食痕なし	本来なし	
不: ヤブニッケイ, シキミ, アセビ, ハイノキ, シロダモ, コバノイシカグマ, シンガシラ				以前の植生は分らないが、70cm以下の草本及び低木層では不嗜好種のみだった為、林床衰退として推定した。					
C	ススキ群落	草原 自	なし	なし			食痕多数	本来なし	
不: アセビ, シキミ, ハイノキ。嗜: ヤブツバキ, イノデ, ウリハダカエデ				山頂部の草原周辺で、低木のヤブツバキへの食痕が多数あり、シカによる植生の影響はかなり進んでいると思われる。					
942 A	葦山		高木林 常広 二	個体に食害	少数	アオキ	食痕少数	本来なし	
不: イズセンリョウ 嗜: アオキ				優占種: タラウウ, タブノキ, アラカシ, ヒサカキ, ヤブニッケイ, カゴノキ					
B	スギ	高木林 常針 植	個体に食害	少数	スギ(角擦り)		食痕少数	本来なし	
不: イズセンリョウ 嗜: チャ, アオキ									
C		高木林 夏広 二	個体に食害	少数	ネズミモチ, カエデ		食痕少数	本来なし	
不: ユズリハ, アセビ 嗜: ヒサカキ				優占種: ネズミモチ, ユズリハ, コナラ, アセビ, ヤマザクラ, クロキ					
943 A	葦山	タブノキ・コナラ群落	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	ネズミモチ, タブノキ	食痕なし	本来なし	
不: ユズリハ, ハイノキ, ユズリハ, ヒサカキ, シロダモ, コバノイシカグマ, ウラジロ, シンガシラ				嗜好種を食べ尽くした為か食痕は確認できなかった。糞は多数である。					
B	アカガシ・ヤブツバキ群落	高木林 夏広 自	林床衰退	なし、少数			食痕少数	食痕多数	ヤダケ
不: シキミ, アセビ, ヤブニッケイ, シロダモ, ヒサカキ, マツカゼソウ, ウラジロ, シンガシラ, コバノイシカグマ, イワヒメワラビ, オオバノイノモトソウ。嗜: ヤダケ, ナイカカズラ				嗜好種のテイカカズラについては最近倒木した樹木に付いていたものである。					
944 A	雁飛山	スギ・ヒノキ植林	高木林 常針 植	林内構造変化	少数	スギ, ヒノキ	食痕多数	本来なし	
不: ユズリハ, ハイノキ, シロダモ, ヒサカキ, ミツツヤ, ヤマアヒ, フユイチゴ。嗜: アオキ, シンガシラ, イノデ, リョウメンシダ				リョウメンシダについては、各場所で見いださずには落葉を落していたので、食痕と言えるべきか判断が難しい。また、植林地にはササ等は生えていないが、登山口付近の林道沿いに生えていたケネザサ、ゴキダケ、ヒガンバナ、ノコンギク等への食痕は多数であった。					
B	ユズリハウリハダカエデ	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	ネズミモチ, シラキ	概ね食害	本来なし		
不: シロダモ, ユズリハ, ヒサカキ, シンガシラ, ウラジロ, ヤマアヒシダ。嗜: アオキ, ネズミモチ, ウリハダカエデ				林内の小木については殆ど枯死しており、アオキについてはディアラインがはっきりしていた。					
C	ツブラジイヒサカキ	高木林 常広 自	林床衰退	少数	カゴノキ		食痕少数	本来なし	
不: アセビ, ヤブニッケイ, ハイノキ, シロダモ, ヒサカキ, ウラジロ, シンガシラ, ヤマアヒシダ。嗜: アオキ, ネズミモチ, イヌツゲ				低木についてはディアラインがはっきりしている。					
946 A	岩永台	スギ・ヒノキ	高木林 混交 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
947 A	岩永台	ヒノキ植林	高木林 常針 植	なし	多数	ヒノキ	食痕なし	本来なし	ゴキダケ, ケネザサ
				林地内のヒノキの7割程度に皮剥ぎが認められるが、枯死するほどではない。					
948 A	秋吉台	トダシバススキ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ
B	ネザサススキ群落	草原 二	なし	なし			食痕なし	食痕なし	ネザサ
949 A	秋吉台(龍塚峰)	スギ植林	高木林 常針 植	なし	少数	スギ	食痕少数	食痕なし	ケネザサ, ゴキダケ
嗜: アオミズ, アキチヨウジ, ヒカゲイノコツチ, イヌビワ, アオキ									
950 A	吉敷佐畑	ヒノキ植林地	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				N 34. 16448° . E 131. 42123° (WGS 84)					
B	カシ・タブ二次林	高木林 常広 二	なし	なし			食痕なし	本来なし	
				N 34. 16364° . E 131. 41853° (WGS 84)					
951 A	瀬戸原	ヒノキ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ
				N 34. 21114° . E 131. 58676° (WGS 84)					
B	アカマツ低木林	低木林 常針 二	なし	なし			食痕なし	食痕なし	ネザサ
				N 34. 21174° . E 131. 58588° (WGS 84)					
C	コナラ中木林	低木林 夏広 二	なし	なし			食痕なし	食痕なし	ネザサ
				N 34. 21210° . E 131. 58563° (WGS 84)					
952 A	島地川ダム	コナラ群落(コナラ)	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
953 A	猿王岳	ツブラジイヒサカキ	高木林 常広 自	林内構造変化	少数	クロキ, ナナミノキ	食痕少数	本来なし	
不: アセビ, シロダモ, タブノキ, ウラジロ, コシダ。嗜: ヒサカキ, ナナミノキ, クロキ, スゲ科sp.									
B	ヒノキ植林	低木林 常針 植	個体に食害	少数	ヒノキ		食痕多数	本来なし	
不: アセビ, ウラジロ, コシダ。嗜: コバノミツバツツジ, ヒサカキ, ツブラジイ, アラカシ, ヤブムラサキ				植林地内はウラジロ, コシダで殆ど覆い尽くされている。					
C	スギ植林	高木林 常針 植	個体に食害	少数	スギ, アセビ		食痕多数	食痕少数	メダケ
不: タブノキ, マンリョウ, ウラジロ, コシダ, シンガシラ。嗜: ヒサカキ, コガクサギ, クロキ, ツブラジイ, ネズミモチ, イヌツゲ, ヤブムラサキ, メダケ, ハリス, コウガイゼキショウ, サンカクイ, スゲsp., イネ科sp.				シダについては不嗜好種に記録した以外の種にそれぞれ食痕が確認できたが、極わずかつだったので記載しなかった。また、アセビの皮剥ぎについては一株のみ確認した。					
954 A	桜山	スギ・ヒノキ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕少数	食痕なし	ゴキダケ
嗜: イヌビワ, チャ, ピロドイチゴ, ヒカゲイノコツチ, セイタカワダチソウ									
955 A	小野湖西岸	アラカシ林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				N 34. 09121° . E 131. 30289° (WGS 84)					
B	ヒノキ植林	高木林 常針 植	なし	なし			食痕なし	本来なし	
				N 34. 09338° . E 131. 30444° (WGS 84)					
957 A	芦谷地区	常緑広葉・落葉広葉樹混交林	低木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
				N 34. 14112° . E 131. 54059° (WGS 84)					
B	常緑広葉・落葉広葉樹混交林	高木林 混交 二	なし	なし			食痕なし	本来なし	
				N 34. 14046° . E 131. 54047° (WGS 84)					
C	常緑広葉樹林	高木林 常広 二	なし	なし			食痕なし	本来なし	
				N 34. 13956° . E 131. 53407° (WGS 84)					
958 A	和字(佐渡川河畔)	ジャヤナギ-アカメヤナギ群集(オオタチヤナギ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	マダケ林	高木林 植	なし	なし			食痕なし	食痕なし	ジョウボウザサ
959 A	二鹿	杉・ヒノキ	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	松、ナラ、クスギ、ヒサカキ、イヌツゲ、ミツバツツジ	低木林 混交 自	なし	なし			食痕なし	本来なし	
960 A	城山	タブ・シイ・ツバキ・アシビ・コバノミツバツツジ	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地 名	群落・群集名(復占種)	植生タイプ	群落全層への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
B		ヒノキ	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
961 A	霧降岳	コナラ・タブノキ混交林	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		ヒサカキ低木林	低木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
962 A	西浦	常緑広葉樹林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		エヒメヤアヤ自生地	草原 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
963 A	大平山	ヒノキ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		常緑広葉・落葉広葉樹混交林	低木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		常緑広葉・落葉広葉樹混交林	高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
964 A	草山	ヒノキ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		常緑広葉樹林	低木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		ヤマザクラ植林	高木林 夏広 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
D		常緑広葉樹高木林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
E		常緑広葉樹林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
965 A	串山	アカマツ・落葉広葉・常緑広葉樹混交林	低木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
966 A	高越山	スギ林	高木林 常針 植	林床裸地	なし		食害枯死・消失	本来なし?	
967 A	山城町赤谷	不ハシロドコロ、ユキモチソウ	高木林 常針 植	なし	なし		食痕少数	本来なし	
968 A	落合峠	ミヤマクマザサススキ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		ウラジロモミ林	高木林 常針 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		フナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	ミヤマクマザサ
969 A	剣山	ナンゴクミネカエデ・ダケカンバ群集	高木林 夏広 自	林床裸地	多数枯死	下記	食害枯死・消失	食痕多数	ミヤマクマザサ
B		シラビソ群集(シコクシラベ、ウラジロモミ(下部) 不・トゲアザミ、テンニンソウ、嗜・コメツツジ、ヨコウラクツツジ、シコクフクロ)	高木林 常針 自	林床衰退	多数枯死	下記	概ね食害	食痕多数	ミヤマクマザサ
C		山頂のミヤマクマザサ群落(ミヤマクマザサ) 不・トゲアザミ、嗜・シコクフクロ、コメツツジ、ヨコウラクツツジ、シコクシラベ	草原 混交 自	樹皮剥ぎ:シコクシラベ、ヒメコマツ、アカカンバ、シコクシラベの多くが枯死し倒れているものも多い。	少数枯死	シコクシラベ(幼樹)	概ね食害	食痕多数	ミヤマクマザサ
970 A	長安口	スギ・ヒノキ植林(スギ)	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕少数	食痕多数	葉が殆どなく不明
971 A	出羽島	照葉樹林	高木林 常針 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
972 A	鏡子溪(小豆島)	常緑樹林(コジイ?、アラカシ?、ウバメガシ)	低木林 常広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
973 A	木島	アカマツ	高木林 常針 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		スダジイ	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		コシダ	草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
974 A	鹿島	クスノキ植栽林	高木林 常広 二	林床裸地	多数、少数枯死		概ね食害		ササ類なし
975 A	檜原山	不・イシガマ、フモトシダ	高木林 夏広 自	個体に食害	少数	リョウブ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	ミヤコザサ(?)
976 A	北三方が森	嗜・リョウブ	夏広 二	個体に食害	少数	リョウブ	食痕なし	食痕なし	
977 A	大野山	常緑針葉樹林(スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし		
B		竹林(モウソウチク)	高木林 常広 植	なし	なし		食痕なし		
978 A	黒森山	落葉広葉樹林(ミズキ、エノキ、カスミザクラ)	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし		
B		常緑針葉樹植林(スギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし		
979 A	岩伽藍山		高木林 常針 植	個体に食害	少数	ヒノキ	食痕なし	本来なし	
980 A	戸祇御前山		高木林 常針 植	個体に食害	少数	ヒノキ	食痕少数	食痕なし	ミヤコザサ
B			高木林 夏広 二	個体に食害	少数	リョウブ	食痕なし	食痕少数	ミヤコザサ
981 A	八面山	ミズナラ群落	高木林 夏広 二	林床衰退	少数	リョウブ	食痕少数	食痕少数	ミヤマクマザサ
982 A	鬼ヶ城山	アカガシ林	高木林 常広 二	林内構造変化	少数	リョウブ	概ね食害	食害枯死・消失	ミヤマクマザサ

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地 名	群落・群集名 (復占種)	植生タイプ	群落全層への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)					
983 A	八面山・三本杭	ブナ林	高木林 夏広 自	林床裸地	多数枯死	下記	概ね食害	食害枯死・消失	ミヤコザサ、スズタケ
		不・アセビ、ヒカゲノカズラ、マンネンシギ		樹皮剥ぎ: リョウブ、コハチワカエデ、シロモジ、ヒメシヤラ、アブラチャン、タンナサワフタギ。林床の植生は壊滅的に食害を受け、表土が流失している。					
B		ヒノキ植林	高木林 常針 植	林床衰退	少数枯死	下記	食痕多数	食痕多数	ミヤコザサ
985 A	蘆山	アカガシ林	高木林 常広 自	林床衰退	少数	リョウブ	食痕少数	食害枯死・消失	ミヤマクマザサ
				ササはほぼ全域で消失。わずかに岩の隙間に残存する程度。防護ネットが頂上周囲に設置されており登山者はゲートの鍵を開けて入る。さらに頂上周囲には内側にさらにネットが設置されている。					
986 A	しらさ峠	ブナ林	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
987 A	京柱峠・小樽曾山	ミズナラ群落	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	下記	食痕少数	食痕少数	スズタケ
		嗜: リョウブ		樹皮剥ぎ: ノリウツギ、リョウブ、ヤマハンノキ、シロモジ。リョウブの樹皮剥ぎが極めて多数に及んでいる。					
B		ヒノキ植林	高木林 常針 植	個体に食害	少数	リョウブ	食痕少数	食痕少数	スズタケ
		嗜: リョウブ		カンスゲ、コカンスゲに食痕が目立つ。					
C		ブナ二次林	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	ウラジロミ、リョウブ	食痕多数	食痕少数	スズタケ
		嗜: カンスゲ、コカンスゲ							
988 A	怒田・南大王	植栽 (ユズ畑)	低木林 常広 植	個体に食害	少数	ユズ	食痕少数	食痕なし	
		農耕地周辺の草地で食痕が目立つ。不・ススキ、カニツグサなどのイネ科草本。		ユズ畑に転作した畑田のところにシカの糞と食痕が見られた。					
B		コナラ二次林	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	リョウブ	食痕少数	食痕少数	スズタケ
989 A	剱山系三嶺	ウラジロミミ林	高木林 常針 自	林床裸地	多数枯死	下記	食害枯死・消失	食害枯死・消失	ミヤマクマザサ
				樹皮剥ぎ: ウラジロミ、リョウブ、ツルギミツバツツギ、シコクブシなどが残存しているものの、この個体にも食痕が多数認められる。					
B		ミヤマクマザサ群落	草原 自	なし	なし		食害枯死・消失	食害枯死・消失	ミヤマクマザサ
		不・イワヒメワラビ、トモエソウ 嗜: ススキ、ミヤマクマザサ		林床のミヤマクマザサ群落が全面的に枯死し、裸地化している部分も目立つ。ヤマスカボ、メアオスゲなどは食害を受けてはいるものの、旺盛に繁殖し、広い面積で復占群落を形成している。					
C		ブナ林	高木林 夏広 自	林内構造変化	少数枯死	下記	食痕多数	食痕多数	ミヤマクマザサ、スズタケ
				樹皮剥ぎ: ウラジロミ、リョウブ、ミズキ					
990 A	上八川下分	ヒノキ社齢林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		スギ社齢林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
991 A	雑誌山	スギ・ヒノキ社齢林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	スズタケ
992 A	権原(かじはら)	コナラ林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
994 A	上名野川	モミ林 (社叢林)	高木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
995 A	大崎・桜	スギ・ヒノキ社齢 (～若齢) 林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
996 A	妹背峠	蛇紋岩地灌木林	低木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
998 A	宇佐町竜	ヨシ群落	草原 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
999 A	桶ノ川	スギ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		コジイ-アラカシ林 (コジイ)	高木林 常広 二	イノシシが林内を荒らした (掘り起こした) 跡あり。					
				なし	なし		食痕なし	本来なし	
1000 A	ゆずりは・桶ノ川	コジイ-アラカシ林 (コジイ)	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		スギ林	高木林 常針 植	林床にイノシシが掘り起こした跡あり。					
				なし	なし		食痕なし	本来なし	
1001 A	ゆずりは	スギ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		コジイ-アラカシ林 (コジイ)	高木林 常広 二	林床、林縁の一部にイノシシの掘った跡あり。					
				なし	なし		食痕なし	本来なし	
1002 A	押岡	スギ植林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1003 A	野見・蜂ヶ尻	シイ・タブ二次林 (スダジイ、タブノキ)	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1005 A	久保谷山	ツガ林	高木林 常針 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	
				林床の低木 (コガクツギ、リョウブなど) にわずかに食痕が見られた。担当の森林管理課林研による、最近個体数が増えて、ヒノキ植林への樹皮剥ぎ被害などが見られるようになったとのことである (現状は未確認)。					
1006 A	外浦	スダジイ (ニタリジイ) -ウラジロガシ林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1007 A	笹場	コジイ-アラカシ林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		スギ・ヒノキ林 (主にスギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1008 A	大坂、旧久礼坂	スギ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		シイ・カシ二次林 (コジイ)	高木林 常広 二	イノシシのひっかいた跡 (林床) とスタ場あり。					
				なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		ハチク林	低木林 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1009 A	笹場稲荷神社	常緑広葉樹林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
				復占種: クロガネモチ、イヌマキ、ヒメユズリハ。イノシシと思われる土を掘り返した跡があるが小規模。					
1010 A	加江崎・蘆山国有林	ウラジロガシ-ヤブツバキ林	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		コジイ-アラカシ林 (コジイ)	高木林 常広 二	林床にイノシシの掘り起こした跡あり。イノシシの痕跡は10年以上前からみられる。					
				なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		モウソウチク林	低木林 植	30年ほど前に伐採された代償植生。サルの小集団 (10頭ほど) を見かけたが、植生にどう影響を与えているかは不明。					
				なし	なし		食痕なし	本来なし	
1011 A	興津郷分	シイ・カシ二次林 (スダジイ、アラカシ)	高木林 常広 二	林床にイノシシが掘り起こした跡あり。					
				なし	なし		食痕なし	本来なし	

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地 名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)					
1012 A	小鶴津	シイ・カシ二次林 (スダジイ、アラカシ)	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	ヒノキ植林		高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1013 A	与津峠(興津峠)	コジイ-アラカシ林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ケネザサと思われる
B	スギ林		高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1014 A	与津地	スギ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ケネザサと思われる
1015 A	大鶴津	コジイ-アラカシ林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	スダジイ林 (ニタリジイという型)		高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C	踏み跡群落 (シバ)		草原 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1016 A	黒石	スギ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ケネザサと思われる
1017 A	志和峠	スギ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ケネザサと思われる
1018 A	志和	スダジイ林 (ニタリジイ?)	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	コジイ-アラカシ林 (コジイ、アラカシ)		高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1019 A	馬鞍	コジイ-アラカシ林 (コジイ)	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	スギ-ヒノキ林		高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1020 A	大矢井賀	コジイ-アラカシ林 (コジイ、アラカシ)	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	モウソウチウ林		低木林 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1021 A	小矢井賀	コジイ-アラカシ林 (コジイ)	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	スギ林		高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1022 A	鈴	ヒメユズリハイタミミンチバナ林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1023 A	荷種~鈴	ヒノキ-スギ植林 (主にヒノキ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	アラカシ-コジイ林 (主にアラカシ)		高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1024 A	橋川上道山国有林	スギ-ヒノキ林 (主にスギ)	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	コジイ-アラカシ林		高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	下記
1025 A	島戸	コジイ-ウラジロガシ林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	スダジイ(ニタリジイ)林(スダジイ、ウラジロガシ)		高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C	ヒノキ-スギ植林 (ヒノキ)		高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1026 A	興津浦・三崎山	スダジイ林 (ニタリジイ)	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	シイ・カシ二次林 (ニタリジイ)		高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1027 A	権現山	照葉樹萌芽二次林/スギ植林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1029 A	平尾台	ススキ-ネザサ群落	草原 二	なし			食痕なし	食痕なし	ネザサ
1030 A	ロマンスケ丘	ススキ-ネザサ群落	草原 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ
1031 A	香春岳(三ノ岳)	岩角地群落 (イワシデ等)	低木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	ススキ-ネザサ群落(ヤブニッケイ、タブノキ等混生)		草原 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ
1032 A	福智山	スギ植林地	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	常緑・落葉広葉樹混交林		高木林 混交 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ
1033 A	御所ヶ谷	常緑広葉樹優占二次林	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ他
1034 A	龍王山	スギ・ヒノキ植林地	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	アカマツ優占林		低木林 常針 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	多分、ネザサ
1035 A	日王山	ヒノキ植林地	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B	コナラ優占林		高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C	ネザサ草原 (山頂部)		草原 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類	
目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況(上記に集約できない状況)						
1036 A	小石原川上流・水浦	ムノノキ、エノキを含むアラカシ・ウラジロガシ林 嗜: コナラ、カラムシ、ウツギ、エノキ、イヌホオズキ、ハチク、アオキ、イヌツギ、ノイバラ、キイチゴ類	高木林 常広 自	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	ヤダケ、メダケ、スズタケ	
1037 A	脊振山	ブナを含むアラカシ林 不: トウワタ、タマサンゴ、ハマゴウ、カラスザンショウ、ダンドボロギク	低木林 常広 自	なし	なし		食痕なし		ミヤコザサ	
1043 A	野崎島	スダジイ群落	高木林 常広 自	林床裸地	少数		食痕多数	本来なし		
1044 A	伏勢	イテイガシ	高木林 常広 自	林床は裸地が拡大している。	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1045 A	龍良山	イヌノキウラジロガシ群集(スダジイが多い) 嗜: アオキ、それ以外は不明瞭	高木林 常広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし		
1047 A	中尾	スギ林	高木林	植	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
1049 A	新宮牧野	スギ・ヒノキ植林	低木林 常針 植	個体に食害	少数	ヒノキ				
1055 A	高森峠	雑木林	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ類	
1057 A	天主山	ブナ林	高木林 夏広 自	スギ植林も同様。 林床衰退	少数	少数枯死		食痕多数	食痕多数	
1058 A	国見岳		高木林 混交 自	林床裸地	多数、多数枯死		食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ(全滅)	
1060 A	老岳	スギ林	高木林 常針 植	なし	なし		食痕なし	本来なし		
1062 A	大滝(小鶴地区北方)		高木林 夏広 自	林床衰退	少数	コナラ、アブラチャン	根ね食害	食害枯死・消失	スズタケ(全滅)	
1063 A	五木大滝	不: エゴマ、レモンエゴマ ブナ、モミ	高木林 混交 自	シダ類は全部食害を受けている。 林床裸地			食痕少数	食害枯死・消失	スズタケ	
1064 A	白鳥山	不: イワヒメワラビ、コガクウツギ、マムシグサ、ナガバモミジイチゴ ブナ林	高木林 夏広 自	林床衰退	多数、少数枯死		食痕多数	食痕多数	スズタケ	
1065 A	角山	ツバライフ、アラカシ、ハナガシ	常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし		
1066 A	栲形山(八原岳西方)		高木林 夏広 二	林床裸地	多数枯死	下記	食害枯死・消失	食害枯死・消失	下記	
1067 A	仰鳥帽子山	不: マツカゼソウ、フクジュソウ、バイケイソウ、ツクシガシ、シモバシラ、サウルリソウ、オオバノイノモトソウ、オニヒカゲウラボ、ヒノタニシダ、ナチシダ、オオバノハネジョウチンダ、フジシダ、オオアシシダ、シロガタモ サワグルミ・シオジ林(サワグルミ)	高木林 夏広 自	樹皮剥ぎ: イヌガヤ、スギ、ヒノキ、エゴノキ(100%)。海抜1000m以上では、ツクシガシとヤマシャヤクが群生。マムシグサ類は根に当たると食べる。イワヒメワラビは冬になって餌がなくなると食べる。冬になるとウラジロも食べる。チャ(山の茶畑)も食べる。ササ・スズタケ(1000m以上では全滅)	林床裸地	多数枯死	エゴノキ、イヌガヤ、スギ	食害枯死・消失	食害枯死・消失	下記
B		不: ツクシガシ、エゴマ	高木林 常針 植	裏側の谷、海抜1000m、石灰岩地。ササ・スズタケ(昔は群生、今はなし)	林床衰退	多数	スギ	食痕少数	本来なし	
C		不: タケニグサ(少し食べる)、アオジクズリハ	高木林 混交 二	バイケイソウは花が出ると開花株を食べる。1本の50%を食べている。シカ自体の虫(寄生虫)駆除のためとも思われる。	林床裸地	多数枯死	下記	食害枯死・消失	スズタケ(全滅)	
1068 A	高岳	不: タケニグサ(少し食べる)、アオジクズリハ ミズナラ林	低木林 夏広 二	樹皮剥ぎ: エゴノキ、イヌガヤ、スギ、ヒノキ。低地ではイワヒメワラビが群生。	林床裸地	多数枯死	エゴノキ(100%)	食痕多数	食害枯死・消失	スズタケ(全滅)
1070 A	埴田国有林	不: ツクシガシ、エゴマ スギ林	高木林 常針 植	直径15cm以下の低木はすべてキズがついて倒れたり枯れている。	林床衰退	多数、少数枯死	スギ枯死目立つ	食害枯死・消失	本来なし	
1071 A	市房山	不: ナガバヤブマオ、マツカゼソウ	高木林 常針 植	別地点のイッシュウチザサ被害大。	林床衰退	多数、少数枯死	直径10cm以下の樹木全部	食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
1071 B		不: ヤマジロウ(シカが食べないため群生)、アオジクズリハ(ユズリハは食べる)	高木林 常広 二	海抜500~600m。上記の他は全部食べられている。	林床裸地	なし	下記	食害枯死・消失	本来なし	
1074 A	鏡山	不: ヤマジロウ、シモバシラ、アオジクズリハ シキミ・モミ群集	高木林 常針 自	樹皮剥ぎ: 3年前まではあったが今回はなし。海抜1000m附近。ユズリハを食べてアオジクズリハだけが残っている(高さ1m)。	個体に食害	なし	食痕少数	本来なし		
1077 A	黒原山		高木林 混交 二	オオス大型1頭確認。あまり被害なし。シダに食痕あり。今から進入、被害が出ると思われる。	林床衰退	多数、少数枯死	下記	食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ(全滅)
1078 A	白髪岳	不: アセビ、タニギキョウ、ムラサキ科(オニルリソウ、オオルリソウ)	低木林 夏広 二	樹皮剥ぎ: ナラ類(クスギ、コナラ)、イヌガヤ、ケクロモジ、スギ、ヒノキ	林床裸地	多数		食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ(群落全滅)
1079 A	野峠	不: ミヤマシキミ、アセビ、タカマキコソコ(少し食べる)	高木林 常針 植		林床衰退	なし		食痕多数		
1080 A	山下池	不: マツカゼソウ 嗜: ウツギ、ツクシヤブウツギ スギ	高木林 植		なし	なし		食痕なし		
1081 A	高長谷山(障屋の村)	シシモチ・シラカシ群集、コナラ・クロキ群集(コジイまたはコナラ)	常広 自			少数		食痕少数		
1082 A	久住高原	不: スキトダシバ群集 嗜: ヒゴタイ	草原 二	クロキに角跡確認。森林植生関係を分担した報告書あり。シカの影響よりも人為の影響が大きい(写真)。	個体に食害	なし		食痕少数	食痕なし	ネザサ
1083 A	野津町	不: アラカシ・ナメノキ群集(アラカシ) 嗜: アオキ	高木林 常広 二		個体に食害			食痕多数		
1084 A	障子岳・おやし岳	不: プナシキ群集内の風衝低木林 不: イワカガミ、ツクシヤクナダ、クロフネサイシン。嗜: ヘビノネゴザ、ミヤマガンビ、ツクシコメツツジ、ヨウラクツツジ	低木林 夏広 自	個体に食害	多数	下記	食痕多数	食痕多数	スズタケ	
1085 A	五ヶ所高原	不: スキーチガヤ群落	草原	自然植生が二次植生が不明。	なし			食痕なし	食痕なし	
B		不: コナラ林(コナラ、ミズキ) 不: ニシノヤマトイミンガサ、ナガバヤブマオ	高木林 混交 二	樹皮剥ぎ: タンナサワフタギ、リョウブ、ノリウツギ、コヤブデマリ。即種のアソカラコウが激減。	個体に食害	少数	下記	食痕多数	食痕少数	スズタケ、ネザサ
1086 A	洞岳	不: シラキ・ブナ群集	高木林 夏広 自	樹皮剥ぎ: ナラ類(クスギ、コナラ)、イヌガヤ、ケクロモジ、スギ、ヒノキ	林床裸地	多数枯死	下記	根ね食害	食痕多数	スズタケ
1088 A	白岩山	不: タンナトリカブト、イケマ シラキ・ブナ群集	高木林 夏広 自	樹皮剥ぎ: ノリウツギ、マンサク、ナナカド、オオカメノキ。多くのRD種が絶滅or絶滅寸前。	林床裸地	多数	リョウブ	食痕多数	食痕多数	スズタケ
B		不: タンナトリカブト、ヤマシャヤク 嗜: ヘイケモリアザミ、ツクシミヤマノダケ、イヌワラビ類、ハスノハイチゴ	低木林 夏広 自	表土流失が目立つようになっている。	個体に食害	多数枯死	下記	食痕少数	食痕多数	スズタケ
1089 A	黒岳	不: タンナトリカブト、ヤマシャヤク。嗜: ハナドクサ、モリアザミ、ヒロノヘビノボラズ、シヨクヒロハチナンショウ、ミシマサイコなど多数 サワグルミ林(サワグルミ、ヒメシヤラ)	高木林 夏広 自	樹皮剥ぎ: シカ防護ネット設置前に多かった。5年前のネット設置で、絶滅寸前だったものが復活している。	個体に食害	少数	リョウブ、タンナサワフタギ他	食痕多数	食痕多数	スズタケ
1090 A	三輪	不: イケマ、サウルリソウ、ツクシマムシグサ。嗜: キレンゲショウマ、イヌワラビ類、アキチヨウジ スギ林	高木林 常針 植	林内構造変化	少数			根ね食害	本来なし	
		不: ナガバヤブマオ、ナチシダ、オオバノイノモトソウ、サンショウソウ類(Pellionia sp.)、カンアオイ類								

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)							
									その他の具体的状況(上記に集約できない状況)
1091 A	屋敷野	ブナ、ミズナラ、モミ、ツガ 不:アセビ、シキミ、ツルシキミ	高木林 混交 自	林床裸地	多数、少数枯死		食害枯死・消失	食害枯死・消失	スズタケ
1092 A	尾鈴山矢研滝	ウラジロガシ・サカキ群集 不:マツザカシダ、タチシノブ、コバノカナワラビ、クリハラシ	高木林 常広 自	林床衰退	多数	下記	食痕多数	食痕多数	スズタケ
1093 A	上面木山山麓	ミミズバイ・スダジイ群集(スダジイ) 不:シロバイ、マツカゼソウ	高木林 常広 自	樹皮剥ぎ:ミツバツツジ類、ツクシメツゲ、ナツツバキ、ヒメシャラ、ノリウツギ	個体に食害	少数	食痕多数	食痕少数	スズタケ
1094 A	矢岳・滝下山	コナラ林 不:ハリガネワラビ、オモト 嗜:トチバニンジン	高木林 混交 二	林床衰退	多数枯死	リュウブ他	食痕多数	食痕多数	スズタケ
1095 A	狗留孫峽	スギ植林(アブラチャン、ウリノキ混生) 不:コバノイシカグマ、イワヒメワラビ、ナチシダ、オオバノハチジョウシダ、オオバノイシカグマ、モミジコウモリ、クリハラシ、コショウノキ、マンリョウ、タチシノブ、ヤマアイ、キジノオシダ類	高木林 常針 植	林内構造変化	少数	リュウブ	食痕多数	食痕多数	スズタケ
1096 A	堂屋敷	ウラジロガシ・サカキ群集 不:モミジコウモリ、テツカエデ、マルミカンアオイ	高木林 常広 自	林内構造変化	多数	シイモチ			
1097 A	国見山山麓	ウラジロガシ・サカキ群集 不:ナチシダ、オオイワヒトデ、ハチジョウシダ類	高木林 常広 自	林床衰退	多数		概ね食害	食痕多数	スズタケ
B		スギ植林 不:シロヤマシダ、ハチジョウシダ類、ヒカゲワラビ	高木林 常針 植	林床衰退	なし		概ね食害	本来なし	
1098 A	陸上自衛隊霧島演習場	ススキ・チガヤ群集 嗜:ユウスゲ	草原	個体に食害	なし		食痕少数	食痕少数	ネザサ
1099 A	綾南川(川中周辺)	ルリミノキ・イチイガシ群集 不:シダ類全般、ウバユリ、マムシグサ等のサトイモ科	高木林 常広 自	林床衰退	少数、少数枯死		食痕多数		
B		シバ・ススキ草原 やや不:ススキ、ナガバヤブマオ、エゴマ、レモンエゴマ、タケニグサ、嗜:シバ、トビシガラ、ユスカタサ	草原 二	個体に食害			食痕多数	食痕多数	タイムミンチク(補裁)
1101 A	えびの高原	アカマツ群集 冬季のため不明	高木林 常針 自	林内構造変化	なし		食痕多数	食痕多数	スズタケ
1102 A	杉の本谷	イチイガシ・アラカシ林 不:マツカゼソウがやや目立つ	高木林 常広 二	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
B		スギ植林 不:マツカゼソウ、カツモウイノデ	高木林 常針 植	林内構造変化	なし		概ね食害	本来なし	
1103 A	和石(よれし)・国見山	ススキ・チガヤ群集 不:スダジイ	草原 二	なし	なし		食痕なし	食痕なし	ネザサ
B		コジイ林、コナラ林 不:モミジコウモリ、ナチシダ	高木林 常広混交 自二	個体に食害			食痕多数	食痕少数	スズタケ
C		イチイガシ林 不:バリバリノキ、イズセンリョウ、サザンカ、ナガバヤブマオ	高木林 常広 自	個体に食害	少数	シイモチ			
1107 A	奴久見	ススキ・チガヤ群集	草原 二	なし	なし		なし		
1108 A	五女木	イチイガシ・イスノキ林	高木林 常広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
B		スダジイ群集	高木林 常広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
C		モウソウチク群集	高木林 常広 植	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
1109 A	木地山	サワグルミ林 不:ヤマシャクヤク	高木林 夏広 自	林内構造変化	なし		食痕多数	本来なし	
B		イスノキ・ウラジロガシ林	高木林 常広 自	林床衰退	なし		食害枯死・消失	本来なし	
C		カラスザンショウ群集	低木林 夏広 二	林床衰退	少数	未確認	食害枯死・消失	本来なし	
1110 A	紫尾山	ブナ林 不:ツクシガシワ	高木林 夏広 自	林床衰退	少数	未確認	食害枯死・消失	本来なし	
1111 A	定之段	スギ林 不:ナチシダ、レモンエゴマ、マツカゼソウ	高木林 常針 植	林床衰退	少数		概ね食害	本来なし	
1115 A	桜島/海釣り公園	クロマツ低木群集	低木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1116 A	桜島/有村溶岩展望所	クロマツ低木群集	低木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1118 A	大籠柄岳	スダジイ群集	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		アカガシ群集	低木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		ブナ群集	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	スズタケ
1119 A	高隈山御岳	アカガシ群集	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	スズタケ
B		風衝低木群集	低木林 混交 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1120 A	高隈山	アカガシ・ウラジロガシ	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	
B		スズタケ・ブナ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	スズタケ
1121 A	佐多岬	ビロウ、ソテツを含む海岸低木林	低木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1122 A	黒島	アカガシ群集	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	スズタケ
B		スダジイ群集	高木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
C		ハマヒサカキ群集	低木林 常広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	
1123 A	鹿之峯	スギ林 不:タマシダ、カツモウイノデ、嗜:シロヤマシダ、イシカグマ、リュウビンタイ、ハチジョウシダ	高木林 常針 植	個体に食害	なし		食痕多数	本来なし	

植生情報第15号 (2011年3月)

回答No.	地名	群落・群集名(優占種)	植生タイプ	群落全への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食害・食害	ササへの影響	ササの種類
目立つ不嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)				その他の具体的状況(上記に集約できない状況)					
1124 A	住吉大道	アカメガシワ-カラスザンショウ群落 不:コシダ、マルハハダカホオズキ、ベニバナボロギク、アブラギリ、嗜:カラスザンショウ、アオノクマタケラン、ススキ	低木林 夏広 二	個体に食害	なし		食痕多数	本末なし	
1125 A	野間松原山	ハクサンボク-マテバシイ群落(マテバシイ)	高木林 常広 二	なし	なし		食痕なし	本末なし	
1126 A	屋久島/西部林道	スダジイ、クスノキ、アコウなどの照葉樹林	高木林 常広 自	林床裸地	少数		食害枯死・消失		
1127 A	屋久島/小杉谷	スギ、ツガ 不:ホウロクイチゴ、マムシグサ	高木林 常針 自	林床裸地化している。	少数		食害枯死・消失		
参考(期間外)									
1128 A	帝釈・田代山	オオシラビソ林 不:ハリノキ、オオカメノキ等	高木林 常針 自	下記	なし		食痕多数	食痕なし	
1129 A	コビサワラ原生林	ヤマボウシ-ブナ群集 不:ミヤマシキミなど	高木林 夏広 自	林床裸地	少数		食痕多数	食害枯死・消失	
B		スギ・ヒノキ植林 不:イズカニコモリ	高木林 常針 植	林床裸地	なし		食害枯死・消失		
1130 A	天城山	ヤマハノキ群集(楠林)(ヤマハノキ) 不:シロヨメナ、トリカブト属の1種(ヤマトリカブト?)、アセビ、リョウブ	低木林 夏広 植	林床裸地	少数	リョウブ	食痕少数	本末なし	
B		ヤマボウシ-ブナ群集(コアジサイ-ブナ群集)(ブナ) 不:ミヤマシキミ、アセビ、ヒメシャラ、タンナサワフタギ、ヤマカモジグサ、イヌツゲ、リョウブ	高木林 夏広 自	少数		リョウブ	食痕少数		下記
C		イタヤカエデ群集(イタヤカエデ) 不:ミヤマシキミ、シロヨメナ、ヒメシャラ、アセビ、イヌツゲ、リョウブ	高木林 夏広 二	個体に食害	少数	リョウブ	食痕少数	本末なし	
1131 A	袴狭	アカマツ群集(アカマツ) 不:ソヨゴ、ワラビ、ネズ、アセビ、リョウブ、チシマザサ、ススキ	高木林 常針 二	林床裸地	少数	リョウブ	食痕多数	食痕少数	チシマザサ
B		コナラ-アベマキ群集(コナラ) 不:アセビ、シキミ、ソヨゴ、リョウブ、ヤブツバキ	高木林 夏広 二	林床裸地	少数	リョウブ、ヤブツバキ	食痕多数	食痕少数	チシマザサ
C		モウソウク群集(モウソウク) 不:シロダモ、サンショウ、ドクダミ、イワヒメワラビ、ダンドボロギク、ベニバナボロギク、リョウブ、ヤブツバキ、スギ、ネザサ	高木林 常針 植	個体に食害	少数	リョウブ、ヤブツバキ	食痕少数	食痕少数	ネザサ
1132 A	畑	コナラ-アベマキ林(アベマキ) 不:シキミ、クロモジ、エゴノキ、チャノキ、ネザサ	高木林 夏広 二	林床裸地	少数	リョウブ	食痕少数	食痕少数	ネザサ
B		シラカシ群集(シラカシ) 不:シキミ、アカシテ、チャボガヤ、シラカシ、ヤブツバキ	高木林 常広 二	林床裸地	少数	シラカシ、ヤブツバキ	食痕少数	本末なし	
C		スギ・ヒノキ林(スギ) 不:シロダモ、シロヤマシダ、イワヒメワラビ、シキミ、ドクダミ、ミツマタ、マムシグサ、ベニバナボロギク、チャノキ	高木林 常針 植	林床裸地	少数	ヤブツバキ	食痕少数	本末なし	林縁にネザサあり
1133 A	竹原貯水池	ウバメガシ-コシダ群集(ウバメガシ) 不:ソヨゴ、ウバメガシ、ネジキ、コシダ、ウラジロ	低木林 常広 二	林床裸地	なし		食痕少数	本末なし	
B		コナラ群集(ヤマザクラ) 不:ヤブニッケイ、シキミ、ソヨゴ、ススキ、イヌツゲ(消滅)	高木林 夏広 二	林床裸地	少数	ヤブツバキ	食痕少数	本末なし	
C		シイ・カシ群集(スダジイ) 不:ヤブニッケイ、カゴノキ、イズセンリョウ、シキミ	高木林 常広 二	林床裸地	少数	ヤブツバキ	食痕少数	本末なし	
1134 A	兜岳	シイ・カシ群集(スダジイ) 不:シダモ、アラカシ、クロキ、スダジイ、ミズミズイ、ネズミモチ、ヤマヤブツツギ、メダケ、ベニダ、ナワシロギ、サルトリイバラ(食痕多い)	高木林 常広 二	下記	少数	ハクサンボク、ネズミモチ(皮剥角研ぎ)	食痕多数、食害枯死・消失	本末なし	
1135 A	小八郎岳	シイ・カシ群集(スダジイ) 不:キジノオシダ、イノデ、イヌビワ、コガクツギ、ヘイメタビ	高木林 常広 二	林床裸地	少数	アオキ、ネズミモチ、コガクツギ(皮剥角研ぎ)	食痕多数、食害枯死・消失	本末なし	
1136 A	今里(太祝神社裏)	シイ・カシ群集(スダジイ) 不:コバノカナラワビ、嗜:スダジイ	高木林 常広 二	林床裸地	少数	ヤブツバキ、ツツジsp.スダジイ(角研ぎ)	食痕多数、食害枯死・消失	本末なし	
1137 A	上見坂	イヌノキ-ウラジロガシ群集(アカガシ) 不:スダジイ、ヒサカキ、嗜:ネズミモチ、クロキ、モミ、ウラジロガシ	高木林 常広 二	林床裸地	多数	下記	食痕多数、食害枯死・消失	本末なし	
1138 A	万松院	スダジイ-ホソバカナラワビ群集(スダジイ) 不:ウラジロガシ、クロキ、ベニダ、ヒサカキ(ヒサカキ:他に食べるものがないので、ちょこちょこ食いで矮小化)。	高木林 常広 二	樹皮剥ぎ:ヤブニッケイ、ヤブツバキ、ヒメユズリハ、カクレミノ、スダジイ、ネズミモチ、モミ、コハクチワカエデ、イヌガシ、アカガシ(皮剥角研ぎ)。自然性やや高。低木層だけでなく、亜高木層を構成する本木でも風倒。	多数	下記	食痕多数、食害枯死・消失	本末なし	
1139 A	大巖山	シラカシ群集(シラカシ) 不:シキミ 嗜:モチノキ、アオキ	高木林 常広 自	林床裸地	多数	モチノキ、リョウブ、スギ、ヒノキ	食痕多数		
1140 A	猿の瀬戸コース	コナラ-クワ群集(コナラ) 嗜:リョウブ(ほとんどの個体に食痕)	高木林 夏広 二	三学会宮崎大会(2009年5月23、24日)で、植生の報告あり、植生の単純化はシカの影響と関係ないか質問あり(写真)。	少数	リョウブ	食痕多数		
1141 A	祖母山	シキミ-モミ群集(モミ) 不:ヤブニッケイ、ヤマカモジグサ、アセビ、リョウブ、スズタケ	高木林 常針 自	個体に食害	少数	リョウブ	食痕少数	食痕少数	スズタケ
B		コガクツギ-クマシデ群集(アカシテ) 不:アカシテ、イヌシデ、マムシグサ、スズタケ	高木林 夏広 二	個体に食害			食痕少数	食痕少数	スズタケ
C		スギ・ヒノキ植林(ヒノキ) 不:ヤマカモジグサ、ヒノキ、スズタケ	高木林 常針 植	林床裸地	少数	ヒノキ	食痕少数	食痕少数	スズタケ
1142 A	鳥帽子岳	ツクシヤクナゲ群集 不:ツクシヤクナゲ	低木林 常広 自	林床裸地	多数	下記	食痕多数	食痕多数	スズタケ
B		ブナ-スズタケ群集 不:ハシキミ、ハノキ、イケマ、嗜:ツクシヤマノダケ、ヘイケムリアザミ、ユキザサ、テバコワラビ	高木林 夏広 自	林床裸地	多数	下記	食痕多数	食痕多数	スズタケ
1143 A	国見岳	シラキ-ブナ群集 不:ツクシヤクナゲ 嗜:多数	高木林 夏広 自	林床裸地	多数	下記	食痕多数	食害枯死・消失	スズタケ
1144 A	石堂山	シラキ-ブナ群集 不:アセビ、シキミ、オモト、ヒカゲノカズラ、キジョラン、オオルリソウ、エゴノキ	高木林 夏広 自	樹皮剥ぎ:クロモジ、マンサク、オオヤマレンゲ、ヒコサンヒメシャラ、ツリバナ、ノリウツギ、ナナカマド、ツクシドウダン、ニシキウツギ、オオカメノキ。食わないと判断していたバイケイソウ、シラネワラビも混生。ツクシヤクナゲは増殖中。宮崎県、九州の絶滅種が出ている。キレンゲショウマ、ナンゴククガイソウ群集は消失。	多数	下記	食害枯死・消失	スズタケ	
1145 A	高千穂河原	ススキ群集(ミヤマキリシマ点在) 不:ミヤマキリシマ、嗜:イヌツゲ、ススキ、コクウバウツギ、ガマズミ、キリシマグミ	草原 夏広 自	個体に食害	なし		食痕多数	本末なし	

植生情報第 15 号 (2011 年 3 月)

回答No.	地 名	群落・群集名 (優占種)	植生タイプ	群落全般への影響	樹皮剥ぎ	樹皮剥ぎがある種	草本・低木の食痕・食害	ササへの影響	ササの種類
		目立つ嗜好種(不)と嗜好種(嗜)、食痕のある種(食)		その他の具体的状況 (上記に集約できない状況)					
B		ミズナラ林	低木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	食痕なし	
C		ノリウツギ低木林	低木林 夏広 自	個体に食害	なし		食痕少数	本来なし	
参考(場所不特定)									
1146 A	5万分の一帯広	カシワ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	オオクマザサ
B		ハンノキ・ヤチダモ・ハルニレ	高木林 夏広 二	なし	なし		食痕なし	本来なし	オオクマザサ
C		エゾイタヤ・シナノキ	高木林 夏広 自	なし	なし		食痕なし	本来なし	オオクマザサ、クマイザサ
1147 A	尾瀬		高木林 夏広常針 自植	下記	少数	アオモリドマツ、オゼトウヒ	食痕多数	食痕なし	
		不: ミツガシワ、ハリブキ、オオカメノキなど		個体に食害、林内構造変化、林床衰退、林床裸地。ミツガシワ群落が主であるが種々の群落に影響されている。					
B		アオモリドマツ林	高木林 常針 自	林床衰退	少数	アオモリドマツ	食痕多数	食痕なし	
		不: ハリブキ、オオカメノキなど							
参考(緯切後の回答)									
1152 A	えびの高原	湿生植物群落 (ヌマガヤオーダー)	草原 自				下記	本来なし	
B		ミヤマキリシマアカマツ群集	高木林 常針 自	甌岳山頂。シバ刈りされたように一面植生高低下。池内の植生が踏み荒らされている。概ね食害、食害枯死・消失。	下記(1)	なし (~少数)	下記(2)	食痕多数	スズタケ
		不: ハイノキ、コガクウツギ? (最近よく食べるようになっている)		(1) 林床衰退、林床裸地。(2) 概ね食害、食害枯死・消失					
C		ミヤマキリシマ群落	低木林 常広夏緑 自	下記			食痕多数	食痕多数	スズタケ
		不: ツクシコウモリソウ (食痕はちらほらある)、キリシマアザミ (とげのため、それでも葉先を食べる)。嗜: キリシマノガリヤス (少ない)、キリシマヒゴタイ (頻度高い食害により矮小化)。		個体に食害、林内構造変化					
1153 A	新燃岳・矢岳	ミズナラ群落 (ミズナラ、コハウチワカエデ)	高木林 夏広 自二	下記(1)			食害枯死・消失	下記(2)	スズタケ
		不: ツクシコウモリソウ (少数の食痕あり)。		新燃岳南斜面。嗜好種は食べられ終わって今ももう不明。(1) 林内構造変化、林床衰退。(2) 食痕多数、食害枯死・消失					
B		コハウチワカエデ・タンナサワフタギ林(自然亜高木林)	低木林 夏広 自	下記(1)	少数	タンナサワフタギ	下記(2)	食害枯死・消失	スズタケ
				矢岳尾根。(1) 林内構造変化、林床衰退、(一部) 林床裸地。(2) 概ね食害、食害枯死・消失					
1154 A	御池・小池	イスノキウラジロガシ群集 (イチイガシ)	高木林 常広 自				食害枯死・消失		
				林内構造変化、林床衰退、(一部) 林床裸地。特に小池周辺の林内は空洞化。低木~亜高木の倒木多く、林床は裸地に近い。					
1155 A	夷守岳	シキミ・モミ群集 (ツガ、モミ)	高木林 常針 自	下記			食痕少数		
		不: オオマルバノテンニンソウ、ニシノヤマタイミンガサ		個体に食害、林内構造変化、林床衰退。オオマルバノテンニンソウが群集を占む。コガクウツギなど刈り込み食い、オオマルバノテンニンソウ、ニシノヤマタイミンガサは本来はあまり好みではなかったのでは? 食べるものがなくなって食べ始めている?					